


9


ریاضی (سائنس گروپ)



یہ کتاب حکومت پنجاب کی طرف سے تعلیمی سال 2019-20 کیلئے
پنجاب کے سرکاری سکولوں میں تقسیم کی گئی جیکٹ میں شامل ہے

ناشر: کاروان بک ہاؤس، لاہور






”تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دُنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوامِ عالم سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے“

قائدِ اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان
(26 ستمبر 1947ء - کراچی)

قومی ترانہ

پاک سرزمین شاد باد کشورِ حسین شاد باد
 ثوَنشانِ عزمِ عالی شان ارضِ پاکستان
 مرکزِ یقین شاد باد
 پاک سرزمین کا نظام قوتِ اخوتِ عوام
 قوم، ملک، سلطنت پایندہ تابندہ باد
 شاد باد منزلِ مراد
 پرچمِ ستارہ و ہلال رہبرِ ترقی و کمال
 ترجمانِ ماضی، شانِ حال جانِ استقبال
 سایہٴ خدائے ذوالجلال



عرض ناشر

یہ کتاب قومی نصاب ۲۰۰۶ اور نیشنل ایکسٹ بک اینڈ لرننگ میٹریلز پالیسی ۲۰۰۷ کے تحت بین الاقوامی معیار پر تیار کی گئی ہے۔ یہ کتاب حکومت پنجاب کی طرف سے تمام سرکاری سکولوں میں بطور واحد ایکسٹ بک مہیا کی گئی ہے۔ اگر اس کتاب میں کوئی تصور وضاحت طلب ہو یا متن اور املا وغیرہ میں کوئی غلطی ہو تو اس بارے ادارے کو آگاہ کریں۔ ادارہ آپ کا شکر گزار ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

ترجمہ: ”شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔“

ریاضی 9

(سائنس گروپ)

ڈاکٹر کرامت حسین ڈار

پروفیسر عرفان الحق



کاروان بک ہاؤس، لاہور

قیمت

138

تعداد اشاعت

104,000

تاریخ اشاعت

مارچ 2019ء

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	یونٹ
1	قالب اور قابلوں کا قطع	1
37	حقیقی اور غیر حقیقی (کپلیکس) اعداد	2
66	لوگار تھم	3
89	الجبری جملے اور الجبری کلیے	4
119	تجزی	5
138	الجبری جملوں کا ذواضعاف اقل، عاوا عظم اور جذرا المربع	6
157	یک درجی مساواتیں اور غیر مساواتیں	7
175	خطی پالائن (لیننز) گراف اور اس کے مستعملات	8
202	کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا تعارف	9
222	متناسق مثلثان	10
237	متوازی الاضلاع اور ٹکونی اشکال	11
251	خط اور زاویہ کے ناصف	12
260	مثلث کے اضلاع اور زاویے	13
273	نسبت اور تناسب	14
285	مسئلہ فیثاغورث	15
291	رقبے متعلق مسئلے	16
301	عملی جیومیٹری - مشقیں	17
319	جوابات	☆
336	فرہنگ (Glossary)	☆
347	ریاضیاتی نشانات	☆
348	لوگار تھم ٹیبل	☆
350	ایٹنی لوگار تھم ٹیبل	☆
352	انڈیکس	☆
357	کتابیات	☆

جملہ حقوق (کاپی رائٹ) بحق ناشر محفوظ ہیں۔

منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم (شعبہ نصاب سازی) اسلام آباد، پاکستان۔ بطابق قومی نصاب 2006 اور نیشنل ٹیکسٹ بک اینڈ لرننگ میٹریلز پالیسی 2007
 مراسلہ نمبر F.1-16/2010-Maths مورخہ 2-12-2010 - ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کا کوئی حصہ کسی امدادی کتاب، خلاصہ، ماڈل پیپر یا گائیڈ
 وغیرہ میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

کوآرڈینٹر: محمد اکرام اللہ

تیار کردہ: کاروان بک ہاؤس، کچھری روڈ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

ترجمہ: ”شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔“

ریاضی 9

(سائنس گروپ)

ڈاکٹر کرامت حسین ڈار

پروفیسر عرفان الحق



کاروان بک ہاؤس، لاہور

قیمت

138

تعداد اشاعت

104,000

تاریخ اشاعت

مارچ 2019ء

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	پونٹ
1	قالب اور قابلوں کا مقطع	1
37	حقیقی اور غیر حقیقی (کمپلیکس) اعداد	2
66	لوگار تھم	3
89	الجبری جملے اور الجبری کلیے	4
119	تجزی	5
138	الجبری جملوں کا ذواضعاف اقل، عاوا عظیم اور جذر المربع	6
157	یک درجی مساواتیں اور غیر مساواتیں	7
175	خطی یا لائن (لینئر) گراف اور اس کے مستعملات	8
202	کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا تعارف	9
222	متماثل مثلثان	10
237	متوازی الاضلاع اور ٹکونی اشکال	11
251	خط اور زاویہ کے ناصف	12
260	مثلث کے اضلاع اور زاویے	13
273	نسبت اور تناسب	14
285	مسئلہ فیثاغورث	15
291	رقبہ سے متعلق مسئلے	16
301	عملی جیومیٹری۔ مشائیں	17
319	جوابات	☆
336	فرہنگ (Glossary)	☆
347	ریاضیاتی نشانات	☆
348	لوگار تھم نیبل	☆
350	اینٹی لوگار تھم نیبل	☆
352	انڈیکس	☆
357	کتابیات	☆

جملہ حقوق (کاپی رائٹ) بحق ناشر محفوظ ہیں۔

منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم (شعبہ نصاب سازی) اسلام آباد، پاکستان۔ بمطابق قومی نصاب 2006 اور نیشنل ٹیکسٹ بک اینڈ لرننگ میٹریلز پالیسی 2007
 مراسلہ نمبر F.1-16/2010-Maths مورخہ 2-12-2010 - ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کا کوئی حصہ کسی امدادی کتاب، خلاصہ، ماڈل پیپر یا گائیڈ
 وغیرہ میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

کارتھن: محمد اکرام اللہ

تیار کردہ: کاروان بک ہاؤس، کچھری روڈ، لاہور

قالب اور قالبوں کا مقطع

(MATRICES AND DETERMINANTS)

یونٹ میں سیکھنے کی اہم حدود (Unit Outlines)

- | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | قالبوں کا تعارف (Introduction to Matrices) |
| 1.2 | قالبوں کی اقسام (Types of Matrices) |
| 1.3 | قالبوں کی جمع اور تفریق (Addition and Subtraction of Matrices) |
| 1.4 | قالبوں کی ضرب (Multiplication of Matrices) |
| 1.5 | قالبوں کے جمعی اور ضربی معکوس (Additive and Multiplicative Inverses of Matrices) |
| 1.6 | ہمزاد مساواتوں کا حل (Solution of Simultaneous Linear Equations) |
- یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

- ☆ یونٹ کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب ہر طالب علم درج ذیل تصورات کو ہو بہو بیان کرنے پر علمی دسترس حاصل کر لے:
- حقیقی ارکان والے قالبوں کی مستطیلی اقسام کا حقیقی عملی زندگی سے حوالہ قائم کرنا۔
 - قالب کی افقی اور رأسی یا عمودی قطاروں سے حوالہ قائم کرنا۔
 - کسی بھی قالب کے مرتبہ سے حوالہ قائم کرنا۔
 - کسی بھی دیے ہوئے دو قالبوں کے مساوی یا غیر مساوی ہونے کی تصدیق یا تردید کرنا۔
- ☆ درج ذیل تصورات کی واضح طور پر تعریف کرنا اور ان کی شناخت کو امتیازی حیثیت میں ذہن نشین کرنا:
- قطاری قالب (row matrix) ، کالمی قالب (column matrix) ، مستطیلی قالب (rectangular matrix) ، مربعی قالب (square matrix) ، صفری قالب (zero/null matrix) ، وحدانی قالب یا ضربی ذاتی قالب (unit or identity matrix) ، سکالر قالب (scalar matrix) ، وتری قالب (diagonal matrix) وغیرہ۔
- دیے ہوئے قالب کے منفی (negative) قالب ، ٹرانسپوز قالب (transpose matrix) ، ایڈجائنٹ (adjoint) قالب ، سیمٹرک (symmetric) اور سکیوسیمٹرک (skew symmetric) قالب۔

- ☆ دیے ہوئے قابلوں میں ان کی جمعی اور تفریقی خاصیت کی تصدیق کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے جمعی یا تفریقی قابلوں کو جمع یا تفریق کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مستطیلی یا مربعی قابلوں کو دیے گئے حقیقی اعداد سے ضرب دینا۔
- ☆ دیے ہوئے ہم مرتبہ قابلوں کے درمیان جمعی خاصیت مبادلہ (commutative property) اور خاصیت تلازم (associative property) کی تصدیق کرنا۔
- ☆ جمعی ذاتی قالب کی تعریف کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مستطیلی اور مربعی قابلوں کے جمعی معکوس معلوم کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے قابلوں کا جمعی اور ضربی حاصل معلوم کرنا۔
- ☆ قابلوں کے درمیان ضربی خاصیت تلازم کی تصدیق کرنا۔
- ☆ کسی بھی دو دیے ہوئے ہم مرتبہ قابلوں کے جمعی حاصل کے دائیں یا بائیں ایک ایسے قالب سے ضربی عمل کرنا اور اس کے تقسیمی قوانین کی تصدیق کرنا۔
- ☆ ایک ایسی مثال لے کر یہ ثابت کرنا کہ قابلوں کے ضربی عمل کا قانون (multiplicative law) عام طور پر خاصیت مبادلہ کا حامل نہیں۔ جیسے $AB \neq BA$ (i) قالب A اور B ہم مرتبہ ہوں (ii) A اور B ہم مرتبہ نہ ہوں مگر ضربی عمل ممکن ہو۔
- ☆ وحدانی یا ضربی ذاتی (identity) قالب کی تعریف اور پہچان کرنا۔
- ☆ ضرب دیے ہوئے قابلوں A اور B سے ضربی ٹرانسپوز (transpose) کے قانون کی تصدیق کرنا۔ مثلاً
- $$(AB)^t = B^t A^t$$
- ☆ دیے ہوئے مربعی قابلوں کے مقطع کی تعریف کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مربعی قالب کے مقطع کی قیمت معلوم کرنا۔
- ☆ نادر (singular) اور غیر نادر (non-singular) قابلوں کی مقطع کی مدد سے تعریف اور تصدیق کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مربعی قالب کے ایڈجائنٹ (adjoint) کی تعریف کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مربعی غیر نادر قالب A کا معکوس قالب A^{-1} معلوم کرنا اور تصدیق کرنا کہ: $AA^{-1} = I = A^{-1}A$
- ☆ قالب A کے ایڈجائنٹ کی مدد سے A کا معکوس A^{-1} معلوم کرنا۔
- ☆ تصدیق کرنا کہ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ جب کہ A اور B غیر نادر قالب ہوں۔
- ☆ دو ہم زاد مساواتوں کو کسی حقیقی عملی زندگی کے حوالہ سے دو متغیراتی مسئلہ کو باقاعدہ حل کرنا۔
- بذریعہ معکوس قالب کا قانون
 - بذریعہ کریمر (cramer) کا قانون

قالب اور قابلوں کا مقطع

(MATRICES AND DETERMINANTS)

یونٹ میں سیکھنے کی اہم حدود (Unit Outlines)

- 1.1 قابلوں کا تعارف (Introduction to Matrices)
- 1.2 قابلوں کی اقسام (Types of Matrices)
- 1.3 قابلوں کی جمع اور تفریق (Addition and Subtraction of Matrices)
- 1.4 قابلوں کی ضرب (Multiplication of Matrices)
- 1.5 قابلوں کے جمعی اور ضربی معکوس (Additive and Multiplicative Inverses of Matrices)
- 1.6 ہمزاد مساواتوں کا حل (Solution of Simultaneous Linear Equations)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع ترما حاصل / نتائج۔ (Students Learning Outcomes)

☆ یونٹ کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب ہر طالب علم درج ذیل تصورات کو ہو بہو بیان کرنے پر علمی دسترس حاصل کر لے:

- حقیقی ارکان والے قابلوں کی مستطیلی اقسام کا حقیقی عملی زندگی سے حوالہ قائم کرنا۔
- قالب کی افقی اور راسی یا عمودی قطاروں سے حوالہ قائم کرنا۔
- کسی بھی قالب کے مرتبہ سے حوالہ قائم کرنا۔
- کسی بھی دیے ہوئے دو قابلوں کے مساوی یا غیر مساوی ہونے کی تصدیق یا تردید کرنا۔

☆ درج ذیل تصورات کی واضح طور پر تعریف کرنا اور ان کی شناخت کو امتیازی حیثیت میں ذہن نشین کرنا:

- قطاری قالب (row matrix) ، کالمی قالب (column matrix) ، مستطیلی قالب
- (rectangular matrix) ، مربعی قالب (square matrix) ، صفری قالب (zero/null matrix)
- وحدانی قالب یا ضربی ذاتی قالب (unit or identity matrix) ، سکالر قالب (scalar matrix)
- وتری قالب (diagonal matrix) وغیرہ۔

دیے ہوئے قالب کے منفی (negative) قالب ، ٹرانسپوز قالب (transpose matrix) ، ایڈجائنٹ (adjoint) قالب ، سیمٹرک (symmetric) اور سکیوسیمٹرک (skew symmetric) قالب۔

- ☆ دیے ہوئے قابلوں میں ان کی جمعی اور تفریقی خاصیت کی تصدیق کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے جمعی یا تفریقی قابلوں کو جمع یا تفریق کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مستطیلی یا مربعی قابلوں کو دیے گئے حقیقی اعداد سے ضرب دینا۔
- ☆ دیے ہوئے ہم مرتبہ قابلوں کے درمیان جمعی خاصیت مبادلہ (commutative property) اور خاصیت تلازم (associative property) کی تصدیق کرنا۔
- ☆ جمعی ذاتی قالب کی تعریف کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مستطیلی اور مربعی قابلوں کے جمعی معکوس معلوم کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے قابلوں کا جمعی اور ضربی حاصل معلوم کرنا۔
- ☆ قابلوں کے درمیان ضربی خاصیت تلازم کی تصدیق کرنا۔
- ☆ کسی بھی دو دیے ہوئے ہم مرتبہ قابلوں کے جمعی حاصل کے دائیں یا بائیں ایک ایسے قالب سے ضربی عمل کرنا اور اس کے تقسیمی قوانین کی تصدیق کرنا۔
- ☆ ایک ایسی مثال لے کر یہ ثابت کرنا کہ قابلوں کے ضربی عمل کا قانون (multiplicative law) عام طور پر خاصیت مبادلہ کا حامل نہیں۔ جیسے $AB \neq BA$ (i) قالب A اور B ہم مرتبہ ہوں (ii) A اور B ہم مرتبہ نہ ہوں مگر ضربی عمل ممکن ہو۔
- ☆ وحدانی یا ضربی ذاتی (identity) قالب کی تعریف اور پہچان کرنا۔
- ☆ ضرب دیے ہوئے قابلوں A اور B سے ضربی ٹرانسپوز (transpose) کے قانون کی تصدیق کرنا۔ مثلاً
- $$(AB)^t = B^t A^t$$
- ☆ دیے ہوئے مربعی قابلوں کے مقطع کی تعریف کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مربعی قالب کے مقطع کی قیمت معلوم کرنا۔
- ☆ نادر (singular) اور غیر نادر (non-singular) قابلوں کی مقطع کی مدد سے تعریف اور تصدیق کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مربعی قالب کے ایڈجائنٹ (adjoint) کی تعریف کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے مربعی غیر نادر قالب A کا معکوس قالب A^{-1} معلوم کرنا اور تصدیق کرنا کہ: $AA^{-1} = I = A^{-1}A$
- ☆ قالب A کے ایڈجائنٹ کی مدد سے A کا معکوس A^{-1} معلوم کرنا۔
- ☆ تصدیق کرنا کہ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ جب کہ A اور B غیر نادر قالب ہوں۔
- ☆ دو ہم زاد مساواتوں کو کسی حقیقی عملی زندگی کے حوالہ سے دو متغیراتی مسئلہ کو باقاعدہ حل کرنا۔
- بذریعہ معکوس قالب کا قانون
 - بذریعہ کریمر (cramer) کا قانون

تعارف

قالب اور اس کے مقطع جیسے تصورات کئی علوم مثلاً ریاضیات (Mathematics)، شماریات (Statistics)، فزکس (Physics) اور الیکٹرونکس (Electronics) وغیرہ کے مطالعہ میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ قالبوں کے استعمال نے کمپیوٹر سائنس کی اس صدی میں انقلابی کردار ادا کیا ہے اور مزید کر رہا ہے۔

قالب کا تصور انگلستان کے انیسویں صدی کے مشہور ریاضی دان آر تھر کیلے (Arthur Cayley) نے پیش کیا۔ اس نے 1857-58 میں قالبوں کی تھیوری پیش کی۔

1.1 قالب (Matrix)

حقیقی اعداد کی مدد سے ایک مستطیلی بناوٹ مثلاً 0,1,2,3,4 اور 7 نمبروں کی مدد سے بناوٹ،

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 7 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$
 کو قالب کہا جاتا ہے۔
 بریکٹ میں بند کر دینے [] کو قالب کہا جاتا ہے۔
 اسی طرح $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ایک دوسرا قالب ہے۔

ریاضیات کی اصطلاح میں اُن حقیقی اعداد کو جو قالب بنانے میں استعمال ہوئے ہوں قالب کے ارکان (elements) یا اندراج (entries) کہا جاتا ہے۔

(قالب کی جمع 'قالبوں' لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔)

روایتی طور پر ریاضیات میں قالبوں کو انگریزی کے بڑے (capital) حروف تہجی مثلاً A, B, C, M, N، وغیرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جبکہ قالبوں کے ارکان کو انگریزی کے چھوٹے (small) حروف تہجی a, b, c, d، وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں۔

1.1.1 قالب کی قطاریں (Rows) اور کالم (Columns)

قالب کی بناوٹ یا ساخت کو مزید شناخت کرنے کی خاطر اس کے ارکان کی افقی (horizontal) اور راسی یا عمودی (vertical) ترتیب کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔

سامنے قالب A میں ارکان یا اندراج کی افقی بناوٹ یا ساخت کو قطار کہتے ہیں۔ قالب A میں تین قطاریں R_1 ، R_2 اور R_3 ہیں۔

سامنے قالب B میں ارکان یا اندراج کی راسی یا عمودی بناوٹ یا ساخت کو کالم کہتے ہیں۔ قالب B میں تین کالم C_1 ، C_2 اور C_3 ہیں۔

ذہن نشین رہے کہ قالب A اور قالب B کی ہر قطار میں ارکان کی تعداد برابر ہے۔ اسی طرح A اور B کے ہر کالم میں بھی ارکان کی تعداد برابر ہے۔

یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ ہر قالب کی قطار اور کالم میں ارکان کی تعداد ہمیشہ برابر ہی ہو۔

1.1.2 قالب کا مرتبہ (Order of a Matrix)

قطاروں اور کالموں کی تعداد سے قالب کے مرتبہ کا تعین ہوتا ہے۔ اگر ایک قالب M میں قطاروں کی تعداد m ہو اور کالموں کی تعداد n ہو تو قالب M کے مرتبہ کو m -by- n سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثلاً قالب $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ کا مرتبہ 2-by-3 ہے۔ چونکہ M میں دو قطاریں اور تین کالم ہیں۔

جبکہ قالب $N = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ کا مرتبہ 3-by-3 اور قالب $P = [3 \ 2 \ 5]$ کا مرتبہ 1-by-3 ہے۔

1.1.3 مساوی قالب (Equal Matrices)

اگر A اور B دو قالب ہوں تو قالب A کو B کے یا B کو A کے مساوی سمجھا جائے تو ان کو $A = B$ سے ظاہر کیا جائے گا، اگر

(i) A کا مرتبہ B کا مرتبہ

(ii) قالب A کا ہر رکن قالب B کے متناظرہ رکن کے برابر ہو۔

(i) مثلاً قالب $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ اور قالب $B = \begin{bmatrix} 1 & 2+1 \\ -4 & 4-2 \end{bmatrix}$ ایک دوسرے کے مساوی قالب ہیں کیونکہ

(a) A کا مرتبہ B کا مرتبہ

(b) قالب A کا ہر رکن قالب B کے متناظرہ رکن کے برابر ہے۔

پس $A = B$

(ii) قالب $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ اور $L = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ آپس میں مساوی یا برابر نہیں ہیں۔

کیونکہ قالب L کا مرتبہ قالب M کے مرتبہ کے تو برابر ہے لیکن اس کے متناظرہ ارکان باہم برابر نہیں۔ مثلاً قالب L میں دوسری قطار کے دوسرے کالم کا رکن 2 اور قالب M میں 2 ہے جو یکساں یا برابر نہیں۔ اس لیے قالب L قالب M کے مساوی نہیں۔

پس $L \neq M$

(iii) اگر قالب $P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ اور قالب $Q = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ہوں تو ظاہر ہے کہ $P \neq Q$

کیونکہ قالب P کا مرتبہ، قالب Q کے مرتبہ کے برابر نہیں۔

تعارف

قالب اور اس کے مقطع جیسے تصورات کئی علوم مثلاً ریاضیات (Mathematics)، شماریات (Statistics)، فزکس (Physics) اور الیکٹرونکس (Electronics) وغیرہ کے مطالعہ میں ممدو معاون ثابت ہوتے ہیں۔ قالبوں کے استعمال نے کمپیوٹر سائنس کی اس صدی میں انقلابی کردار ادا کیا ہے اور مزید کر رہا ہے۔

قالب کا تصور انگلستان کے انیسویں صدی کے مشہور ریاضی دان آر تھر کیلی (Arthur Cayley) نے پیش کیا۔ اس نے 1857-58 میں قالبوں کی تھیوری پیش کی۔

1.1 قالب (Matrix)

حقیقی اعداد کی مدد سے ایک مستطیلی بناوٹ مثلاً 0,1,2,3,4 اور 7 نمبروں کی مدد سے بناوٹ،

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 7 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$
 کو بریکٹ میں بند کر دینے [] کو قالب کہا جاتا ہے۔
 اسی طرح $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ایک دوسرا قالب ہے۔

ریاضیات کی اصطلاح میں ان حقیقی اعداد کو جو قالب بنانے میں استعمال ہوئے ہوں قالب کے ارکان (elements) یا اندراج (entries) کہا جاتا ہے۔

(قالب کی جمع 'قالبوں' لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔)

روایتی طور پر ریاضیات میں قالبوں کو انگریزی کے بڑے (capital) حروف تہجی مثلاً A, B, C, M, N، وغیرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جبکہ قالبوں کے ارکان کو انگریزی کے چھوٹے (small) حروف تہجی a, b, c, d، وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں۔

1.1.1 قالب کی قطاریں (Rows) اور کالم (Columns)

قالب کی بناوٹ یا ساخت کو مزید شناخت کرنے کی خاطر اس کے ارکان کی افقی (horizontal) اور راسی یا عمودی (vertical) ترتیب کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔

سامنے قالب A میں ارکان یا اندراج کی افقی بناوٹ یا ساخت کو R_1 ، R_2 ، R_3 قطار کہتے ہیں۔ قالب A میں تین قطاریں R_1 ، R_2 اور R_3 ہیں۔

سامنے قالب B میں ارکان یا اندراج کی راسی یا عمودی بناوٹ یا ساخت کو کالم کہتے ہیں۔ قالب B میں تین کالم C_1 ، C_2 اور C_3 ہیں۔

ذہن نشین رہے کہ قالب A اور قالب B کی ہر قطار میں ارکان کی تعداد برابر ہے۔ اسی طرح A اور B کے ہر کالم میں بھی ارکان کی تعداد برابر ہے۔ یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ ہر قالب کی قطار اور کالم میں ارکان کی تعداد ہمیشہ برابر ہی ہو۔

1.1.2 قالب کا مرتبہ (Order of a Matrix)

قطاروں اور کالموں کی تعداد سے قالب کے مرتبہ کا تعین ہوتا ہے۔ اگر ایک قالب M میں قطاروں کی تعداد m ہو اور کالموں کی تعداد n ہو تو قالب M کے مرتبہ کو m -by- n سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثلاً قالب $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ کا مرتبہ 2-by-3 ہے۔ چونکہ M میں دو قطاریں اور تین کالم ہیں۔

جبکہ قالب $N = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ کا مرتبہ 3-by-3 اور قالب $P = [3 \ 2 \ 5]$ کا مرتبہ 1-by-3 ہے۔

1.1.3 مساوی قالب (Equal Matrices)

اگر A اور B دو قالب ہوں تو قالب A کو B کے یا B کو A کے مساوی سمجھا جائے تو ان کو $A = B$ سے ظاہر کیا جائے گا، اگر

(i) A کا مرتبہ B کا مرتبہ

(ii) قالب A کا ہر رکن قالب B کے متناظرہ رکن کے برابر ہو۔

(i) مثلاً قالب $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ اور قالب $B = \begin{bmatrix} 1 & 2+1 \\ -4 & 4-2 \end{bmatrix}$ ایک دوسرے کے مساوی قالب ہیں کیونکہ

(a) A کا مرتبہ B کا مرتبہ

(b) قالب A کا ہر رکن قالب B کے متناظرہ رکن کے برابر ہے۔

پس $A = B$

(ii) قالب $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ اور $L = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ آپس میں مساوی یا برابر نہیں ہیں۔

کیونکہ قالب L کا مرتبہ قالب M کے مرتبہ کے برابر ہے لیکن اس کے متناظرہ ارکان باہم برابر نہیں۔ مثلاً قالب L میں دوسری قطار کے دوسرے کالم کا رکن 2 اور قالب M میں -2 ہے جو یکساں یا برابر نہیں۔ اس لیے قالب L قالب M کے مساوی نہیں۔

پس $L \neq M$

(iii) اگر قالب $P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ اور قالب $Q = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ہوں تو ظاہر ہے کہ $P \neq Q$

کیونکہ قالب P کا مرتبہ، قالب Q کے مرتبہ کے برابر نہیں۔

مشق 1.1

1- درج ذیل قالموں کا مرتبہ بتائیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad C = [2 \ 4]$$

$$D = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}, \quad F = [2]$$

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

2- معلوم کیجیے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون کون سے قالم آپس میں مساوی ہیں۔

$$A = [3], \quad B = [3 \ 5], \quad C = [5 - 2]$$

$$D = [5 \ 3], \quad E = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 3-1 \\ 3+3 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, \quad I = [3 \ 3+2]$$

$$J = \begin{bmatrix} 2+2 & 2-2 \\ 2+4 & 2+0 \end{bmatrix}$$

3- قیمتیں معلوم کیجیے جو دی ہوئی مساوات کو درست قائم رکھتی ہیں۔

$$\begin{bmatrix} a+c & a+2b \\ c-1 & 4d-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -7 \\ 3 & 2d \end{bmatrix}$$

1.2 قالموں کی اقسام

(i) قطاری قالم (Row Matrix)

ایسا قالم قطاری قالم کہلاتا ہے جس میں صرف ایک ہی قطار ہو۔ مثلاً $M = [2 \ -1 \ 7]$ ایک

قطاری قالم ہے جس کا مرتبہ 1-by-3 ہے۔ اور $N = [1 \ -1]$ ایک قطاری قالم ہے جس کا

مرتبہ 1-by-2 ہے۔

(ii) کالمی قالم (Column Matrix)

ایسا قالم کالمی قالم کہلاتا ہے جس میں صرف ایک ہی کالم ہو۔ مثلاً، $M = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ اور $N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ دونوں کالمی قالم ہیں۔

جن میں سے M کا مرتبہ 2-by-1 اور N کا مرتبہ 3-by-1 ہے۔

(iii) مستطیلی قالب (Rectangular Matrix)

ایسا کوئی بھی قالب مستطیلی قالب کہلاتا ہے جس میں قطاروں کی تعداد اس کے کالموں کی تعداد کے برابر نہ ہو۔

$$\text{مثلاً } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}, C = [1 \ 2 \ 3] \text{ اور } D = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ تمام مستطیلی قالب}$$

ہیں جن میں سے A کا مرتبہ 3-by-2، B کا مرتبہ 2-by-3، C کا مرتبہ 1-by-3 اور D کا مرتبہ 3-by-1 ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قالب A، B، C اور D میں سے ہر ایک میں قطاروں کی تعداد ان میں کالموں کی تعداد کے برابر نہیں ہے۔

(iv) مربعی قالب (Square Matrix)

ایک دیا ہوا قالب مربعی قالب کہلاتا ہے اگر اس میں موجود قطاروں کی تعداد اس میں کالموں کی تعداد کے برابر ہو۔

$$\text{مثلاً } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ اور } C = [3] \text{ تمام مربعی قالب ہیں۔}$$

جن میں سے A کا مرتبہ 2-by-2، B کا مرتبہ 3-by-3 اور C کا مرتبہ 1-by-1 ہے۔

(v) صفری قالب (Null or Zero Matrix)

ایک دیا ہوا قالب صفری قالب کہلاتا ہے اگر اس میں ہر رکن صفر ہو۔

$$\text{مثلاً } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = [0 \ 0], C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تمام صفری قالب ہیں۔ ان میں سے A کا مرتبہ 2-by-2، B کا مرتبہ 1-by-2، C کا مرتبہ 2-by-1، D کا مرتبہ 2-by-3 اور قالب E کا مرتبہ 3-by-3 ہے۔

نوٹ: کسی بھی مرتبہ کے صفری قالب کو O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

(vi) ٹرانسپوز قالب (Transpose Matrix)

دیے ہوئے قالب M کی قطاروں کو کالموں میں بدل دینے سے نئے قالب M^t کو قالب M کا ٹرانسپوز قالب

کہا جاتا ہے۔ یاد رہے R_1 کو C_1 ، R_2 کو C_2 اور R_3 کو C_3 وغیرہ میں بدلا جائے۔ اسی طرح کالموں کو قطاروں میں بدل دینے سے نیا قالب M^t ہی ٹرانسپوز قالب ہوگا۔ مثلاً

$$\text{اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix} \text{ ہو تو } A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

مشق 1.1

1- درج ذیل قابلوں کا مرتبہ بتائیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad C = [2 \ 4]$$

$$D = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}, \quad F = [2]$$

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

2- معلوم کیجیے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون کون سے قابلوں آپس میں مساوی ہیں۔

$$A = [3], \quad B = [3 \ 5], \quad C = [5 \ -2]$$

$$D = [5 \ 3], \quad E = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 3-1 \\ 3+3 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, \quad I = [3 \ 3+2]$$

$$J = \begin{bmatrix} 2+2 & 2-2 \\ 2+4 & 2+0 \end{bmatrix}$$

3- a, b, c اور d کی قیمتیں معلوم کیجیے جو دی ہوئی مساوات کو درست قائم رکھتی ہیں۔

$$\begin{bmatrix} a+c & a+2b \\ c-1 & 4d-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -7 \\ 3 & 2d \end{bmatrix}$$

1.2 قابلوں کی اقسام

(i) قطاری قالب (Row Matrix)

ایسا قالب قطاری قالب کہلاتا ہے جس میں صرف ایک ہی قطار ہو۔ مثلاً $M = [2 \ -1 \ 7]$ ایک

قطاری قالب ہے جس کا مرتبہ 1-by-3 ہے۔ اور $N = [1 \ -1]$ ایک قطاری قالب ہے جس کا

مرتبہ 1-by-2 ہے۔

(ii) کالمی قالب (Column Matrix)

ایسا قالب کالمی قالب کہلاتا ہے جس میں صرف ایک ہی کالم ہو۔ مثلاً $M = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ اور $N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

دونوں کالمی قالب ہیں۔

جن میں سے M کا مرتبہ 2-by-1 اور N کا مرتبہ 3-by-1 ہے۔

(iii) مستطیلی قالب (Rectangular Matrix)

ایسا کوئی بھی قالب مستطیلی قالب کہلاتا ہے جس میں قطاروں کی تعداد اس کے کالموں کی تعداد کے برابر نہ ہو۔

$$\text{مثلاً } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}, C = [1 \ 2 \ 3] \text{ اور } D = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ تمام مستطیلی قالب}$$

ہیں جن میں سے A کا مرتبہ 3-by-2، B کا مرتبہ 2-by-3، C کا مرتبہ 1-by-3 اور D کا مرتبہ 3-by-1 ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قالب A، B، C اور D میں سے ہر ایک میں قطاروں کی تعداد ان میں کالموں کی تعداد کے برابر نہیں ہے۔

(iv) مربعی قالب (Square Matrix)

ایک دیا ہوا قالب مربعی قالب کہلاتا ہے اگر اس میں موجود قطاروں کی تعداد اس میں کالموں کی تعداد کے برابر ہو۔

$$\text{مثلاً } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ اور } C = [3] \text{ تمام مربعی قالب ہیں۔}$$

جن میں سے A کا مرتبہ 2-by-2، B کا مرتبہ 3-by-3 اور C کا مرتبہ 1-by-1 ہے۔

(v) صفری قالب (Null or Zero Matrix)

ایک دیا ہوا قالب صفری قالب کہلاتا ہے اگر اس میں ہر رکن صفر ہو۔

$$\text{مثلاً } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = [0 \ 0], C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تمام صفری قالب ہیں۔ ان میں سے A کا مرتبہ 2-by-2، B کا مرتبہ 1-by-2، C کا مرتبہ 2-by-1 اور D کا مرتبہ 2-by-3 اور E کا مرتبہ 3-by-3 ہے۔

نوٹ: کسی بھی مرتبہ کے صفری قالب کو O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

(vi) ٹرانسپوز قالب (Transpose Matrix)

دیے ہوئے قالب M کی قطاروں کو کالموں میں بدل دینے سے نئے قالب M^t کو قالب M کا ٹرانسپوز قالب

کہا جاتا ہے۔ یاد رہے R_1 کو C_1 ، R_2 کو C_2 اور R_3 کو C_3 وغیرہ میں بدلا جائے۔ اسی طرح کالموں کو قطاروں میں بدل دینے سے نیا قالب M^t ہی ٹرانسپوز قالب ہوگا۔ مثلاً

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \end{bmatrix} \text{ اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix} \text{ ہو تو (i)}$$

$$B^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ہو تو} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{اگر (ii)}$$

$$C^t = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{ہو تو} \quad C = [0 \ 1] \quad \text{اگر (iii)}$$

غور کیجیے اوپر درج مثالوں (ii) اور (iii) میں مستطیلی قالیوں B اور C کا مرتبہ بالترتیب 2-by-3 اور 1-by-2 ہے تو ان کے ٹرانسپوز قالیوں کا درجہ بدل کر بالترتیب 3-by-2 اور 2-by-1 ہو گیا ہے۔ مثال (i) میں مربعی قالب A اور اس کے ٹرانسپوز کا درجہ 3-by-3 ہی رہا۔

(vii) منفی قالب (Negative Matrix)

دیے ہوئے قالب A کا منفی قالب $-A$ ہوگا جس میں دیے ہوئے قالب A کا ہر رکن اس کے منفی اندراج میں بدل دیا جائے۔

$$\text{مثلاً اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ تو } -A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \text{، } -A \text{ کا منفی قالب ہوگا۔}$$

(viii) سمٹریک قالب (Symmetric Matrix)

ایک ایسا مربعی قالب A سمٹریک قالب کہلاتا ہے جس کا ٹرانسپوز قالب A^t قالب A کے مساوی قالب ہو۔ یعنی قالب A سمٹریک قالب ہوگا اگر $A^t = A$

$$\text{مثلاً} \quad (M)^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} = M \quad \text{اگر } M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(i)}$$

پس قالب M ایک سمٹریک قالب ہے۔

$$(A)^t = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} \neq A \quad \text{اگر } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{(ii)}$$

پس قالب A ایک سمٹریک قالب نہیں ہے۔

(ix) سکیو سمٹریک قالب (Skew Symmetric Matrix)

ایک مربعی قالب A کو سکیو سمٹریک قالب کہا جاتا ہے اگر $(A)^t = -A$

$$\text{مثلاً} \quad \text{اگر } A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ہو تو}$$

$$(A)^t = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -(-2) & 0 & -1 \\ -(-3) & -(-1) & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

پس A ایک سکیوسٹرک قالب ہے۔

(x) وتری قالب (Diagonal Matrix)

ایسا مربعی قالب جس میں وتر کے ارکان میں سے کم از کم ایک رکن غیر صفر ہو اور باقی تمام ارکان صفر ہوں وتری قالب کہلاتا ہے۔

$$\text{مثال کے طور پر } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ اور } C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ تینوں قالب}$$

وتری قالب ہیں جن کا مرتبہ 3-by-3 ہے۔

$$\text{قالب } M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ اور } N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ وتری قالب ہیں جن کا مرتبہ 2-by-2 ہے۔}$$

(xi) سکیلر قالب (Scalar Matrix)

ایسا وتری قالب جس میں وتر کے تمام ارکان یا اندراج یکساں ہوں سکیلر قالب کہلاتا ہے۔

$$\text{مثال کے طور پر قالب } \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \text{ ایک سکیلر قالب ہے۔ اگر } k \neq 0$$

$$\text{قالب } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ اور } C = [5] \text{ تمام سکیلر قالب ہیں۔}$$

جن میں A کا مرتبہ 3-by-3، B کا مرتبہ 2-by-2 اور C کا مرتبہ 1-by-1 ہے۔

(xii) وحدانی یا ضربی ذاتی قالب (Multiplicative Identity Matrix)

ایک وتری قالب جو سکیلر قالب بھی ہو اور ہر وتری رکن 1 ہو وحدانی یا ضربی ذاتی قالب کہلاتا ہے جس کو T سے

$$\text{ظاہر کیا جاتا ہے۔} \quad \text{مثلاً (i) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ وحدانی یا ضربی ذاتی قالب ہے جس کا مرتبہ 3-by-3 ہے۔}$$

$$\text{(ii) } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ وحدانی یا ضربی ذاتی قالب کا مرتبہ 2-by-2 ہے۔}$$

$$B^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ ہو تو } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ اگر (ii)}$$

$$C^t = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ہو تو } C = [0 \ 1] \text{ اگر (iii)}$$

نور کیجیے اوپر درج مثالوں (ii) اور (iii) میں مصطلحی قالبوں B اور C کا مرتبہ بالترتیب 2-by-3 اور 1-by-2 ہے تو ان کے ٹرانسپوز قالبوں کا درجہ بدل کر بالترتیب 3-by-2 اور 2-by-1 ہو گیا ہے۔ مثال (i) میں مربعی قالب A اور اس کے ٹرانسپوز کا درجہ 3-by-3 ہی رہا۔

(Negative Matrix) منفی قالب (vii)

دیے ہوئے قالب A کا منفی قالب $-A$ ہوگا جس میں دیے ہوئے قالب A کا ہر رکن اس کے منفی اندراج میں بدل دیا جائے۔

$$\text{مثلاً اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ تو } -A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \text{ کا منفی قالب ہوگا۔}$$

(Symmetric Matrix) سمٹریک قالب (viii)

ایک ایسا مربعی قالب A سمٹریک قالب کہلاتا ہے جس کا ٹرانسپوز قالب A^t قالب A کے مساوی قالب ہو۔
یعنی قالب A سمٹریک قالب ہوگا اگر $(A)^t = A$

$$\text{مثلاً (i) اگر } M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \text{ ہو تو } M^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} = M$$

پس قالب M ایک سمٹریک قالب ہے۔

$$\text{(ii) اگر } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ ہو تو } A^t = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} \neq A$$

پس قالب A ایک سمٹریک قالب نہیں ہے۔

(Skew Symmetric Matrix) سکیو سمٹریک قالب (ix)

ایک مربعی قالب A کو سکیو سمٹریک قالب کہا جاتا ہے اگر $(A)^t = -A$

$$\text{مثلاً اگر } A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ ہو تو}$$

$$(A)^t = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -(-2) & 0 & -1 \\ -(-3) & -(-1) & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

پس A ایک سکیوسٹریک قالب ہے۔

(x) وتری قالب (Diagonal Matrix)

ایسا مربعی قالب جس میں وتر کے ارکان میں سے کم از کم ایک رکن غیر صفر ہو اور باقی تمام ارکان صفر ہوں وتری قالب کہلاتا ہے۔

$$\text{مثال کے طور پر } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ اور } C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ تینوں قالب}$$

وتری قالب ہیں جن کا مرتبہ 3-by-3 ہے۔

$$\text{قالب } M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ اور } N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ وتری قالب ہیں جن کا مرتبہ 2-by-2 ہے۔}$$

(xi) سکیلر قالب (Scalar Matrix)

ایسا وتری قالب جس میں وتر کے تمام ارکان یا اندراج یکساں ہوں سکیلر قالب کہلاتا ہے۔

$$\text{مثال کے طور پر قالب } \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \text{ ایک سکیلر قالب ہے۔ اگر } k \neq 0$$

$$\text{قالب } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ اور } C = [5] \text{ تمام سکیلر قالب ہیں۔}$$

جن میں A کا مرتبہ 3-by-3، B کا مرتبہ 2-by-2 اور C کا مرتبہ 1-by-1 ہے۔

(xii) وحدانی یا ضربی ذاتی قالب (Multiplicative Identity Matrix)

ایک وتری قالب جو سکیلر قالب بھی ہو اور ہر وتری رکن 1 ہو وحدانی یا ضربی ذاتی قالب کہلاتا ہے جس کو 'I' سے

$$\text{ظاہر کیا جاتا ہے۔} \quad \text{مثلاً (i) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ وحدانی یا ضربی ذاتی قالب ہے جس کا مرتبہ 3-by-3 ہے۔}$$

$$\text{وحدانی یا ضربی ذاتی قالب کا مرتبہ 2-by-2 ہے۔ (ii) } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(iii) $C = [1]$ وحدانی یا ضربی ذاتی قالب کا مرتبہ 1-by-1 ہے۔

نوٹ: (i) سکیلر اور وحدانی قالب تمام وتری قالب ہیں۔
(ii) ہر وتری قالب ایک سکیلر یا وحدانی قالب نہیں۔

مشق 1.2

1- دیے ہوئے مندرجہ ذیل قالبوں میں سے (i) وحدانی قالبوں (ii) قطاری قالبوں (iii) کالمی قالبوں اور (iv) صفری قالبوں کی شناخت اور تصدیق بھی کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = [2 \quad 3 \quad 4], \quad C = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = [0], \quad F = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

2- نیچے دیے ہوئے قالبوں میں سے (a) مربعی قالبوں (b) مستطیلی قالبوں (c) قطاری قالبوں (d) کالمی قالبوں (e) وحدانی قالبوں اور (f) صفری قالبوں کی شناخت کیجیے۔

$$(i) \begin{bmatrix} -8 & 2 & 7 \\ 12 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad (ii) \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (iii) \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (v) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad (vi) [3 \quad 10 \quad -1]$$

$$(vii) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (viii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (ix) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3- نیچے دیے ہوئے قالبوں میں سے وتری، سکیلر اور وحدانی قالبوں کی شناخت کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad E = \begin{bmatrix} 5-3 & 0 \\ 0 & 1+1 \end{bmatrix}$$

4- نیچے دیے ہوئے A، B، C، D اور E ماتریکسوں کے بالترتیب منفی قالب معلوم کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

5- نیچے دیے ہوئے ماتریکسوں کے ٹرانسپوز قالب معلوم کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad B = [5 \ 1 \ -6], \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

6- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ تو تصدیق کیجیے کہ

(i) $(A^t)^t = A$

(ii) $(B^t)^t = B$

1.3 **قالبوں کی جمع اور تفریق (Addition and Subtraction of Matrices)**

1.3.1 **قالبوں کی جمع (Addition of Matrices)**

اگر A اور B دو قالب ہوں جن کے ارکان یا اندراج حقیقی اعداد ہوں تو A اور B جمعی خاصیت کے حامل

ہوں گے اگر وہ ہم مرتبہ قالب ہوں۔ جیسا کہ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

ہم مرتبہ ہیں۔ اس لیے ان میں جمعی خاصیت ہے اور حاصل جمع $A + B$ میں ہر رکن قالب A کے ہر رکن میں

قالب B کا متناظرہ رکن جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2+(-2) & 3+3 & 0+4 \\ 1+1 & 0+2 & 6+3 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 4 \\ 2 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

پس

(iii) $C = [1]$ وحدانی یا ضربی ذاتی قالب کا مرتبہ 1-by-1 ہے۔

نوٹ: (i) سکیلر اور وحدانی قالب تمام وتری قالب ہیں۔
(ii) ہر وتری قالب ایک سکیلر یا وحدانی قالب نہیں۔

مشق 1.2

1- دیے ہوئے مندرجہ ذیل قالبوں میں سے (i) وحدانی قالبوں (ii) قطاری قالبوں (iii) کالمی قالبوں اور (iv) صفری قالبوں کی شناخت اور تصدیق بھی کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = [2 \quad 3 \quad 4], \quad C = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = [0], \quad F = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

2- نیچے دیے ہوئے قالبوں میں سے (a) مربعی قالبوں (b) مستطیلی قالبوں (c) قطاری قالبوں (d) کالمی قالبوں (e) وحدانی قالبوں اور (f) صفری قالبوں کی شناخت کیجیے۔

$$(i) \begin{bmatrix} -8 & 2 & 7 \\ 12 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad (ii) \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (iii) \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (v) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad (vi) [3 \quad 10 \quad -1]$$

$$(vii) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (viii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (ix) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3- نیچے دیے ہوئے قالبوں میں سے وتری، سکیلر اور وحدانی قالبوں کی شناخت کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad E = \begin{bmatrix} 5-3 & 0 \\ 0 & 1+1 \end{bmatrix}$$

4- نیچے دیے ہوئے A، B، C اور E قابلوں کے باالترتیب مٹھی قابل معلوم کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

5- نیچے دیے ہوئے قابلوں کے ٹرانسپوز قابل معلوم کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad B = [5 \ 1 \ -6], \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

6- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ تو تصدیق کیجیے کہ

(i) $(A^t)^t = A$

(ii) $(B^t)^t = B$

1.3 قابلوں کی جمع اور تفریق (Addition and Subtraction of Matrices)

1.3.1 قابلوں کی جمع (Addition of Matrices)

اگر A اور B دو قابل ہوں جن کے ارکان یا اندراج حقیقی اعداد ہوں تو A اور B جمعی خاصیت کے حامل

ہوں گے اگر وہ ہم مرتبہ قابل ہوں۔ جیسا کہ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

ہم مرتبہ ہیں۔ اس لیے ان میں جمعی خاصیت ہے اور حاصل جمع $A + B$ میں ہر رکن قابل A کے ہر رکن میں

قابل B کا متناظرہ رکن جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2+(-2) & 3+3 & 0+4 \\ 1+1 & 0+2 & 6+3 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 4 \\ 2 & 2 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{پس}$$

1.3.2 قالموں كى تفریق (Subtraction of Matrices)

كوفى سے بهى دوهم مرتبه قالموں A اور B ميں سے قالم B كا تفریق قالم A سے ايك ايسے قالم كا حصول هوگا جس كے اركان قالم B كے اركان كو قالم A كے متناظره اركان ميں سے تفریق كر كے حاصل كيے گئے هوں۔ جس كو A - B سے ظاهر كرتے هيں۔

مثلاً اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ جو هم مرتبه قالم هيں۔

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \text{ پس}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2-0 & 3-2 & 4-2 \\ 1-(-1) & 5-4 & 0-3 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

مثالیں: كچھ مثالوں كو حل كر كے طلبا كى راهنمائى كي گئي ہے تاكه ان كو قالموں كو جمع اور تفریق كرنا كمل سمجھ ميں آجائے۔

$$\text{تو } B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 7 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \text{ اگر (a)}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+0 & 2+3 & 7+4 \\ 0+1 & -1+(-1) & 3+2 \\ 2+5 & 5-2 & 1+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 11 \\ 1 & -2 & 5 \\ 7 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{اور } A - B = A + (-B) \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -3 & -4 \\ -1 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+0 & 2-3 & 7-4 \\ 0-1 & -1+1 & 3-2 \\ 2-5 & 5+2 & 1-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -3 & 7 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\text{ہو تو } B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{اور } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{اگر (b)}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 2+3 \\ -1+1 & 3-2 \\ 0+3 & 2+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

اور

$$A - B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1-2 & 2-3 \\ -1-1 & 3+2 \\ 0-3 & 2-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 5 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$

نوٹ:۔۔۔ جمع یا تفریق کے عمل سے نئے قالب کا درجہ تبدیل نہیں ہوتا۔

1.3.3 دیے ہوئے قالب پر ایک حقیقی عدد کا ضربی عمل

اگر قالب A کو حقیقی عدد k سے ضرب دینا ہو تو قالب A کے ہر رکن کو k سے ضرب دینے سے نیا قالب kA حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مثلاً اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \text{ ایک قالب کو } k = -2 \text{ ایک حقیقی عدد سے ضرب دینے سے حاصل قالب}$$

1.3.2 قالموں کی تفریق (Subtraction of Matrices)

کوئی سے بھی دو ہم مرتبہ قالموں A اور B میں سے قالم B کا تفریقی قالم A سے ایک ایسے قالم کا حصول ہوگا جس کے ارکان قالم B کے ارکان کو قالم A کے متناظرہ ارکان میں سے تفریق کر کے حاصل کیے گئے ہوں۔ جس کو A - B سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثلاً اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ جو ہم مرتبہ قالم ہیں۔

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \text{ پس}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2-0 & 3-2 & 4-2 \\ 1-(-1) & 5-4 & 0-3 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

مثالیں: کچھ مثالوں کو حل کر کے طلباء کی راہنمائی کی گئی ہے تاکہ ان کو قالموں کو جمع اور تفریق کرنا مکمل سمجھ میں آجائے۔

$$\text{تو } B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 7 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \text{ اگر (a)}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+0 & 2+3 & 7+4 \\ 0+1 & -1+(-1) & 3+2 \\ 2+5 & 5-2 & 1+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 11 \\ 1 & -2 & 5 \\ 7 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{اور } A - B = A + (-B) \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -3 & -4 \\ -1 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+0 & 2-3 & 7-4 \\ 0-1 & -1+1 & 3-2 \\ 2-5 & 5+2 & 1-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -3 & 7 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\text{تو } B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{اور } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{اگر (b)}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 2+3 \\ -1+1 & 3-2 \\ 0+3 & 2+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

اور

$$A - B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1-2 & 2-3 \\ -1-1 & 3-2 \\ 0-3 & 2-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$

نوٹ:۔۔ جمع یا تفریق کے عمل سے نئے قالب کا درجہ تبدیل نہیں ہوتا۔

1.3.3 دیے ہوئے قالب پر ایک حقیقی عدد کا ضربی عمل

اگر قالب A کو حقیقی عدد k سے ضرب دینا ہو تو قالب A کے ہر رکن کو k سے ضرب دینے سے نیا قالب kA حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مثلاً اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{اور } k = -2 \text{ ایک حقیقی عدد سے ضرب دینے سے حاصل قالب}$$

$$kA = (-2)A$$

$$= (-2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-2)(1) & (-2)(-1) & (-2)(4) \\ (-2)(2) & (-2)(-1) & (-2)(0) \\ (-2)(-1) & (-2)(3) & (-2)(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -8 \\ -4 & 2 & 0 \\ 2 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

چونکہ قالب A کا مرتبہ 3-by-3 ہے اور قالب kA کا مرتبہ بھی 3-by-3 ہی ہے۔
پس قالب A کو رکن k سے ضرب دینے سے kA کے مرتبہ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

1.3.4 قالبوں کی جمعی خاصیتوں کے قوانین مبادلہ اور تلازم

(a) قانون مبادلہ بلحاظ جمع (Additive Commutative Law)

اگر A اور B دوہم مرتبہ قالب ہوں تو ان کی جمعی خاصیت $A + B = B + A$ کو قانون مبادلہ کہتے ہیں۔

$$\text{مثلاً اگر } B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \text{ تو}$$

$$= \begin{bmatrix} 2+3 & 3-2 & 0+5 \\ 5-1 & 6+4 & 1+1 \\ 2+4 & 1+2 & 3-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 4 & 10 & 2 \\ 6 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

اسی طرح

$$B + A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 4 & 10 & 2 \\ 6 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A + B = B + A$$

لہذا

پس مبادلہ خاصیت بلحاظ جمع کے قانون کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

(b) قانون تلازم بلحاظ جمع (Associative Law under Addition)

اگر A، B اور C تینوں قالب ہم مرتبہ ہوں اور جمعی خاصیت $(A + B) + C = A + (B + C)$ رکھتے

ہوں تو اس خاصیت کو جمعی قانون تلازم یا قانون تلازم بلحاظ جمع کہتے ہیں۔

$$\text{اگر } C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \text{، } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(A+B)+C = \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2+3 & 3-2 & 0+5 \\ 5-1 & 6+4 & 1+1 \\ 2+4 & 1+2 & 3-4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 4 & 10 & 2 \\ 6 & 3 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 8 \\ 2 & 10 & 6 \\ 7 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A+(B+C) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3+1 & -2+2 & 5+3 \\ -1-2 & 4+0 & 1+4 \\ 4+1 & 2+2 & -4+0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 & 8 \\ -3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 8 \\ 2 & 10 & 6 \\ 7 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(A+B)+C = A+(B+C) \quad \text{لہذا}$$

پس قانون تلازم بلحاظ جمع کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

1.3.5 قالب کا جمعی ذاتی قالب (Additive Identity of a Matrix)

اگر A اور B دو ہم مرتبہ قالب ہوں اور بلحاظ جمعی خاصیت $A+B = A = B + A$ ہو تو قالب B قالب A کا جمعی ذاتی قالب کہلاتا ہے۔

کسی بھی قالب A کے ہم مرتبہ صفری قالب O قالب A کا جمعی ذاتی قالب کہلاتا ہے

$$A+O = A = O+A \quad \text{جبکہ}$$

$$\text{مثلاً اگر } O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A+O = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = A$$

$$O+A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = A \text{ اور}$$

$$A+O = A = O+A \quad \text{پس ثابت ہوا کہ}$$

$$kA = (-2)A$$

$$= (-2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-2)(1) & (-2)(-1) & (-2)(4) \\ (-2)(2) & (-2)(-1) & (-2)(0) \\ (-2)(-1) & (-2)(3) & (-2)(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -8 \\ -4 & 2 & 0 \\ 2 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

چونکہ قالب A کا مرتبہ 3-by-3 ہے اور قالب kA کا مرتبہ بھی 3-by-3 ہی ہے۔
پس قالب A کو رکن k سے ضرب دینے سے kA کے مرتبہ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

1.3.4 قالبوں کی جمعی خاصیتوں کے قوانین مبادلہ اور تلازم

(a) قانون مبادلہ بلحاظ جمع (Additive Commutative Law)

اگر A اور B دو ہم مرتبہ قالب ہوں تو ان کی جمعی خاصیت $A + B = B + A$ کو قانون مبادلہ کہتے ہیں۔

$$B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ اگر مثلاً}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \text{ تو}$$

$$= \begin{bmatrix} 2+3 & 3-2 & 0+5 \\ 5-1 & 6+4 & 1+1 \\ 2+4 & 1+2 & 3-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 4 & 10 & 2 \\ 6 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

اسی طرح

$$B + A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 4 & 10 & 2 \\ 6 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A + B = B + A$$

لہذا

پس مبادلہ خاصیت بلحاظ جمع کے قانون کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

(b) قانون تلازم بلحاظ جمع (Associative Law under Addition)

اگر A، B اور C تینوں قالب ہم مرتبہ ہوں اور جمعی خاصیت $(A + B) + C = A + (B + C)$ رکھتے

ہوں تو اس خاصیت کو جمعی قانون تلازم یا قانون تلازم بلحاظ جمع کہتے ہیں۔

$$\text{اگر } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ اور } B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \text{ اور } C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ ہوں تو}$$

$$\begin{aligned}
(A+B)+C &= \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2+3 & 3-2 & 0+5 \\ 5-1 & 6+4 & 1+1 \\ 2+4 & 1+2 & 3-4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 4 & 10 & 2 \\ 6 & 3 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 8 \\ 2 & 10 & 6 \\ 7 & 5 & -1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A+(B+C) &= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \right) \\
&= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3+1 & -2+2 & 5+3 \\ -1-2 & 4+0 & 1+4 \\ 4+1 & 2+2 & -4+0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 & 8 \\ -3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 8 \\ 2 & 10 & 6 \\ 7 & 5 & -1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

لہذا

پس قانون تلازم بلحاظ جمع کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

1.3.5 قالب کا جمعی ذاتی قالب (Additive Identity of a Matrix)

اگر A اور B دو ہم مرتبہ قالب ہوں اور بلحاظ جمعی خاصیت $A+B = A = B+A$ ہو تو قالب B قالب A کا جمعی ذاتی قالب کہلاتا ہے۔

کسی بھی قالب A کے ہم مرتبہ صفری قالب O قالب A کا جمعی ذاتی قالب کہلاتا ہے

$$A+O = A = O+A$$

جبکہ

$$\text{مثلاً اگر } O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \text{ ہو تو}$$

$$A+O = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = A$$

$$O+A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = A \text{ اور}$$

$$A+O = A = O+A$$

پس ثابت ہوا کہ

1.3.6 قالب کا جمعی معکوس (Additive Inverse of a Matrix)

اگر A اور B دو ہم مرتبہ قالب ہوں جو مندرجہ ذیل جمعی خاصیت کے حامل ہوں

$$A + B = O = B + A$$

تو قالب A اور B دونوں ایک دوسرے کے جمعی معکوس کہلاتے ہیں۔ پس قالب A کا جمعی معکوس وہ قالب ہوگا جو قالب A کے تمام غیر صفری ارکان کو ان کے جمعی معکوس یعنی منفی ارکان میں بدل دینے سے حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مثلاً اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ ہو تو}$$

$$B = (-A) = - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

جو قالب A کا جمعی معکوس قالب ہے۔ اس کی تصدیق یوں کی جاسکتی ہے۔

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1)+(-1) & (2)+(-2) & (1)+(-1) \\ 0+0 & (-1)+(1) & (-2)+(2) \\ (3)+(-3) & (1)+(-1) & 0+0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

اور

$$B + A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (-1)+(1) & (-2)+(2) & (-1)+(1) \\ 0+0 & (1)+(-1) & (2)+(-2) \\ (-3)+(3) & (-1)+(1) & 0+0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

$$A + B = O = B + A$$

چونکہ

پس A اور B ایک دوسرے کے جمعی معکوس ہیں۔

1.3 مشق

1- درج ذیل قابلوں میں سے کون کون سے قالب ایک دوسرے سے جمعی خاصیت رکھتے ہیں نشانہ ہی کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2+1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1+1 & -4 \\ 3+2 & 2+1 \end{bmatrix}$$

2- مندرجہ ذیل قابلوں کے جمعی معکوس معلوم کیجیے۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad F = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

3- اگر $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $C = [1 \ -1 \ 2]$ اور $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ہو تو ان کی مدد سے

مندرجہ ذیل قالب معلوم کیجیے۔

$$(i) \quad A + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (ii) \quad B + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (iii) \quad C + [-2 \ 1 \ 3]$$

$$(iv) \quad D + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (v) \quad 2A \quad (vi) \quad (-1)B$$

$$(vii) \quad (-2)C \quad (viii) \quad 3D \quad (ix) \quad 3C$$

4- قابلوں کے جمعی اور تفریق عمل کی مدد سے حاصل قالب معلوم کیجیے۔

$$(i) \quad \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (ii) \quad \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad [2 \ 3 \ 1] + ([1 \ 0 \ 2] - [2 \ 2 \ 2]) \quad (iv) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(v) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (vi) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ اور } B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ اگر } -5$$

درج ذیل قوانین کی تصدیق کیجیے۔

- (i) $A + C = C + A$ (ii) $A + B = B + A$
 (iii) $B + C = C + B$ (iv) $A + (B + A) = 2A + B$
 (v) $(C - B) + A = C + (A - B)$ (vi) $2A + B = A + (A + B)$
 (vii) $(C - B) - A = (C - A) - B$ (viii) $(A + B) + C = A + (B + C)$
 (ix) $A + (B - C) = (A - C) + B$ (x) $2A + 2B = 2(A + B)$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 8 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ اگر } -6$$

(i) $3A - 2B$ (ii) $2A^t - 3B^t$

$$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 18 & 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & a \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & b \\ 8 & -4 \end{bmatrix} \text{ اگر } -7$$

تو ارکان a اور b کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ اگر } -8$$

(i) $(A - B)^t = A^t - B^t$ (ii) $(A + B)^t = A^t + B^t$

(iii) $A + A^t$ ایک سیمٹرک قالب ہے (iv) $A - A^t$ ایک سکیوسیمٹرک قالب ہے۔

(v) $B + B^t$ ایک سیمٹرک قالب ہے۔ (vi) $B - B^t$ ایک سکیوسیمٹرک قالب ہے۔

1.4 قالبوں کی ضرب (Multiplication of Matrices)

دیے ہوئے دو قالبوں A اور B کو باہمی ضرب دینے کے عمل سے ایک تیسرا قالب AB یا BA حاصل ہوتا ہے۔ قالب A کو B سے ضرب دینے کے لیے AB اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قالب A میں کالموں کی تعداد قالب B میں قطاروں کی تعداد کے برابر ہو۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \text{ میں دو کالم ہیں اور } B = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ میں قطاروں کی تعداد دو ہے}$$

اس لیے قالب A کو قالب B سے ضرب دے کر قالب AB حاصل ہوتا ہے۔

ضرب کے عمل کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے دی جاتی ہے۔

$$(i) \text{ اگر } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ اور } B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ ہو تو } A \text{ میں دو کالم اور } B \text{ میں دو قطاریں ہیں}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 2 + 2 \times 3 & 1 \times 0 + 2 \times 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 2 + 6 & 0 + 2 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 8 & 2 \end{bmatrix}$$

جو ایک 1-by-2 قالب ہے۔

(ii) اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ہو تو چونکہ A میں کالموں کی تعداد دو اور قالب B میں قطاروں کی تعداد بھی دو ہے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times (-1) + 3 \times 3 & 1 \times 0 + 3 \times 2 \\ 2 \times (-1) + (-3) \times 3 & 2 \times 0 + (-3) \times 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 + 9 & 0 + 6 \\ -2 - 9 & 0 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ -11 & -6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

پس AB ایک 2-by-2 قالب ہے

یاد رکھیے کہ BA بھی حاصل قالب 2-by-2 ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ $AB = BA$ ہو۔

1.4.1 قالبوں کی خاصیت تلازم بلحاظ ضرب (Associative Law under Multiplication) اگر A، B اور C تین قالب ہوں جن پر باہمی ضرب کا عمل ممکن ہو تو درج ذیل قانون ضربی قانون تلازم کہلاتا ہے، اگر $(AB)C = A(BC)$ ہو۔

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ مثال کے طور پر اگر}$$

$$\text{بائیں طرف } = (AB)C$$

$$= \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 0 + 3 \times 3 & 2 \times 1 + 3 \times 1 \\ -1 \times 0 + 0 \times 3 & -1 \times 1 + 0 \times 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 + 9 & 2 + 3 \\ 0 + 0 & -1 + 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \times 2 + 5 \times (-1) & 9 \times 2 + 5 \times 0 \\ 0 \times 2 + (-1) \times (-1) & 0 \times 2 + (-1) \times 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 18 - 5 & 18 + 0 \\ 0 + 1 & 0 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 18 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{دائیں طرف } = A(BC) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \times 2 + 1 \times (-1) & 0 \times 2 + 1 \times 0 \\ 3 \times 2 + 1 \times (-1) & 3 \times 2 + 1 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 2(-1)+3 \times 5 & 2 \times 0+3 \times 6 \\ (-1)(-1)+0 \times 5 & -1 \times 0+0 \times 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2+15 & 0+18 \\ 1+0 & 0+0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 13 & 18 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = (AB)C$$

پس قابلوں کے قانون تلازم بلحاظ ضرب کی تصدیق ہوتی ہے۔

1.4.2 قابلوں کی جمع اور تفریق پر ضرب کے تقسیمی قوانین

(Distributive Laws of Multiplication over Addition and Subtraction)

(a) اگر تین قالب A، B اور C ہوں تو ان کے ضرب کے جمع پر تقسیمی قوانین درج ذیل ہیں:

(بایاں تقسیمی قانون) $A(B + C) = AB + AC$ (i)

(دایاں تقسیمی قانون) $(A + B)C = AC + BC$ (ii)

(i) اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ اور $C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ہوں تو

بائیں طرف $= A(B+C)$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0+2 & 1+2 \\ 3-1 & 1+0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 3 \times 2 & 2 \times 3 + 3 \times 1 \\ -1 \times 2 + 0 \times 2 & -1 \times 3 + 0 \times 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4+6 & 6+3 \\ -2+0 & -3+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

دائیں طرف $= AB + AC$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 0 + 3 \times 3 & 2 \times 1 + 3 \times 1 \\ -1 \times 0 + 0 \times 3 & -1 \times 1 + 0 \times 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 3 \times (-1) & 2 \times 2 + 3 \times 0 \\ -1 \times 2 + 0 \times (-1) & -1 \times 2 + 0 \times 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9+1 & 5+4 \\ 0-2 & -1-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \text{بائیں طرف}$$

پس ظاہر ہوا کہ $A(B + C) = AB + AC$

(ii) اوپر دی ہوئی وضاحت کے مطابق قانون (ii) کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ

$$(A + B)C = AC + BC$$

(b) قابلوں کی تفریق پر ضرب کے تقسیمی قوانین

(بایاں تقسیمی قانون) $A(B - C) = AB - AC$ (i)

(دایاں تقسیمی قانون) $(A - B)C = AC - BC$ (ii)

اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ اور $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ہوں تو (i)

بائیں طرف $= A(B - C)$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} -1-2 & 1-1 \\ 1-1 & 0-2 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (2)(-3)+(3)(0) & 2(0)+3(-2) \\ (0)(-3)+1(0) & 0(0)+(1)(-2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6+0 & 0-6 \\ 0+0 & 0-2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6 & -6 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

دائیں طرف $= AB - AC$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2(-1)+3(1) & 2(1)+3(0) \\ 0(-1)+1(1) & 0(1)+1(0) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 3 \times 1 & 2 \times 1 + 3 \times 2 \\ 0 \times 2 + 1 \times 1 & 0 \times 1 + 1 \times 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1-7 & 2-8 \\ 1-1 & 0-2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6 & -6 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \text{بائیں طرف}$$

پس ظاہر ہوا کہ $A(B - C) = AB - AC$

(ii) اوپر دی ہوئی وضاحت کے مطابق قانون (ii) کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ

$$(A - B)C = AC - BC$$

1.4.3 قابلوں کا ضربی قانون مبادلہ (Commutative Law of Multiplication of Matrices)

اگر $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ دو قالب ہوں تو

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \times (-2) \\ 2 \times 1 + 3 \times 0 & 2 \times 0 + 3 \times (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$$

اور

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 0 + 0 \times 2 & 1 \times 1 + 0 \times 3 \\ 0 \times 0 + (-2) \times 2 & 0 \times 1 + 3 \times (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$$

پس $AB \neq BA$ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قابلوں کا ضربی قانون مبادلہ عام طور پر لاگو نہیں ہوتا۔

اگر قالب A اور B دونوں وتری قالب ہوں تو خاص طور پر ضربی قانون مبادلہ لاگو رہتا ہے۔ مثلاً

اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ دونوں وتری قالب ہوں تو

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times (-3) + 0 \times 0 & 2 \times 0 + 0 \times 4 \\ 0 \times (-3) + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -3 \times 2 + 0 \times 0 & -3 \times 0 + 0 \times 1 \\ 0 \times 2 + 4 \times 0 & 0 \times 0 + 4 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = AB$$

پس $AB = BA$ اگر قالب A اور B خاص طور پر وتری قالب ہوں۔

1.4.4 ضربی ذاتی قالب (Multiplicative Identity of a Matrix)

دو قالب A اور B ہوں تو قالب B قالب A کا ضربی ذاتی قالب کہلائے گا۔ اگر

$$AB = A = BA$$

مثال کے طور پر اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ہو تو

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 0 & 1 \times 0 + 2 \times 1 \\ 0 \times 1 + (-3) \times 0 & 0 \times 0 + (-3) \times 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = A$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 & 1 \times 2 + 0 \times (-3) \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 & 0 \times 2 + 1 \times (-3) \end{bmatrix} \text{ اور}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = A$$

پس $AB = A = BA$ اور B قابل A کا ضربی ذاتی قابل ہے۔

1.4.5 ٹرانسپوز قانون $(AB)^t = B^t A^t$ کی تصدیق

اگر A اور B دو قابل ہوں جن کے ٹرانسپوز بالترتیب A^t اور B^t ہوں تو $(AB)^t = B^t A^t$

$$\text{مثلاً } B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ اور } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ ہوں تو}$$

$(AB)^t =$ بائیں طرف

$$= \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \right)^t = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 1 \times (-2) & 2 \times 3 + 1 \times 0 \\ 0 \times 1 + (-1) \times (-2) & 0 \times 3 + (-1) \times 0 \end{bmatrix}^t$$

$$= \begin{bmatrix} 2-2 & 6+0 \\ 0+2 & 0+0 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$B^t A^t =$ دائیں طرف

$$(A)^t = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (B)^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^t A^t = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 2 + (-2) \times 1 & 1 \times 0 + (-2) \times (-1) \\ 3 \times 2 + 0 \times 1 & 3 \times 0 + 0 \times (-1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2-2 & 0+2 \\ 6+0 & 0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \text{بائیں طرف}$$

$$(AB)^t = B^t A^t$$

پس

1.4 مشق

1- کیا درج ذیل ضربی حاصل قابل ممکن ہے یا نہیں؟

(i) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$

(ii) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

(iii) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

(iv) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$(v) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$ ہو تو (i) AB اور (ii) BA معلوم کیجیے۔ -2

مندرجہ ذیل ضربی حاصل معلوم کیجیے۔ -3

$$(i) [1 \ 2] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (ii) [1 \ 2] \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \end{bmatrix} \quad (iii) [-3 \ 0] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(iv) [6 \ -0] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (v) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

مندرجہ ذیل کا ضربی حاصل معلوم کیجیے۔ -4

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -\frac{5}{2} \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

اگر $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ اور $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ہو تو درج ذیل کی -5

تصدیق کیجیے (اگر ممکن ہو)۔

(i) $AB = BA$

(ii) $A(BC) = (AB)C$

(iii) $A(B + C) = AB + AC$

(iv) $A(B - C) = AB - AC$

قالہوں $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ اور $C = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}$ -6

کی مدد سے درج ذیل کی تصدیق کیجیے۔

(i) $(AB)^t = B^t A^t$

(ii) $(BC)^t = C^t B^t$

1.5 قالب کا ضربی معکوس (Multiplicative Inverse of a Matrix)

1.5.1 ایک 2-by-2 قالب کا مقطع (Determinant of a 2-by-2 Matrix)

ایک مربعی 2-by-2 قالب $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ کے مقطع کو $|A|$ یا $\det A$ سے

ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

$$|A| = \det A = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \lambda \in \mathbb{R}$$

مثلاً اگر $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ تو

$$|B| = \det B = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times 3 - (-2)(1) \\ = 3 + 2 = 5$$

اسی طرح اگر $M = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ہو تو اس کا مقطع ہوگا:

$$\det M = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 1 \times 6 = 6 - 6 = 0$$

1.5.2 نادر اور غیر نادر قالب (Singular and Non-Singular Matrix)

ایک مربعی قالب A نادر قالب کہلاتا ہے اگر اس کا مقطع $|A|$ صفر کے مساوی ہو یا $|A| = 0$

مثال کے طور پر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ایک نادر قالب ہے۔ کیونکہ

$$|A| = 1 \times 0 - 0 \times 2 = 0$$

ایک مربعی قالب A غیر نادر قالب کہلاتا ہے اگر A کا مقطع $|A|$ صفر کے مساوی نہ ہو یا $|A| \neq 0$

مثلاً $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ایک غیر نادر قالب ہے کیونکہ

$$|A| = 1 \times 2 - 0 \times 1 = 2 \neq 0$$

نوٹ: ہر مربعی قالب جس کے ارکان حقیقی عدد ہوں نادر قالب یا غیر نادر قالب ہوتا ہے

1.5.3 قالب کا ایڈجائنٹ (Adjoint of a Matrix)

اگر قالب $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ایک مربعی قالب ہو تو اس کا ایڈجائنٹ قالب ایک ایسا قالب ہے جو A کے

وتری ارکان کو باہمی تبدیل کرنے کے ساتھ غیر وتری ارکان کو منفی ارکان میں بدل دینے سے حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \text{جیسا کہ}$$

مثلاً (i) اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ہو تو $\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

(ii) اگر $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ ہو تو $\text{Adj } B = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

1.5.4 غیر نادر قالب کا ضربی معکوس (Multiplicative Inverse of a Non-Singular Matrix)

اگر دو غیر نادر قالب A اور B ہم مرتبہ مربعی قالب ہوں تو A اور B دونوں ایک دوسرے کا ضربی معکوس کہلاتے ہیں۔ یعنی

$$AB = BA = I$$

اگر قالب A کا ضربی معکوس A^{-1} سے ظاہر کیا جائے تو $B = A^{-1}$ ہے۔

$$\boxed{AA^{-1} = A^{-1}A = I}$$

پس

قالب A کا ضربی معکوس A^{-1} معلوم کرنا ممکن ہوگا اگر A ایک غیر نادر قالب ہو۔

1.5.5 ایڈجائنٹ کی مدد سے قالب کا ضربی معکوس (Multiplicative Inverse by Adjoint Method)

اگر $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ایک مربعی 2-by-2 قالب ہو تو قالب M کا ضربی معکوس معلوم کرنے کے لیے پہلے قالب M کا غیر نادر ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ایک غیر نادر قالب کا مقطع غیر صفر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے M کا مقطع معلوم کر کے اس کے غیر صفر ہونے کی تصدیق کی جائے۔

$$|M| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0 \quad \text{یعنی}$$

$$\text{Adj } M = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \text{اور}$$

$$M^{-1} = \frac{\text{Adj } M}{|M|} \quad \text{پس قالب M کا ضربی معکوس متعارف اور ظاہریوں کیا جاتا ہے}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{مثلاً اگر}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = -6 - (-1) = -6 + 1 = -5 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} \quad \text{پس}$$

$$= \frac{\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}{-5} = \frac{-1}{5} \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{-1}{5} & \frac{-2}{5} \end{bmatrix}$$

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{-1}{5} & \frac{-2}{5} \end{bmatrix} \quad \text{چونکہ}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times \frac{3}{5} - \frac{1}{5} & \frac{2}{5} - \frac{2}{5} \\ -\frac{3}{5} + \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} + \frac{6}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6}{5} - \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{6}{5} - \frac{1}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I = A^{-1}A$$

$$\boxed{I^{-1} = I} \quad \text{نوٹ:}$$

1.5.6 تصدیق کیجیے کہ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ہم مرتبہ 2-by-2 غیر نادر قالب ہوں

تو $\det B = 0 \times 2 - 3(-1) = 3 \neq 0$ اور $\det A = 3 \times 0 - (-1) \times 1 = 1 \neq 0$

پس A^{-1} اور B^{-1} موجود ہوں گے۔ اسی طرح $(AB)^{-1}$ کا حصول بھی ممکن ہوگا۔ اس لیے:

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 0 + 1 \times 3 & 3 \times (-1) + 1 \times 2 \\ -1 \times 0 + 0 \times 3 & -1 \times (-1) + 0 \times 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اور

$$\Rightarrow \det(AB) = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \times 1 - (-1) \times 0 = 3 \neq 0$$

پس

$$\text{بائیں طرف} = (AB)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اب $B^{-1}A^{-1}$ کے حصول کے لیے ہم B^{-1} اور A^{-1} حاصل کرتے ہیں۔ یعنی

$$B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{دائیں طرف} = B^{-1}A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \times 0 + 1 & 2 \times (-1) + 1 \times 3 \\ -3 \times 0 + 0 \times 1 & -3 \times (-1) + 0 \times 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0+1 & -2+3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (AB)^{-1} = \text{بائیں طرف}$$

پس قانون $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ کی تصدیق مکمل ہوئی۔

مشق 1.5

1- درج ذیل قالبوں کے مقطع معلوم کیجیے۔

(i) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

(ii) $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(iii) $C = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

(iv) $D = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

2- نیچے دیے ہوئے قابلوں میں سے کون سے نادر ہیں اور کون سے غیر نادر؟ الگ الگ کیجیے۔

(i) $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ (ii) $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$
 (iii) $C = \begin{bmatrix} 7 & -9 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (iv) $D = \begin{bmatrix} 5 & -10 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

3- نیچے دیے ہوئے قابلوں کے ضربی معکوس معلوم کیجیے (اگر ممکن ہو)۔

(i) $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ (ii) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$
 (iii) $C = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}$ (iv) $D = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

4- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ تو درج ذیل کی تصدیق کیجیے۔

(i) $A(\text{Adj } A) = (\text{Adj } A)A = (\det A)I$

(ii) $BB^{-1} = I = B^{-1}B$

5- قابلوں کے جوڑوں میں سے ثابت کیجیے کہ ہر ایک قالب دوسرے قالب کا ضربی معکوس ہے یا نہیں۔

(i) $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ اور $\begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

(ii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ اور $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

6- اگر $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ اور $D = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ تو تصدیق کیجیے کہ

(i) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

(ii) $(DA)^{-1} = A^{-1}D^{-1}$

1.6 دوہمزاد مساواتوں کا حل (Solution of Simultaneous Linear Equations)

دو مختلف متغیرات x اور y میں دو مختلف لیئر (linear) مساواتوں کو عام طور پر یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$ax + by = m$$

$$cx + dy = n$$

جبکہ a, b, c, d, m, n قدرتی اعداد ہیں

یہ مساواتیں باہم ایک ضابطے یا سسٹم (system) کا تصور دیتی ہیں۔

ذیل میں ہم ان مساواتوں کا باہم حل مندرجہ ذیل طریقوں سے معلوم کرتے ہیں۔

(i) مساواتوں کے قالب کے معکوس کے طریقہ سے (ii) کریمر کے قانون کی مدد سے

(i) دی ہوئی مساواتوں کے قالب کے معکوس قالب کا طریقہ

دیئے ہوئے سسٹم کی دو متغیرات x اور y میں دو مختلف مساواتیں

$$ax + by = m$$

$$cx + dy = n$$

اس سسٹم سے وابستہ ایک 2-by-2 قالب اور دوسرے 1-by-2 قالبوں کا تعلق کچھ یوں ظاہر کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$$

$$AX = B$$

یا

جبکہ

$$B = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix} \text{ اور } X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

چونکہ متغیرات x اور y کی قیمتوں کو جاننا سسٹم کا حل ہوگا اس لیے:

$$X = A^{-1}B$$

$$|A| = ad - bc$$

جبکہ

$$X = \frac{\text{Adj } A}{|A|} \times B \quad \therefore A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} \text{ اور } |A| \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}}{ad - bc}$$

یا

$$= \begin{bmatrix} \frac{dm - bn}{ad - bc} \\ \frac{-cm + an}{ad - bc} \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{dm - bn}{ad - bc}$$

پس

$$y = \frac{-cm + an}{ad - bc}$$

مطلوبہ حل ہے۔

اور

(ii) کریمر کا قانون (Cramer's Rule)

$$\text{ہو تو } ax + by = m$$

$$cx + dy = n$$

اگر

$$B = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix} \text{ اور } X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$AX = B$$

یعنی

$$X = A^{-1}B$$

یا

$$X = \frac{\text{Adj } A}{|A|} \times B \quad (|A| \neq 0)$$

یا

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}}{|A|} \quad \text{یا}$$

$$= \frac{\begin{bmatrix} dm - bn \\ -cm + an \end{bmatrix}}{|A|} \quad \text{یا}$$

$$x = \frac{dm - bn}{|A|} = \frac{|A_x|}{|A|} \quad \text{پس}$$

$$y = \frac{an - cm}{|A|} = \frac{|A_y|}{|A|}$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix} \quad \text{جبکہ}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix} \quad \text{اور}$$

مثال 1 دی ہوئی مساواتوں کو قابلیوں کے ضربی معکوس کی مدد سے باہم حل کیجیے۔

$$4x - 2y = 8$$

$$3x + y = -4$$

حل پہلا قدم : قابلیوں کی مدد سے دی ہوئی مساواتوں کو قابلی مساواتوں میں تبدیل کرنا

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{جیسا کہ}$$

دوسرا قدم : دی ہوئی مساواتوں میں متغیرات کے عددی سروں کا قالب

$$M = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det M = 4 \times 1 - 3(-2) = 4 + 6 = 10 \neq 0 \quad \text{جس کا مقطع}$$

پس M ایک غیر نادر قالب ہے جس کا ضربی معکوس ممکن ہے۔

$$MX = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{جس میں}$$

$$X = M^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{پس تیسرا قدم :}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 8 - 8 \\ -24 - 16 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 0 \\ -40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ اور}$$

قالبوں کے برابری کے تصور کے استعمال سے

$$\text{نتیجتاً } x=0 \text{ اور } y=-4 \text{ مطلوبہ حل ہے۔}$$

مثال 2 دی ہوئی مساواتوں کو کریمر کے قانون کی مدد سے حل کریں۔

$$3x - 2y = 1$$

$$-2x + 3y = 2$$

$$\text{حل چونکہ } A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, A_x = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \text{ اور } A_y = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

اور $|A| = 9 - 4 = 5 \neq 0$ اس لیے A غیر نادر قالب ہے۔

$$\text{پس } x = \frac{|A_x|}{|A|} \text{ اور } y = \frac{|A_y|}{|A|}$$

جبکہ

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{5} = \frac{3 + 4}{5} = \frac{7}{5}$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}}{5} = \frac{6 + 2}{5} = \frac{8}{5}$$

اور

$$\text{پس } x = \frac{7}{5} \text{ اور } y = \frac{8}{5} \text{ مطلوبہ حل ہے۔}$$

مثال 3 اگر ایک مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی کے تین گنا سے 6 سم کم ہو اور اس کا احاطہ 140 سم ہو تو مستطیل کی لمبائی

اور چوڑائی معلوم کیجیے۔

حل اگر مستطیل کی چوڑائی x سم ہو تو شرائط کے مطابق

$$\text{مستطیل کی لمبائی} = y = 3x - 6$$

$$\text{مستطیل کا احاطہ} = 2x + 2y = 140$$

$$x + y = 70 \text{ پس}$$

$$3x - y = 6 \text{ اور}$$

دونوں مساواتوں کو قالبوں کی شکل میں لکھنے سے

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times (-1) - 3 \times 1 = -1 - 3 = -4 \neq 0$$

اس لیے اس کا ایک مستقل حل ممکن ہے اور $X = A^{-1}B$ ہے۔

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} \quad \text{جبکہ}$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{-4} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 70 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \text{اور}$$

$$= \frac{-1}{4} \begin{bmatrix} -70-6 \\ -210+6 \end{bmatrix} = \frac{-1}{4} \begin{bmatrix} -76 \\ -204 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{76}{4} \\ \frac{204}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 51 \end{bmatrix}$$

پس قابلوں کی مساوی خاصیت کی مدد سے ہم حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 51 \end{bmatrix}$$

لہذا $x = 19$ سم x مستطیل کی چوڑائی

$y = 51$ سم y مستطیل کی لمبائی

حل کی درستگی کی تصدیق کے لیے

$$\text{مستطیل کا احاطہ} = p = 2 \times 19 + 2 \times 51$$

$$= 38 + 102$$

$$= 140 \text{ سم}$$

$$\text{مستطیل کی لمبائی} = y = 3(19) - 6 = 57 - 6 = 51 \text{ سم}$$

مشق 1.6

1- قابلوں کی مدد سے اگر ممکن ہو تو دی ہوئی لینیئر مساواتوں کے جوڑوں میں متغیرات x اور y کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(i) قابلوں کے معکوس کی مدد سے (ii) کریبر کے قانون کی مدد سے

(i) $2x - 2y = 4$

$3x + 2y = 6$

(ii) $2x + y = 3$

$6x + 5y = 1$

(iii) $4x + 2y = 8$

$3x - y = -1$

(iv) $3x - 2y = -6$

$5x - 2y = -10$

(v) $3x - 2y = 4$

$-6x + 4y = 7$

(vi) $4x + y = 9$

$-3x - y = -5$

(vii) $2x - 2y = 4$

$-5x - 2y = -10$

(viii) $3x - 4y = 4$

$x + 2y = 8$

نیچے دیے ہوئے عملی زندگی کے مسائل کو حل کیجیے۔

- (i) قالبوں کے معکوس کی مدد سے
- (ii) کریمر کے قانون کی مدد سے
- 2- اگر ایک مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی سے چار گنا ہو اور اس کا احاطہ 150 سم ہو تو اس مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کیجیے۔
- 3- ایک مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی میں 3.5 سم کا فرق ہے۔ ان دونوں اضلاع کی لمبائی معلوم کیجیے جبکہ مستطیل کا احاطہ 67 سم ہو۔
- 4- ایک مساوی الساقین مثلث کا تیسرا زاویہ باقی دو برابر زاویوں کے مجموعہ سے 16° کم ہے۔ مثلث کے تینوں زاویوں کی مقدار معلوم کریں۔
- 5- ایک قائمہ زاویہ مثلث میں ایک حادہ زاویہ کی مقدار دوسرے حادہ زاویہ کی مقدار کے دو گنا سے 12° زیادہ ہے۔ مثلث کے دونوں حادہ زاویوں کی مقدار معلوم کیجیے۔
- 6- دو کاریں سفر کے دوران ایک دوسرے سے 600 km فاصلہ پر ہیں اور ایک دوسری کی طرف سفر کر رہی ہیں۔ اگر ان کی رفتار میں 6 km فی گھنٹا کا فرق ہو اور $4\frac{1}{2}$ گھنٹے کے سفر کے بعد ان کے درمیان فاصلہ 123 km رہ جائے تو ہر کار کی رفتار معلوم کیجیے۔

اعادہ مشق 1

1- درج ذیل کے درست جوابات کا انتخاب کیجیے۔

(i) قالب [2 1] کا درجہ ہے۔

(a) 2-by-1

(b) 1-by-2

(c) 1-by-1

(d) 2-by-2

(ii) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ کو قالب کہا جاتا ہے۔

(a) صفری

(b) سکالر

(c) وحدانی

(d) نادر

(iii) کونسا درجہ ایک مربعی قالب کا ہے؟

(a) 2-by-2

(b) 1-by-2

(c) 2-by-1

(d) 3-by-2

..... کے ٹرانسپوز قالب کا درجہ ہے۔ (iv) قالب $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

(a) 3-by-2

(b) 2-by-3

(b) 3-by-1

(c) 1-by-3

..... Adj برابر ہے۔ (v) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(a) $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

..... ضربی حاصل $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ [x y] برابر ہے۔ (vi)

(a) [2x + y]

(b) [x - 2y]

(c) [2x - y]

(d) [x + 2y]

..... اگر $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 0$ ہو تو x برابر ہے۔ (vii)

(a) 9

(b) -6

(c) 6

(d) -9

..... اگر $X + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ تو X برابر ہے۔ (viii)

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

2- جملوں کو مکمل کیجیے۔

(i) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ کو کہا جاتا ہے..... قالب۔

(ii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ کو کہا جاتا ہے..... قالب۔

(iii) قالب $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ کا جمع معکوس قالب..... ہے۔

(iv) عام طور پر ضربی قالب BA..... AB۔

(v) قالب A + B ممکن ہے اگر A اور B کا مرتبہ..... ہے۔

(vi) قالب کہا جاتا ہے..... قالب اگر اس کے کالم اور قطاروں کی تعداد برابر ہو۔

3- اگر $\begin{bmatrix} a+3 & 4 \\ 6 & b-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ تو ارکان b اور a کی قیمت معلوم کیجیے۔

4- اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ تو درج ذیل قالب معلوم کیجیے۔

(i) $2A + 3B$

(ii) $-3A + 2B$

(iii) $-3(A + 2B)$

(iv) $\frac{2}{3}(2A - 3B)$

5- قالب X معلوم کیجیے۔ اگر $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} + X = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$

6- اگر $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ تو ثابت کیجیے۔

$AB \neq BA$

7- اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ تو ذیل کی تصدیق کیجیے۔

(i) $(AB)^t = B^t A^t$

(ii) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

خلاصہ

- ☆ حقیقی اعداد کا ایک مستطیلی افقی اور عمودی قطاری خاکہ جو بریکٹ سے محیط کیا گیا ہو ایک قالب کہلاتا ہے۔
- ☆ قالب A ایک مستطیلی قالب کہلاتا ہے اگر اس میں افقی قطاروں کی تعداد اور عمودی کالموں کی تعداد برابر نہ ہو۔
- ☆ قالب A ایک مربعی قالب کہلاتا ہے اگر A میں قطاروں کی تعداد کالموں کی تعداد کے برابر ہو۔
- ☆ قالب A ایک قطاری قالب کہلاتا ہے اگر A میں صرف ایک قطار ہو۔
- ☆ قالب A ایک کالمی قالب کہلاتا ہے اگر A میں صرف ایک کالم ہو۔
- ☆ قالب A ایک صفری یا (null) قالب کہلاتا ہے اگر A کا ہر رکن صفر ہو۔
- ☆ اگر A ایک قالب ہو تو A^t ایک نیا قالب ہے جس کو A کا ٹرانسپوز قالب کہتے ہیں جو قالب A کی قطاروں کو بالترتیب کالموں میں تبدیل کرنے یا کالموں کو بالترتیب A کی قطاروں میں تبدیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
- ☆ ایک مربعی قالب کو سیمٹرک (symmetric) قالب کہتے ہیں اگر $A^t = A$
- ☆ $(-A)$ کو قالب A کا منفی قالب کہتے ہیں جسے قالب A کے تمام ارکان کو ان کے منفی ارکان میں بدل دینے سے حاصل کیا جاتا ہے۔

☆ ایک مربعی قالب M کو ایک سکیوسیمٹرک (skew symmetric) قالب کہتے ہیں۔ اگر $M^t = -M$

☆ ایک مربعی قالب M ایک وتری قالب کہلاتا ہے اگر کم از کم ایک وتری رکن صفر نہ ہو اور غیر وتری تمام ارکان صفر ہوں۔

☆ ایک وتری قالب وحدانی قالب کہلاتا ہے اگر اس میں تمام وتری ارکان 1 ہوں۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

کو 3-by-3 وحدانی (identity) قالب کہتے ہیں۔

☆ کوئی بھی دو قالب A اور B ایک دوسرے کے مساوی یا برابر کہلائیں گے اگر

$$(i) \quad B \text{ کا مرتبہ } = A \text{ کا مرتبہ}$$

$$(ii) \quad A \text{ اور } B \text{ کے متناظرہ ارکان آپس میں برابر ہوں}$$

☆ کوئی بھی دو قالبوں M اور N پر جمع کا عمل اس وقت ممکن ہوگا اگر، N کا مرتبہ = M کا مرتبہ

☆ فرض کیا قالب A 2-by-3 مرتبہ کا ہے تو ہم مرتبہ قالب B کا جمعی ذاتی قالب ہوگا اگر

$$B + A = A = A + B$$

☆ دو ہم مرتبہ قالب A اور B ایک دوسرے کے جمعی معکوس کہلائیں گے۔ اگر

$$B + A = O = A + B$$

☆ قالب B ایک دوسرے قالب A کا وحدانی ذاتی (identity) قالب کہلاتا ہے۔ اگر

$$BA = A = AB \quad \text{بلحاظ ضربی عمل}$$

☆ اگر $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ایک 2-by-2 مرتبہ کا قالب ہے اور ایک حقیقی عدد قالب M کا مقطع کہلاتا ہے

$$\det M = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

جو ظاہر کیا جاتا ہے۔

☆ ایک مربعی قالب M غیر نادر کہلاتا ہے۔ اگر قالب M کا مقطع صفر کے برابر نہ ہو۔

☆ ایک مربعی قالب M نادر قالب کہلاتا ہے اگر M کا مقطع صفر ہو۔

☆ اگر قالب $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ہو تو اس کا ایڈجائنٹ (adjoint) متعارف اور ظاہریوں کیا جاتا ہے۔

$$\text{Adj } M = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

☆ اگر $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ایک مربعی قالب ہو تو اس کا ضربی معکوس

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \text{Adj } M$$

$$\det M = ad - bc \neq 0 \quad \text{جبکہ}$$

☆ مندرجہ ذیل قوانین بلحاظ قابلیوں کے جمعی عمل مصدقہ ہیں۔

$$M + N = N + M \quad \text{(i)} \quad \text{(قانون مبادلہ)}$$

$$(M + N) + T = M + (N + T) \quad \text{(ii)} \quad \text{(قانون تلازم)}$$

☆ دو قابلیوں M اور N کے ضربی عمل سے قالب MN کا حاصل ممکن ہے۔ اگر N میں قطاروں کی تعداد M میں کالموں کی تعداد

$$MN \neq NM \quad \text{اور عام طور پر}$$

$$(MN)T = M(NT) \quad \text{(i)} \quad \text{(قانون تلازم بلحاظ ضرب)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M(N+T) = MN + MT \\ (T+N)M = TM + NM \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{(ii)} \\ \text{(iii)} \end{array} \quad \text{(تقسیمی قانون)}$$

$$(MN)^t = N^t M^t \quad \text{(iv)} \quad \text{☆} \quad \text{(قانون ٹرانسپوز)}$$

$$(MN)^{-1} = N^{-1} M^{-1} \quad \text{(v)}$$

$$MM^{-1} = I = M^{-1}M \quad \text{(vi)}$$

☆ دو مندرجہ ذیل مساواتوں کا ایک مستقل باہمی حل ممکن ہے

$$ax + by = m$$

$$cx + dy = n$$

اگر عددی سروں کا قالب $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ غیر نادر ہو۔

$$\text{ہو} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix} \quad \text{اور سسٹم کی قابلی مساوات}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix} \quad \text{اور ان کے حل کے لیے یوں لکھا جائے}$$

ضربی عمل کے بعد قابلیوں کے برابری کے اصول سے x اور y کی قیمتوں کا حصول حل تصور ہوگا۔

کریر قانون میں مندرجہ بالا مساواتوں کا قابلیوں کی مدد سے یوں ہوگا:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad \text{اور} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad \text{جبکہ} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$$

حقیقی اور غیر حقیقی (کمپلیکس) اعداد (REAL AND COMPLEX NUMBERS)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | حقیقی اعداد (Real Numbers) |
| 2.2 | حقیقی اعداد کی خصوصیات (Properties of Real Numbers) |
| 2.3 | مجذور اور جذری مقدرائیں (Radicals and Radicands) |
| 2.4 | قوت نما کے قوانین (Laws of Exponents / Indices) |
| 2.5 | کمپلیکس اعداد (Complex Numbers) |
| 2.6 | کمپلیکس اعداد کے بنیادی عوامل (Basic Operations on Complex Numbers) |

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر علمی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں کہ

- ☆ یادداشت میں لانا کہ مکمل حقیقی اعداد کا سیٹ ناطق اور غیر ناطق اعداد کا یونین سیٹ ہوتا ہے۔
- ☆ حقیقی اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کرنا۔
- ☆ ایسے اعداد کو نمبر لائن پر واضح کرنا جن کا اعشاری حصہ محدود یا اختتام پذیر یا لامحدود یا غیر اختتام پذیر تکراری ہو۔
- ☆ ناطق اور غیر ناطق اعداد کو اعشاری طور پر ظاہر کرنا۔
- ☆ حقیقی اعداد کی خصوصیات کو جاننا۔
- ☆ جذری اور مجذور مقداروں کے تصورات کی وضاحت کرنا۔
- ☆ جذری جملوں کو قوت نمائی جملوں میں تبدیل کرنا اور قوت نمائی جملوں کو جذری جملوں میں بدلنا۔
- ☆ بنیاد یا اساس، قوت نما اور قیمت کے تصورات کو یادداشت میں لانا۔
- ☆ قوت نمائی کے قوانین کی مدد سے جملوں (مقداروں) کو حقیقی قوت نمائی میں مختصر کرنا۔

- ☆ کمپلیکس اعداد کے تصور کی تعریف کرنا۔ اور ایک کمپلیکس عدد $z = a + ib$ کو $z = a + ib$ میں ظاہر کرنا جس میں a اور b دو حقیقی اعداد ہوں اور $i = \sqrt{-1}$ خیالاتی (imaginary) عدد ہو۔
- ☆ $z = a + ib$ میں a عدد z کا حقیقی حصہ اور b خیالاتی حصہ سمجھنا۔
- ☆ کمپلیکس عدد کے کانجوگیٹ (conjugate) کی تعریف کرنا۔
- ☆ دیے ہوئے دو کمپلیکس اعداد کے درمیان برابری کا تصور جاننا۔
- ☆ کمپلیکس اعداد پر جمع و تفریق و ضرب اور تقسیم کے عوامل کی تعریف اور وضاحت کرنا۔

تعارف

عدد کا تصور علم ریاضیات کی بنیاد ہے اور ہم مختلف اعداد کی اقسام کو روزانہ عملی زندگی میں استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی لیے اعداد کی اقسام کے بارے میں باخبر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔

اس یونٹ میں ہم حقیقی اور کمپلیکس اعداد کو زیر بحث لائیں گے اور ان کی خصوصیات بھی شامل ہوں گی۔ حقیقی اعداد اور نمبر لائن کے نقاط کے درمیان (1-1) کی مطابقت قائم ہے۔ جمع و تفریق و ضرب اور تقسیم کے عوامل اس یونٹ میں ہم کمپلیکس اعداد کی مناسبت سے بھی زیر بحث لائیں گے۔

2.1 حقیقی اعداد (Real Numbers)

حقیقی اعداد کے تصور سے پہلے ہم مندرجہ ذیل اعداد کے سیٹ کے بارے یادداشت میں لاتے ہیں۔

قدرتی اعداد (Natural Numbers)

اعداد 1, 2, 3, 4, جو مختلف اشیا کی گنتی کرنے میں استعمال ہوتے ہیں قدرتی اعداد کہلاتے ہیں۔ سیٹ N جس میں تمام قدرتی اعداد شامل ہوتے ہیں کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے:

$$N = \{1, 2, 3, \dots\}$$

مکمل اعداد (Whole Numbers)

اگر سیٹ N میں نمبر 0 شامل کر لیا جائے تو سیٹ $W = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ مکمل اعداد کا سیٹ کہلاتا ہے۔

صحیح اعداد (Integers)

سیٹ $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ بشمول مثبت قدرتی اعداد، منفی قدرتی اعداد اور '0' تمام صحیح اعداد کا سیٹ کہلاتا ہے۔

2.1.1 حقیقی اعداد کا سیٹ (Set of Real Numbers)

سب سے پہلے ہم ناطق اور غیر ناطق اعداد کے سیٹوں کو اپنی یادداشت میں لاتے ہیں۔

ایسے اعداد جو $\frac{p}{q}$ کی شکل میں لکھے جاسکیں، جبکہ p اور q دونوں صحیح اعداد ہوں اور $q \neq 0$ ناطق اعداد کہلاتے ہیں۔ تمام ناطق اعداد کے سیٹ کو Q سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ:

$$Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0 \right\}$$

غیر ناطق اعداد (Irrational Numbers)

ایسے اعداد جو $\frac{p}{q}$ کی شکل میں نہیں لکھے جاسکتے، جبکہ p اور q دونوں صحیح اعداد ہوں اور $q \neq 0$ ، غیر ناطق اعداد کہلاتے ہیں۔ تمام غیر ناطق اعداد کے سیٹ کو Q' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ:

$$Q' = \left\{ x \mid x \neq \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0 \right\}$$

مثلاً $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ ، $\sqrt{5}$ ، π اور e تمام غیر ناطق اعداد ہیں۔

تمام ناطق اور غیر ناطق اعداد کا سیٹ حقیقی اعداد کا سیٹ R جانا اور مانا جاتا ہے۔

$$R = Q \cup Q'$$

جبکہ Q اور Q' دونوں حقیقی اعداد کے سیٹ R کے تحت سیٹ ہیں۔

$$Q \cap Q' = \phi$$

نوٹ:



i.e., $N \subset W \subset Z \subset Q \subset R$

$$N \subset W \subset Z \subset Q \quad (i)$$

$$Q \text{ اور } Q' \text{ ایک دوسرے کے مکملیمینٹ (Complement) ہیں۔} \quad (ii)$$

سیٹ ہیں۔


$$\text{اگر } P \text{ ایک مفرد عدد ہو تو } \sqrt{P} \text{ ایک غیر ناطق عدد ہے۔} \quad (iii)$$

$$\text{غیر مربعی مثبت صحیح اعداد کا جذر غیر ناطق عدد ہوتا ہے۔} \quad (iv)$$

2.1.2 حقیقی اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کرنا (Depiction of Real Numbers on Number Line)

تمام حقیقی اعداد جیومیٹری میں ہر نمبر لائن l کے نقاط کے طور پر اس طرح جانے جاتے ہیں کہ ہر حقیقی عدد a نمبر لائن کے ایک ہی نقطہ سے مناسبت رکھتا ہے اور نمبر لائن l پر نقطہ P سے ایک اور صرف ایک ہی حقیقی عدد مناسبت رکھتا ہے۔ اس طرح کی مناسبت کو $(1-1)$ مطابقت کہتے ہیں۔ اس مطابقت کو ہم اگلے صفحہ پر قائم کرتے ہیں۔

پہلے نیچے دی ہوئی افقی نمبر لائن l پر ہم ایک نقطہ O بطور مبداء (origin) انتخاب کرتے ہیں اور اس کی مطابقت عدد '0' (zero) سے قائم کرتے ہیں۔ علم ریاضی کی روایات کے طور پر نقطہ O کے دائیں طرف مثبت حقیقی اعداد اور بائیں طرف منفی حقیقی اعداد لیے جاتے ہیں۔ اگر نمبر 1 کی مطابقت میں نقطہ A لیا جائے جو قطعہ خط OA کی لمبائی کو یونٹ سے ظاہر کرے تو حقیقی اعداد کی نقطہ P سے مطابقت قائم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نقطہ $P(a)$ ظاہر ہوتا ہے۔ جس میں اگر حقیقی عدد a نقطہ P کا کوآرڈینیٹ سمجھا جائے تو نقطہ $P(-a)$ نقطہ $P(a)$ کے مبداء سے دوسری طرف لیکن اتنے ہی فاصلے پر $(-a)$ کی مطابقت میں ہوگا۔ اسی طرح حقیقی اعداد اور نمبر لائن کے نقاط میں مطابقت قائم ہو جاتی ہے۔



2.1.3 نمبر لائن پر اعشاری (Decimal) اعداد کی مناسبت کی وضاحت

(Demonstration of a Number with Terminating and Non-Terminating Decimals on the Number Line)

پہلے ہم ناطق اور غیر ناطق اعشاری اعداد کے تصورات کے بارے میں روشناس کراتے ہیں۔

(a) ناطق اعداد (Rational Numbers)

اعشاری اعداد میں ناطق اعداد دو قسم کے ہیں۔

اختتام پذیر اور غیر اختتام پذیر تکراری۔

(i) اختتام پذیر اعشاری ناطق اعداد (Terminating Decimal Fractions)

ایسے اعشاری اعداد ناطق ہوتے ہیں جن کے اعشاری اعداد کی تعداد گنتی میں لائی جاسکے۔ ایسے اعشاری اعداد کو اختتام پذیر اعشاری ناطق اعداد کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر $\frac{2}{5} = 0.4$ اور $\frac{3}{8} = 0.375$ اختتام پذیر اعشاری ناطق اعداد ہیں۔

(ii) غیر اختتام پذیر تکراری اعشاری اعداد (Recurring and Non-Terminating Numbers)

ایسے اعشاری اعداد جو غیر اختتام پذیر ہوں جن میں اعشاری عدد دیا اعداد کا ایک بلاک بار بار اعشاری حصہ میں دہرائے جا رہے ہوں تکراری اعشاری اعداد کہلاتے ہیں۔

مثال کے طور پر $\frac{2}{9} = 0.2222\dots$ اور $\frac{4}{11} = 0.363636\dots$

تکراری غیر اختتام پذیر اعشاری ناطق اعداد ہیں۔

(b) غیر ناطق اعداد (Irrational Numbers)

مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ غیر ناطق اعداد نہ تو اختتام پذیر اعشاری اور نہ ہی غیر اختتام پذیر تکراری اعشاری اعداد ہیں۔ اعشاری غیر ناطق اعداد غیر اختتام پذیر ہوں گے اور اعشاری اعداد میں سے کوئی بھی عدد یا اعداد کا ایک بلاک یکسر دہرایا نہیں جائے گا۔

$$e = 2.718281829\dots, \text{ اور } \pi = 3.141592654\dots, \sqrt{2} = 1.414213562\dots, \text{ مثلاً}$$

وغیرہ تمام اعداد نہ ہی اختتام پذیر اور نہ ہی تکراری اعشاری حصہ رکھتے ہیں۔

درج ذیل مثالوں سے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

مثال مندرجہ ذیل اعشاری اعداد کو $\frac{p}{q}$ کی شکل میں ظاہر کریں۔ جبکہ $p, q \in \mathbb{Z}$ اور $q \neq 0$

$$(a) \quad 0.\overline{3} = 0.333 \dots$$

$$(b) \quad 0.\overline{23} = 0.232323 \dots$$

حل

$$x = 0.\overline{3} \quad \text{اگر} \quad (a)$$

$$x = 0.3333\dots \quad (i)$$

چونکہ صرف ایک ہی عدد 3 لامتناہی طور پر دہرایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم (i) کے دونوں طرف 10 سے ضرب دیں گے۔

$$10x = (0.3333\dots) \times 10 \quad \text{پس}$$

$$10x = 3.3333\dots \quad (ii)$$

(i) کو (ii) میں سے تفریق کرنے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔

$$10x - x = (3.3333\dots) - (0.3333\dots)$$

$$9x = 3$$

$$x = \frac{1}{3}$$

اور

$$0.\overline{3} = \frac{1}{3}$$

نتیجتاً

پس x ایک ناطق عدد ہے۔

$$x = 0.\overline{23} = 0.23232323 \dots \quad \text{فرض کیا} \quad (b)$$

چونکہ دو اعداد کا بلاک 23 دہرایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم 100 سے دونوں طرف ضرب دیں گے۔

$$100x = 23.\overline{23} \quad \text{یعنی}$$

$$\Rightarrow 100x = 23 + 0.\overline{23} = 23 + x$$

$$\Rightarrow 100x - x = 23$$

$$\Rightarrow 99x = 23$$

$$\Rightarrow x = \frac{23}{99}$$

$$\text{پس } 0.\overline{23} = \frac{23}{99} \text{ مطلوبہ ناطق عدد ہے۔}$$

2.1.4 نمبر لائن پر ناطق اور غیر ناطق اعداد کو ظاہر کرنا

(Representation of Rational and Irrational Numbers on Number Line)


اختتام پذیر اعشاری ناطق اعداد اور غیر اختتام پذیر ناطق اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کرنے کی خاطر ہم نمبر لائن پر ناطق اعداد $\frac{m}{n}$ اور $-\frac{m}{n}$ سے وابستہ نقاط کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ m اور n مثبت صحیح اعداد ہیں۔ اس غرض سے ہم ہر یونٹ اعشاری بلاک کو n برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو نمبر لائن پر اعشاری m th حصہ مبدا سے دائیں طرف $\frac{m}{n}$ کے نقطہ کو ظاہر کرتا ہے اور مبدا سے بائیں طرف اتنے ہی فاصلہ پر $-\frac{m}{n}$ کے نقطہ کو ظاہر کرتا ہے۔

مثال مندرجہ ذیل اعشاری اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کریں۔


$$(i) -\frac{2}{5} \quad (ii) \frac{15}{7} \quad (iii) -1\frac{7}{9}$$

حل

(i) ناطق نمبر $-\frac{2}{5}$ کو نمبر لائن l پر ظاہر کرنے کی خاطر یونٹ لمبائی $[-1, 0]$ کو نمبر لائن پر پانچ برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ دوسرے حصہ کے اختتام پر مبدا سے بائیں طرف $-\frac{2}{5}$ کو ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ M نمبر $-\frac{2}{5}$ کو ظاہر کرتا ہے۔




(ii) چونکہ $\frac{15}{7} = 2 + \frac{1}{7}$ اس لیے $\frac{15}{7}$ نمبر لائن پر صحیح اعداد 2 اور 3 کے درمیان واقع ہوگا۔




نمبر لائن پر صحیح اعداد 2 اور 3 کے درمیان فاصلہ کو سات برابر حصوں میں تقسیم کریں نقطہ P نمبر $\frac{15}{7} = 2 + \frac{1}{7}$ کو ظاہر کرتا ہے۔

- (iii) ناطق عدد $-1\frac{7}{9}$ ، نمبر لائن پر صحیح اعداد 1 اور 2 کے درمیان فاصلہ کو نو برابر حصوں میں تقسیم کرنے سے نقطہ M کو ظاہر کرتا ہے۔ نیچے شکل میں نقطہ M ناطق عدد، $-1\frac{7}{9}$ کو ظاہر کرتا ہے۔



غیر ناطق اعداد $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{5}$ وغیرہ نمبر لائن l پر مندرجہ ذیل جیومیٹری کی شکل کی بناوٹ سے ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً عدد $\sqrt{2}$ کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ مثلث OAB بنانے سے، $|\overline{OB}| = \sqrt{2}$ اور $|\overline{OP}| = \sqrt{2}$ نمبر لائن پر $\sqrt{2}$ کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔

در اصل نقطہ O کو مرکز مان کر داس $|\overline{OB}| = \sqrt{2}$ کی لمبائی نمبر لائن پر ظاہر ہوتی ہے۔ نقطہ P نمبر لائن پر $\sqrt{2}$ نمبر کو ظاہر کرتا ہے جو مطلوبہ نقطہ ہے۔



مشق 2.1

- 1- مندرجہ ذیل میں سے ناطق یا غیر ناطق اعداد کی نشاندہی کریں۔
- (i) $\sqrt{3}$ (ii) $\frac{1}{6}$ (iii) π (iv) $\frac{15}{2}$ (v) 7.25 (vi) $\sqrt{29}$
- 2- مندرجہ ذیل ناطق اعداد کو اعشاری اعداد میں تبدیل کیجیے۔
- (i) $\frac{17}{25}$ (ii) $\frac{19}{4}$ (iii) $\frac{57}{8}$
- (iv) $\frac{205}{18}$ (v) $\frac{5}{8}$ (vi) $\frac{25}{38}$
- 3- ذیل میں درج کیے ہوئے کون سے جملے درست ہیں یا غلط، نشاندہی کریں۔
- (i) $\frac{2}{3}$ ایک غیر ناطق عدد ہے۔
- (ii) π ایک غیر ناطق عدد ہے۔
- (iii) $\frac{1}{9}$ ایک غیر اختتام پذیر عدد ہے۔
- (iv) $\frac{3}{4}$ ایک اختتام پذیر عدد ہے۔
- (v) $\frac{4}{5}$ ایک تکراری کسر ہے۔

4- درج ذیل اعداد کو نمبر لائن کے نقاط سے ظاہر کیجیے۔

- (i) $\frac{2}{3}$ (ii) $-\frac{4}{5}$ (iii) $1\frac{3}{4}$
 (iv) $-2\frac{5}{8}$ (v) $2\frac{3}{4}$ (vi) $\sqrt{5}$

5- اعداد $\frac{3}{4}$ اور $\frac{5}{9}$ کے درمیان ایک ناطق عدد بتائیے۔

6- مندرجہ ذیل تکراری اعداد کو ناطق اعداد $\frac{p}{q}$ میں ظاہر کریں جبکہ p, q اور $q \neq 0$ صحیح اعداد ہوں۔

- (i) $0.\overline{5}$ (ii) $0.\overline{13}$ (iii) $0.\overline{67}$

2.2 حقیقی اعداد کی خصوصیات (Properties of Real Numbers)

اگر a اور b دو حقیقی اعداد ہوں تو ان کا حاصل جمع $a+b$ (sum)، اور ان کا ضربی حاصل ab (product) یا $a \times b$

یا $a \cdot b$ یا $(a) (b)$ لکھا جائے تو

(a) حقیقی اعداد کی خصوصیات بلحاظ جمع (Addition) اور بلحاظ ضرب (Multiplication)

حقیقی اعداد کی خصوصیات بلحاظ جمع درج ذیل ہیں۔

(i) خاصیت بندش (Closure Property)

$$a + b \in \mathbb{R}, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

مثلاً اگر -3 اور 5 سیٹ \mathbb{R} کے دو ارکان ہوں تو

$$-3 + 5 = 2 \in \mathbb{R}$$

(ii) خاصیت مبادلہ (Commutative Property)

$$a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

مثلاً اگر 2 اور 3 سیٹ \mathbb{R} کے ارکان ہوں تو

$$2 + 3 = 3 + 2$$

$$5 = 5$$

(iii) خاصیت تلازم (Associative Property)

$$(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

مثلاً اگر $5, 7$ اور 3 سیٹ \mathbb{R} کے ارکان ہوں تو

$$(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3)$$

$$12 + 3 = 5 + 10$$

$$15 = 15$$

(iv) جمعی ذاتی عنصر (Additive Identity)

حقیقی اعداد کے سیٹ R میں ایک اور صرف ایک رکن 0 موجود ہے جو جمعی ذاتی عنصر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ

$$a + 0 = a = 0 + a \quad \forall a \in R$$

(v) جمعی معکوس (Additive Inverse)

حقیقی اعداد کے سیٹ R میں ہر رکن a کا ایک اور صرف ایک ہی جمعی معکوس $-a$ موجود ہے۔ جیسا کہ

$$a + (-a) = 0 = (-a) + a$$

مثلاً حقیقی عدد 3 کا جمعی معکوس -3 ہے۔ چونکہ

$$3 + (-3) = 0 = (-3) + 3$$

حقیقی اعداد کی خصوصیات بلحاظ ضرب درج ذیل ہیں۔

(i) خاصیت بندش (Closure Property)

$$ab \in R \quad \forall a, b \in R$$

مثلاً اگر $-3, 5 \in R$

$$(-3)(5) \in R \quad \text{تو}$$

$$-15 \in R \quad \text{یا}$$

(ii) خاصیت مبادلہ (Commutative Property)

$$ab = ba \quad \forall a, b \in R$$

مثلاً اگر $\frac{1}{3}$ اور $\frac{3}{2}$ سیٹ R کے ارکان ہوں تو

$$\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{یا}$$

(iii) خاصیت تلازم (Associative Property)

$$(ab)c = a(bc) \quad \forall a, b, c \in R$$

مثلاً اگر $2, 3, 5 \in R$ تو

$$(2 \times 3) \times 5 = 2 \times (3 \times 5)$$

$$6 \times 5 = 2 \times 15 \quad \text{یا}$$

$$30 = 30 \quad \text{یا}$$

(iv) ضربی ذاتی عنصر (Multiplicative Identity) حقیقی اعداد کے سیٹ R میں ایک اور صرف ایک ہی حقیقی عدد 1 موجود ہے جو ضربی ذاتی عنصر کہلاتا ہے۔

$$a \cdot 1 = a = 1 \cdot a, \quad \forall a \in \mathbb{R} \quad \text{جبکہ}$$

(v) ضربی معکوس (Multiplicative Inverse) سیٹ R میں ہر حقیقی عدد ($a \neq 0$) کا ضربی معکوس ایک اور صرف ایک نمبر $a^{-1} = \frac{1}{a}$ موجود ہے جس کو a کا ضربی معکوس کہا جاتا ہے۔

$$aa^{-1} = 1 = a^{-1}a \quad \text{جبکہ}$$

$$a \times \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \times a \quad \text{یا}$$

$$\frac{1}{5} \in \mathbb{R} \quad \text{تو} \quad 5 \in \mathbb{R} \quad \text{مثلاً اگر}$$

$$5 \times \frac{1}{5} = 1 = \frac{1}{5} \times 5 \quad \text{جبکہ}$$

پس 5 اور $\frac{1}{5}$ ایک دوسرے کے ضربی معکوس ہیں۔

(vi) جمعی اور تفریقی عمل پر ضربی عمل تقسیمی خاصیت رکھتا ہے۔

(Multiplication is Distributive over Addition and Subtraction)

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$a(b + c) = ab + ac$$

(بایاں تقسیمی قانون بلحاظ جمع)

$$(a + b)c = ac + bc$$

(دایاں تقسیمی قانون بلحاظ جمع)

مثلاً اگر 2، 3 اور 5 سیٹ R کے ارکان ہوں تو

$$2(3 + 5) = 2 \times 3 + 2 \times 5$$

$$2 \times 8 = 6 + 10$$

یا

$$16 = 16$$

یا

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$a(b - c) = ab - ac$$

(بایاں تقسیمی قانون بلحاظ تفریق)

$$(a - b)c = ac - bc$$

(دایاں تقسیمی قانون بلحاظ تفریق)

مثلاً اگر 2، 5 اور 3 سیٹ R کے ارکان ہوں تو

$$2(5 - 3) = 2 \times 5 - 2 \times 3$$

$$2 \times 2 = 10 - 6$$

$$4 = 4$$

یا
یا

نوٹ:

(i) علامت \forall کے معنی ہیں "سب کے لیے"

(ii) a کا ضربی معکوس a^{-1} ہے چونکہ $a = (a^{-1})^{-1}$

(b) حقیقی اعداد کی برابری کی خصوصیات (Properties of Equality of Real Numbers)

حقیقی اعداد میں برابری کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) عکسی خاصیت (Reflexive Property)

$$a = a, \forall a \in \mathbb{R}$$

(ii) تشاکل خاصیت (Symmetric Property)

$$a = b \Rightarrow b = a \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

(iii) متعدیت خاصیت (Transitive Property)

$$a = b, b = c \Rightarrow a = c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(iv) جمعی خاصیت (Additive Property)

$$a = b \Rightarrow a + c = b + c, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(v) ضربی خاصیت (Multiplicative Property)

$$a = b \Rightarrow ac = bc, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(vi) تنسیخی خاصیت بلحاظ جمع (Cancellation Additive Property)

$$a + c = b + c \Rightarrow a = b, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(vii) تنسیخی خاصیت بلحاظ ضرب (Cancellation Multiplicative Property)

$$ac = bc, c \neq 0 \Rightarrow a = b, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(c) حقیقی اعداد کی نا برابری کی خصوصیات (Properties of Inequality of Real Numbers)

حقیقی اعداد کی نا برابری کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔

(i) ثلاثی خاصیت (Trichotomy Property)

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$a < b \quad \text{یا} \quad a = b \quad \text{یا} \quad a > b$$

(Transitive Property) متعدیت خاصیت (ii)

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(a) $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$

(b) $a > b \wedge b > c \Rightarrow a > c$

(Additive Property) جمعی خاصیت (iii)

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(a) $a < b \Rightarrow a + c < b + c$

$$a < b \Rightarrow c + a < c + b$$

(b) $a > b \Rightarrow a + c > b + c$

$$a > b \Rightarrow c + a > c + b$$

(Multiplicative Property) ضربی خاصیت (iv)

(a) $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ اور $c > 0$

(i) $a > b \Rightarrow ac > bc$

$$a > b \Rightarrow ca > cb$$

(ii) $a < b \Rightarrow ac < bc$

$$a < b \Rightarrow ca < cb$$

(b) $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \wedge c < 0$

(i) $a > b \Rightarrow ac < bc$

$$a > b \Rightarrow ca < cb$$

(ii) $a < b \Rightarrow ac > bc$

$$a < b \Rightarrow ca > cb$$

(Multiplicative Inverse Property) ضربی معکوس خاصیت (v)

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0, b \neq 0$$

(a) $a < b \Leftrightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

(b) $a > b \Leftrightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

مشق 2.2

1- مندرجہ ذیل جملوں میں حقیقی اعداد کی خاصیت کی نشاندہی کیجیے۔

(i) $a + b = b + a$ (ii) $(ab)c = a(bc)$

(iii) $7 \times 1 = 7$ (iv) $x > y$ یا $x = y$ یا $x < y$

(v) $ab = ba$ (vi) $a + c = b + c \Rightarrow a = b$

(vii) $5 + (-5) = 0$ (viii) $7 \times \frac{1}{7} = 1$

(ix) $a > b \Rightarrow ac > bc$ ($c > 0$)

2- مندرجہ ذیل خالی جگہوں میں حقیقی اعداد کی استعمال کی گئی خاصیت کی نشاندہی کریں۔

$$\begin{aligned} & 3x + 3(y - x) \\ &= 3x + 3y - 3x, \dots\dots\dots \\ &= 3x - 3x + 3y, \dots\dots\dots \\ &= 0 + 3y, \dots\dots\dots \\ &= 3y, \dots\dots\dots \end{aligned}$$

3- درج ذیل جملوں میں حقیقی اعداد کی اس خاصیت کا نام درج کیجیے جو استعمال کی گئی ہے۔

(i) $\sqrt{24} + 0 = \sqrt{24}$

(ii) $-\frac{2}{3} \left(5 + \frac{7}{2}\right) = \left(-\frac{2}{3}\right)(5) + \left(-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{7}{2}\right)$

(iii) $\pi + (-\pi) = 0$

(iv) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ حقیقی عدد ہے

(v) $\left(-\frac{5}{8}\right)\left(-\frac{8}{5}\right) = 1$

2.3 ریڈیکلز اور ریڈیکنڈز (Radicals and Radicands)

2.3.1 ریڈیکل اور ریڈیکنڈ کا تصور (Concept of Radical and Radicand)

اگر n ایک مثبت صحیح عدد ہو جو صحیح عدد 1 سے بڑا ہو تو ایک حقیقی نمبر x جو حقیقی نمبر a کا n واں رُوٹ (جذر) ہو ریڈیکل کہلاتا ہے۔ یعنی اگر $x^n = a$ ہو تو $x = \sqrt[n]{a}$ یا $x = (a)^{1/n}$ بطور علامت لکھا جاتا ہے۔

ریڈیکل $\sqrt[n]{a}$ میں علامت \sqrt ریڈیکل کا نشان کہلاتا ہے اور n کو ریڈیکل کا انڈیکس کہتے ہیں۔
حقیقی نمبر a ریڈیکل نشان کے ساتھ ریڈیکنڈ یا ریڈیکل کی اساس/بنیاد (base) کہلاتا ہے۔
نوٹ:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

2.3.2 دیے ہوئے نمبر کی ریڈیکل اور قوت نمائی شکل میں فرق

(Difference between Radical and Exponential Forms)

(i) ریڈیکل شکل میں ریڈیکل کا نشان استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً $x = \sqrt[n]{a}$ نمبر x کی ریڈیکل شکل ہے۔

$$\sqrt[3]{x} \text{ اور } \sqrt[5]{x^2} \text{ ریڈیکل شکل کی مثالیں ہیں۔}$$

(ii) قوت نمائی شکل میں ریڈیکل کی جگہ قوت نما استعمال کرتے ہیں۔

مثلاً $x = (a)^{1/n}$ ریڈیکل شکل $x = \sqrt[n]{a}$ کی قوت نمائی شکل ہے۔

$$\text{اور } x^{3/2} \text{ اور } x^{2/7} \text{ قوت نمائی شکل کی مثالیں ہیں۔}$$

ریڈیکل کی خصوصیات (Properties of Radicals)

اگر $a, b \in \mathbb{R}$ اور n, m مثبت صحیح اعداد ہوں تو

$$(i) \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \quad (ii) \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (iii) \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$$

$$(iv) \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad (v) \sqrt[n]{a^n} = a$$

2.3.3 ریڈیکل شکل کو قوت نمائی شکل اور قوت نمائی شکل کو ریڈیکل شکل میں تبدیل کرنا

(Transformation of an Expression given in Radical Form to Exponential Form and Vice Versa)

ریڈیکل اور قوت نمائی شکلوں کو باہم تبدیل کرنا درج ذیل مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔

مثال 1 مندرجہ ذیل میں ہر ریڈیکل شکل کو قوت نمائی شکل میں اور ہر قوت نمائی شکل کو ریڈیکل شکل میں تبدیل کریں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

$$(i) \sqrt[5]{-8} \quad (ii) \sqrt[3]{x^5} \quad (iii) y^{3/4} \quad (iv) x^{-3/2}$$

(i) $\sqrt[5]{-8} = (-8)^{1/5}$

(ii) $\sqrt[3]{x^5} = x^{5/3}$

(iii) $y^{3/4} = \sqrt[4]{y^3}$ یا $(\sqrt[4]{y})^3$

(iv) $x^{-3/2} = \sqrt{x^{-3}}$ یا $(\sqrt{x})^{-3}$

مثال 2 $\sqrt[3]{16x^4y^5}$ کو تفصیل سے سادہ ترین ریڈیکل شکل میں لائیں۔

$$\sqrt[3]{16x^4y^5} = \sqrt[3]{(2)(8)(x)(x^3)(y^2)(y^3)}$$

(تجزی کرنے سے)

$$= \sqrt[3]{2xy^2(2^3)(x^3)(y^3)}$$

(مکمل مکعب کو ترتیب دینا)

$$= \sqrt[3]{2xy^2} \sqrt[3]{(2^3)(x^3)(y^3)}$$

خاصیت (i)

$$= \sqrt[3]{2xy^2} \sqrt[3]{2^3} \sqrt[3]{x^3} \sqrt[3]{y^3}$$

خاصیت (i)

$$= 2xy \sqrt[3]{2xy^2}$$

خاصیت (v)

مشق 2.3

1- مندرجہ ذیل میں سے ہر ریڈیکل شکل کو قوت نمائی شکل میں اور قوت نمائی شکل کو ریڈیکل شکل میں تبدیل کریں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

(i) $\sqrt[3]{-64}$ (ii) $2^{3/5}$ (iii) $-7^{1/3}$ (iv) $y^{-2/3}$

2- مندرجہ ذیل مساواتوں کے بارے میں غلط یا درست کی نشاندہی کیجیے۔

(i) $5^{1/5} = \sqrt{5}$ (ii) $2^{2/3} = \sqrt[3]{4}$ (iii) $\sqrt{49} = \sqrt{7}$ (iv) $\sqrt[3]{x^{27}} = x^3$

3- مندرجہ ذیل ریڈیکل شکلوں کو ان کی عام شکل میں تبدیل کیجیے۔

(i) $\sqrt[3]{-125}$ (ii) $\sqrt[4]{32}$ (iii) $\sqrt[5]{\frac{3}{32}}$ (iv) $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$

2.4 قوت نما کے قوانین (Laws of Exponents or Indices)

2.4.1 اساس اور قوت نما کا تصور (Base and Exponent)

قوت نمائی شکل، a^n (پڑھا جائے 'a' کی قوت نما n) میں ہم 'a' کو اساس/بنیاد (base) اور n کو a کی قوت کا انڈیکس کہتے ہیں۔

ہم مندرجہ ذیل قوت نما کے قوانین جانتے ہیں۔
اگر 'a' اور 'b' دو حقیقی اعداد ہوں اور n, m دو مثبت صحیح اعداد ہوں تو

$$(i) \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(ii) \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(iii) \quad (ab)^n = a^n b^n$$

$$(iv) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

$$(v) \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \text{ جبکہ } a \neq 0.$$

$$(vi) \quad a^0 = 1, \text{ جبکہ } a \neq 0.$$

$$(vii) \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \text{ جبکہ } a \neq 0$$

2.4.2 قوت نما کے قوانین کا استعمال (Application of Laws of Exponents)

قوت نما کے قوانین کے استعمال کو ہم مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔

مثال 1- قوت نما کے قوانین کی مدد سے مندرجہ ذیل جملوں کو عام شکل میں تبدیل کیجیے (تمام قوت نما مثبت ہوں)۔

$$(i) \quad \frac{x^{-2} x^{-3} y^7}{x^{-3} y^4}$$

$$(ii) \quad \left(\frac{4a^3 b^0}{9a^{-5}}\right)^{-2}$$

$$(i) \quad \frac{x^{-2} x^{-3} y^7}{x^{-3} y^4} = \frac{x^{-5} y^7}{x^{-3} y^4} \quad (a^m a^n = a^{m+n})$$

$$= \frac{y^{7-4}}{x^{-3+5}} = \frac{y^3}{x^2}, \quad \left(\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, m > n\right)$$

$$(ii) \quad \left(\frac{4a^3 b^0}{9a^{-5}}\right)^{-2} = \left(\frac{4a^{3+5} \times 1}{9}\right)^{-2}, \quad \left(\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, b^0 = 1\right) = \left(\frac{4a^8}{9}\right)^{-2}$$

$$= \left(\frac{4a^8}{9}\right)^{-2} = \left(\frac{9}{4a^8}\right)^{+2}, \quad \left(\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n\right)$$

$$= \frac{81}{16a^{16}}, \quad \left(\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}\right)$$

مثال 2 مندرجہ ذیل کو قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے۔

(i) $\left(\frac{8}{125}\right)^{-\frac{4}{3}}$ (ii) $\frac{4(3)^n}{3^{n+1} - 3^n}$

حل قوت نما کے قوانین کی مدد سے

(i) $\left(\frac{8}{125}\right)^{-\frac{4}{3}} = \left(\frac{125}{8}\right)^{\frac{4}{3}} = \frac{(125)^{\frac{4}{3}}}{(8)^{\frac{4}{3}}} = \frac{(5^3)^{\frac{4}{3}}}{(2^3)^{\frac{4}{3}}} = \frac{5^4}{2^4} = \frac{625}{16}$

(ii) $\frac{4(3)^n}{3^{n+1} - 3^n} = \frac{4(3)^n}{3^n[3 - 1]} = \frac{4(3)^n}{2(3^n)} = \frac{4}{2} = 2$

مشق 2.4

1- قوت نما کے قوانین کی مدد سے مندرجہ ذیل کو مختصر کیجیے۔

(i) $\frac{(243)^{-\frac{2}{3}} (32)^{-\frac{1}{5}}}{\sqrt{(196)^{-1}}}$ (ii) $(2x^5 y^{-4})(-8x^{-3} y^2)$

(iii) $\left(\frac{x^{-2} y^{-1} z^{-4}}{x^4 y^{-3} z^0}\right)^{-3}$ (iv) $\frac{(81)^n \times 3^5 - (3)^{4n-1} (243)}{(9^{2n})(3^3)}$

2- ثابت کیجیے کہ

$$\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} = 1$$

3- مختصر کیجیے۔

(i) $\frac{2^{1/3} \times (27)^{1/3} \times (60)^{1/2}}{(180)^{1/2} \times (4)^{-1/3} \times (9)^{1/4}}$ (ii) $\sqrt{\frac{(216)^{2/3} \times (25)^{1/2}}{(04)^{-1/2}}}$

(iii) $5^2 \div (5^2)^3$ (iv) $(x^3)^2 \div x^3, x \neq 0$

2.5 کمپلیکس اعداد (Complex Numbers)

ہم جانتے ہیں کہ ریاضی میں کسی بھی حقیقی عدد کا مربع کبھی بھی منفی نہیں ہوتا۔ پس مساوات $x^2 + 1 = 0$ یا $x^2 = -1$ کا حل حقیقی عدد نہیں ہو سکتا۔ حقیقی اعداد میں اس کی کوڈور کرنے کے لیے ریاضی دانوں نے حقیقی اعداد کے سیٹ سے بڑا سیٹ ڈھونڈ نکالا جسے کمپلیکس اعداد کے سیٹ کا نام دیا۔ جس میں ایک نیا عدد $\sqrt{-1}$ معلوم کر لیا جس کا مربع منفی عدد ہے۔ اس کو $i = \sqrt{-1}$ سے ظاہر کیا گیا۔ کمپلیکس عدد $\sqrt{-1}$ کو خیالاتی یونٹ نمبر جانا اور مانا گیا ہے۔

یقیناً i ایک حقیقی عدد نہیں کیونکہ اس کا مربع -1 ہے جو کسی بھی حقیقی عدد کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ریاضی میں ایک ایسا اضافہ ہے جو نمبر سسٹم کو وسیع حدود تک لے جاتا ہے جس میں تمام مساواتوں $x^2 = -a$ کو بھی حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ مساوات $x^2 + 1 = 0$ کے دو حل $\sqrt{-1}$ اور $-\sqrt{-1}$ حاصل ہوتے ہیں۔

نوٹ:

سوئٹزر لینڈ کے ریاضی دان لیونارڈ آئلر (1783 - 1707) نے پہلی دفعہ $i = \sqrt{-1}$ کو عدد کے طور پر پیش کیا۔
اعداد کی قسم $\sqrt{-1}$ ، $\sqrt{-5}$ وغیرہ کو خالص خیالاتی اعداد کہا اور مانا گیا ہے۔

i کی انٹیگرل پاورز (Integral Powers of i)

اگر $i = \sqrt{-1}$ ہو تو آسانی سے i کی انٹیگرل پاورز حاصل کر سکتے ہیں:

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 \times i = -i$$

$$i^4 = i^2 \times i^2 = (-1)(-1) = 1$$

$$i^8 = (i^2)^4 = (-1)^4 = 1$$

$$i^{10} = (i^2)^5 = (-1)^5 = -1, \text{ وغیرہ}$$

ایک خالص خیالاتی عدد (imaginary) منفی حقیقی عدد کا جذر المربع یا ریڈیکل ہے۔

2.5.1 کمپلیکس عدد کی تعریف (Definition of a Complex Number)

ایک عدد $z = a + bi$ ، جس میں $a, b \in \mathbb{R}$ اور $i = \sqrt{-1}$ ایک کمپلیکس عدد کہلاتا ہے اور انگریزی حروف تہجی (alphabet) کے حرف z سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

پس $z = 2 + 3i$ ایک کمپلیکس عدد ہے۔

2.5.2 کمپلیکس اعداد کا سیٹ (Set of Complex Numbers)

تمام کمپلیکس اعداد کا سیٹ انگریزی (alphabet) کے حرف C سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی

$$C = \{z \mid z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}$$

یاد رہے کہ اعداد a اور b کمپلیکس نمبر z کے حصے ہیں جو بالترتیب حقیقی اور خیالاتی (imaginary) پارٹ یا حصے

کہلاتے ہیں۔

جیسا کہ


$$R(z) = a = \text{حقیقی حصہ}$$

$$Im(z) = b = \text{اور } z \text{ کا خیالاتی حصہ}$$

مشاہدہ کیجیے کہ

- | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) | ہر حقیقی عدد a ایک کمپلیکس عدد $a + 0i$ ہوگا جس میں $b = 0$ ، پس ہر حقیقی عدد ایک کمپلیکس عدد بھی ہے۔ |
| (ii) | $z = 0 + ib$ میں اگر $a = 0$ ہو تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہر کمپلیکس عدد حقیقی عدد نہیں ہے۔ |
| (iii) | اگر $a + bi$ میں $a = 0$ ہو تو $z = ib$ ایک خیالاتی عدد ہے۔ خیالاتی اعداد کا سیٹ بھی سیٹ C میں شامل ہے۔ |
| (iv) | اگر $a = b = 0$ ہو تو $z = 0 + i0$ یعنی نمبر 0 (صفر) ایک کمپلیکس عدد بھی ہے۔ |

تفصیل کی خاطر تمام کمپلیکس اعداد کو نیچے تصویر (diagram) میں ظاہر کیا گیا ہے:



2.5.3 کا جوگیٹ کمپلیکس عدد (Conjugate of a Complex Number)

اگر ہم کمپلیکس عدد $z = a + bi$ میں i کو $-i$ میں بدل دیں تو نیا کمپلیکس عدد $a - bi$ کمپلیکس عدد z کا جوگیٹ کہلاتا ہے۔ جو \bar{z} سے ظاہر کیا جاتا ہے اور $(\bar{\bar{z}} = z)$ پڑھا جاتا ہے۔

مثلاً اگر $z = -1 - i$ تو $\bar{z} = -1 + i$

غیر حقیقی اعداد $a + bi$ اور $a - bi$ باہم ایک دوسرے کا جوگیٹ کہلاتے ہیں۔

نوٹ

- (i) $z = \bar{\bar{z}}$

(ii) ایک حقیقی عدد $z = a = a + 0i$ کا جوگیٹ خود z ہی ہے چونکہ $\bar{z} = \overline{a + 0i} = a - 0i = a$

(iii) ایک حقیقی عدد کا جوگیٹ خود حقیقی عدد ہی ہے۔

2.5.4 کمپلیکس اعداد میں برابری کا تصور اور اس کی خصوصیت

(Equality of Complex Numbers and its Properties)

(ii) اگر a, b, c, d حقیقی عدد ہوں اور $a + bi, c + di$ دو کمپلیکس اعداد ہوں تو

(iii) $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c, b = d$

مثلاً اگر $2x + y^2i = 4 + 9i$

تو $2x = 4, y^2 = 9,$

یعنی کہ $x = 2, y = \pm 3$

حقیقی اعداد کی برابری کی تمام خصوصیات کمپلیکس اعداد کے سیٹ C میں بھی موجود ہیں۔

- (i) عکسی خاصیت (Reflexive Property)

$\forall z_1 \in C, z_1 = z_1$

(ii) متبادل خاصیت (Symmetric Property)

$\forall z_1, z_2 \in C, z_1 = z_2 \Leftrightarrow z_2 = z_1$

(iii) متعدیت خاصیت (Transitive Property)

$\forall z_1, z_2, z_3 \in C, z_1 = z_2, z_2 = z_3 \Rightarrow z_1 = z_3$

(i) عکسی خاصیت (Reflexive Property)

(ii) متبادل خاصیت (Symmetric Property)

(iii) متعدیت خاصیت (Transitive Property)

مشق 2.5

1- قیمت معلوم کریں۔

- (i) i^7 (ii) i^{50} (iii) i^{12}
 (iv) $(-i)^8$ (v) $(-i)^5$ (vi) i^{27}

2- مندرجہ ذیل اعداد کے کانجوگٹ لکھیے۔

- (i) $2 + 3i$ (ii) $3 - 5i$ (iii) $-i$
 (iv) $-3 + 4i$ (v) $-4 - i$ (vi) $i - 3$

3- مندرجہ ذیل اعداد کے حقیقی اور امیجری حصے لکھیے۔

- (i) $1 + i$ (ii) $-1 + 2i$ (iii) $-3i + 2$
 (iv) $-2 - 2i$ (v) $-3i$ (vi) $2 + 0i$

4- اگر x اور y کی قیمت معلوم کریں، اگر $x + iy + 1 = 4 - 3i$ ہو۔

2.6 کمپلیکس اعداد پر بنیادی عوامل (Basic Operations on Complex Numbers)

(i) جمع (Addition) کا عمل

اگر $z_1 = a + ib$ اور $z_2 = c + id$ دو کمپلیکس اعداد ہوں تو z_1 اور z_2 کی حاصل جمع کو $z_1 + z_2$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ،

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

یعنی

دو کمپلیکس اعداد کا حاصل جمع ایک ایسا کمپلیکس عدد ہے جس کا حقیقی حصہ ان اعداد z_1 اور z_2 کے حقیقی حصے کا حاصل

جمع اور امیجری (imaginary) حصہ دونوں اعداد کے امیجری حصے کا حاصل جمع ہو۔

مثلاً $(3 - 8i) + (5 + 2i) = (3 + 5) + (-8 + 2)i = 8 - 6i$

(ii) ضرب (Multiplication) کا عمل

اگر $z_1 = a + ib$ اور $z_2 = c + id$ دو کمپلیکس اعداد ہوں تو ان کا حاصل ضرب $z_1 z_2$ یوں معلوم کیا جاتا ہے:

$$z_1 z_2 = (a + bi)(c + di) = a(c + di) + bi(c + di) \\ = ac + adi + bci + bdi^2$$

$$= (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$(2 - 3i)(4 + 5i) = 8 + 10i - 12i - 15i^2 \quad \text{مثلاً}$$

$$= 8 - 2i + 15, \quad i^2 = -1$$

$$= 23 - 2i$$

(iii) تفریق (Subtraction) کا عمل

اگر $z_1 = a + ib$ اور $z_2 = c + id$ دو کمپلیکس نمبرز ہوں تو z_1 اور z_2 کا فرق $z_1 - z_2$ ہوگا۔

جس کا حقیقی حصہ z_1 کے حقیقی حصہ سے z_2 کے حقیقی حصہ کا حاصل تفریق ہوگا اور امیجری حصہ z_1 کے امیجری حصہ سے z_2 کے امیجری حصہ کا حاصل تفریق ہوگا۔

$$z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) \quad \text{جیسا کہ}$$

$$= (a - c) + (b - d)i$$

$$\text{مثلاً اگر } z_1 = (-2 + 3i) \text{ اور } z_2 = 2 + i$$

$$z_1 - z_2 = (-2 + 3i) - (2 + i) \quad \text{تو}$$

$$= (-2 - 2) + (3 - 1)i$$

$$= -4 + 2i$$

(iv) تقسیم (Division) کا عمل

اگر $z_1 = a + ib$ اور $z_2 = c + id$ دو کمپلیکس نمبرز ہوں، تو z_1 کو z_2 پر تقسیم سے حاصل نمبر $\frac{z_1}{z_2}$ ہوگا۔

جبکہ

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \times \frac{c - di}{c - di}$$

$\frac{z_1}{z_2}$ میں z_1 اور z_2 کو z_2 کے کانجوگیٹ (conjugate) سے ضرب دینے سے ہم حاصل کرتے ہیں:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{ac + bci - adi - bdi^2}{c^2 - (di)^2}$$

$$= \frac{ac + bci - adi + bd}{c^2 + d^2}, \quad (i^2 = -1)$$

$$= \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) i$$

جمعی، تفریقی، ضربی اور تقسیمی عوامل درج ذیل مثالوں سے مزید واضح کیے جاتے ہیں:

مثال 1 $(-1 + \sqrt{-2})^2$ کا حقیقی اور امیجزی حصہ الگ الگ کیجیے۔

حل اگر $z = -1 + \sqrt{-2}$ ، تو

$$z^2 = (-1 + \sqrt{-2})^2 = (-1 + i\sqrt{2})^2$$

$$= (-1 + i\sqrt{2})(-1 + i\sqrt{2})$$

$$= (-1)(-1 + i\sqrt{2}) + i\sqrt{2}(-1 + i\sqrt{2})$$

$$= 1 - i\sqrt{2} - i\sqrt{2} + 2i^2 = -1 - 2\sqrt{2}i$$

$$\Rightarrow \text{حقیقی حصہ } (z^2) = -1 \text{ اور } \text{امیجزی حصہ } (z^2) = -2\sqrt{2}i$$

مثال 2 $\frac{1}{1+2i}$ کو معیاری شکل $a + bi$ میں ظاہر کیجیے۔

حل

$$\frac{1}{1+2i} = \frac{1}{1+2i} \times \frac{1-2i}{1-2i}$$

$$= \frac{1-2i}{(1+2i)(1-2i)} \quad \left(\frac{1}{1+2i} \text{ میں شمار کنندہ اور مخارج دونوں کو } (1-2i) \text{ سے ضرب دینے سے} \right)$$

$$= \frac{1-2i}{1-4i^2} = \frac{1-2i}{1+4}, \quad i^2 = -1$$

$$= \frac{1-2i}{5} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$$

مثال 3 $\frac{4+5i}{4-5i}$ کو معیاری شکل $a + bi$ میں حاصل کریں۔

حل

$$\frac{4+5i}{4-5i} = \frac{4+5i}{4-5i} \times \frac{4+5i}{4+5i} \quad \left(4+5i \text{ سے ضرب اور تقسیم کرنے سے} \right)$$

$$= \frac{(4+5i)(4+5i)}{(4-5i)(4+5i)}$$

$$= \frac{4(4+5i) + 5i(4+5i)}{16+25}$$

$$= \frac{16+20i+20i-25}{41} = \frac{16-25+40i}{41}$$

$$= \frac{-9+40i}{41} = -\frac{9}{41} + \frac{40}{41}i$$

مطلوبہ شکل ہے۔

مثال 4 $(3 - 4i)(x + yi) = 1 + 0i$ کو x اور y میں حل کیجیے۔

$$(3 - 4i)(x + yi) = 1 + 0i$$

$$\Rightarrow 3x + 3iy - 4ix - 4i^2y = 1 + 0i$$

$$\Rightarrow 3x + (3y - 4x)i + 4y = 1 + 0i$$

$$\Rightarrow 3x + 4y + (3y - 4x)i = 1 + 0i$$

کمپلیکس اعداد میں برابری کے تصور کی مدد سے

$$3y - 4x = 0 \text{ اور } 3x + 4y = 1$$

دونوں مساواتوں کو باہم حل کرنے سے $x = \frac{3}{25}$ اور $y = \frac{4}{25}$ مطلوبہ حل ہے۔

مشق 2.6

1- نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے درست یا غلط کی نشاندہی کریں۔

(i) $\sqrt{-3}\sqrt{-3} = 3$ (ii) $i^{73} = -i$ (iii) $i^{10} = -1$

(iv) $(-6i + i^2)$ کا کنجوگیٹ $(-1 + 6i)$ ہے۔

(v) کمپلیکس عدد $z = a + bi$ اور اس کے کنجوگیٹ کا فرق ایک حقیقی عدد ہے۔

(vi) اگر $(a - 1) - (b + 3)i = 5 + 8i$ ہو تو، $a = 6$ اور $b = -11$

(vii) ایک کمپلیکس عدد کو اس کے کنجوگیٹ سے ضرب دینے سے ہمیشہ ایک مثبت حقیقی عدد حاصل ہوتا ہے۔

2- مندرجہ ذیل کمپلیکس اعداد کو $a + bi$ کی شکل میں حاصل کریں جبکہ a اور b حقیقی اعداد ہوں۔

(i) $(2 + 3i) + (7 - 2i)$

(ii) $2(5 + 4i) - 3(7 + 4i)$

(iii) $-(-3 + 5i) - (4 + 9i)$

(iv) $2i^2 + 6i^3 + 3i^{16} - 6i^{19} + 4i^{25}$

3- مندرجہ ذیل کو $a + bi$ کی شکل میں مختصر کریں۔

(i) $(-7 + 3i)(-3 + 2i)$

(ii) $(2 - \sqrt{-4})(3 - \sqrt{-4})$

(iii) $(\sqrt{5} - 3i)^2$

(iv) $(2 - 3i)(3 - 2i)$

4- مندرجہ ذیل کو $a + bi$ کی شکل میں مختصر کریں۔

(i) $\frac{-2}{1+i}$

(ii) $\frac{2+3i}{4-i}$

(iii) $\frac{9-7i}{3+i}$

(iv) $\frac{2-6i}{3+i} - \frac{4+i}{3+i}$

(v) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2$

(vi) $\frac{1}{(2+3i)(1-i)}$

5- مندرجہ ذیل کے (a) \bar{z} (b) $z + \bar{z}$ (c) $z - \bar{z}$ اور (d) $z \bar{z}$ کی قیمت معلوم کریں۔

(i) $z = -i$

(ii) $z = 2 + i$

(iii) $z = \frac{1+i}{1-i}$

(iv) $z = \frac{4-3i}{2+4i}$

6- اگر $z = 2 + 3i$ اور $w = 5 - 4i$ تو تصدیق کریں کہ

(i) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$

(ii) $\overline{z-w} = \bar{z} - \bar{w}$

(iii) $\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$

(iv) $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$ ، $w \neq 0$

(v) $\frac{1}{2}(z + \bar{z})$ ، z کا حقیقی حصہ ہے

(vi) $\frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ ، z کا ایجنری حصہ ہے

7- مندرجہ ذیل مساواتوں کو x اور y میں حل کریں۔

(i) $(2 - 3i)(x + yi) = 4 + i$

(ii) $(3 - 2i)(x + yi) = 2(x - 2yi) + 2i - 1$

(iii) $(3 + 4i)^2 - 2(x - yi) = x + yi$

اعادہ مشق 2

1- دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) $(27x^{-1})^{-2/3} = \dots\dots\dots$

(a) $\sqrt[3]{x^2}$

(b) $\sqrt{x^3}$

(c) $\sqrt[3]{x^2}$

(d) $\sqrt{x^3}$

(ii) $\sqrt[7]{x}$ کو پاور فارم میں لکھیے.....

- (a) x (b) x^7 (c) $x^{1/7}$ (d) $x^{7/2}$

(iii) $4^{2/3}$ کو ریڈیکل فارم میں لکھیے.....

- (a) $\sqrt[3]{4^2}$ (b) $\sqrt{4^3}$ (c) $\sqrt[2]{4^3}$ (d) $\sqrt{4^6}$

(iv) $\sqrt[3]{35}$ میں ریڈیکنڈ..... ہے۔

- (a) 3 (b) $\frac{1}{3}$ (c) 35 (d) کوئی نہیں

(v) = $\left(\frac{25}{16}\right)^{-1/2}$

- (a) $\frac{5}{4}$ (b) $\frac{4}{5}$ (c) $-\frac{5}{4}$ (d) $-\frac{4}{5}$

(vi) $5 + 4i$ کا جوگیٹ..... ہے۔

- (a) $-5 + 4i$ (b) $-5 - 4i$ (c) $5 - 4i$ (d) $5 + 4i$

(vii) i^9 کی قیمت..... ہے۔

- (a) 1 (b) -1 (c) i (d) $-i$

(viii) ہر حقیقی نمبر..... ہے۔

- (a) ایک مثبت صحیح عدد (b) ایک ناطق نمبر
(c) ایک منفی صحیح عدد (d) ایک کمپلیکس نمبر

(ix) کمپلیکس نمبر $2ab(i + i^2)$ کا حقیقی حصہ..... ہے۔

- (a) $2ab$ (b) $-2ab$ (c) $2abi$ (d) $-2abi$

(x) کمپلیکس نمبر $-i(3i + 2)$ کا امیجری حصہ..... ہے۔

- (a) -2 (b) 2 (c) 3 (d) -3

(xi) کونسا سیٹ..... بخاطر جمع خاصیت بندش کا حامل ہے؟

- (a) $\{0\}$ (b) $\{0, -1\}$
(c) $\{0, 1\}$ (d) $\left\{1, \sqrt{2}, \frac{1}{2}\right\}$

(xii) کون سی خصوصیت کے استعمال سے $-\frac{\sqrt{5}}{2} \times 1 = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ ہے۔

(a) ضربی معکوس (b) ضربی ذاتی عنصر (c) جمعی معکوس (d) جمعی ذاتی عنصر

(xiii) اگر $z < 0$ تو $x < y \Rightarrow$

(a) $xz < yz$ (b) $xz > yz$
(c) $xz = yz$ (d) کوئی نہیں

(xiv) اگر $a, b \in \mathbb{R}$ اور صرف ایک $a = b$ یا $a < b$ یا $a > b$ درست ہے۔ یہ کون سی خاصیت کہلاتی ہے؟

(a) ثلاثی (b) متعدیت (c) جمعی (d) ضربی

(xv) ایک غیر اختتامی غیر تکراری اعشاری عدد عدد ہے۔

(a) قدرتی عدد (b) ناطق عدد (c) غیر ناطق عدد (d) پرائم (مفرد) عدد

2- مندرجہ ذیل میں سے درست یا غلط کی نشاندہی کریں۔

(i) تقسیم کا عمل حقیقی اعداد کے سیٹ R پر خاصیت تلازم نہیں رکھتا۔

(ii) سیٹ W کا ہر عدد قدرتی عدد ہے۔

(iii) نمبر 0.02 کا ضربی معکوس 50 ہے۔

(iv) π ایک ناطق عدد ہے۔

(v) ہر صحیح عدد ایک ناطق عدد ہے۔

(vi) تفریق کا عمل خاصیت مبادلہ کا حامل ہے۔

(vii) ہر حقیقی عدد ایک ناطق عدد ہے۔

(viii) اعشاری ناطق عدد یا اختتامی عدد ہے یا تکراری۔

(ix) $1.\bar{8} = 1 + \frac{8}{9}$

3- درج ذیل کو مختصر کیجیے۔

(i) $\sqrt[4]{81y^{-12}x^{-8}}$

(ii) $\sqrt{25x^{10n}y^{8m}}$

(iii) $\left(\frac{x^3y^4z^5}{x^{-2}y^{-1}z^{-5}}\right)^{\frac{1}{5}}$

(iv) $\left(\frac{32x^{-6}y^{-4}z}{625x^4y^4z^{-4}}\right)^{2/5}$

z

4- $\sqrt{\frac{(216)^{2/3} \times (25)^{1/2}}{(0.04)^{-3/2}}}$ کو مختصر کیجیے۔

$$\left(\frac{a^p}{a^q}\right)^{p+q} \cdot \left(\frac{a^q}{a^r}\right)^{q+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}, a \neq 0 \quad -5$$

$$\left(\frac{a^{2l}}{a^{l+m}}\right) \left(\frac{a^{2m}}{a^{m+n}}\right) \left(\frac{a^{2n}}{a^{n+l}}\right) \quad -6$$

$$\sqrt[3]{\frac{a^l}{a^m}} \times \sqrt[3]{\frac{a^m}{a^n}} \times \sqrt[3]{\frac{a^n}{a^l}} \quad -7$$

خلاصہ

☆ تمام حقیقی اعداد کا سیٹ $R = Q \cup Q'$ ہے۔ جب کہ

$$Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0 \right\}$$

اور

$$Q' = \left\{ x \mid x \neq \frac{p}{q} \wedge p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

☆ تمام حقیقی اعداد کے سیٹ R کی تمام جمعی اور ضربی خصوصیات:

(i) خاصیت بندش:

$$a + b \in R, ab \in R, \forall a, b \in R$$

(ii) خاصیت تلازم:

$$(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc), \forall a, b, c \in R$$

(iii) خاصیت مبادلہ:

$$a + b = b + a, ab = ba, \forall a, b \in R$$

(iv) خاصیت ذاتی عنصر:

$$a + 0 = a = 0 + a, \forall a \in R \quad (\text{جمعی})$$

$$a \cdot 1 = a = 1 \cdot a, \forall a \in R \quad (\text{ضربی})$$

(v) خاصیت معکوس:

$$a + (-a) = 0 = (-a) + a, \forall a \in R \quad (\text{جمعی})$$

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \cdot a, a \neq 0 \quad (\text{ضربی})$$

(vi) خاصیت تقسیمی:

$$a(b + c) = ab + ac, \forall a, b, c \in R$$

$$(b + c)a = ba + ca \quad (\text{جمعی})$$

$$a(b - c) = ab - ac,$$

$$(a - b)c = ac - bc \quad (\text{تفریقی})$$

☆ برابری کی خصوصیات

$$a = a, \forall a \in \mathbb{R}$$

(i) عکسی خاصیت

$$a = b \Rightarrow b = a, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

(ii) تشاکل خاصیت

$$a = b, b = c \Rightarrow a = c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(iii) متعدیت خاصیت

$$a = b \Rightarrow a + c = b + c$$

(iv) جمعی خاصیت

$$a = b \Rightarrow ac = bc$$

(v) ضربی خاصیت

$$ac = bc, c \neq 0 \Rightarrow a = b$$

(vi) تنسبی خاصیت

☆ ریڈیکل $\sqrt[n]{x}$ میں $\sqrt{\quad}$ ریڈیکل کا نشان ہے، x ریڈیکنڈ ہے یا بیس اور n ریڈیکل کا انڈیکس ہے۔

☆ انڈیکس پاورز اور اس کے قوانین:

$$(a^m)^n = a^{mn}, (ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$$

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0$$

☆ کمپلیکس عدد $z = a + bi$ کو امبجری (imaginary) نمبر $i = \sqrt{-1}$ سے متعارف کرایا گیا جبکہ

$$a, b \in \mathbb{R} \text{ اور } z = a \text{ حقیقی حصہ اور } z = bi \text{ امبجری حصہ}$$

☆ کمپلیکس عدد $z = a + bi$ کا کنجوگیٹ $\bar{z} = a - bi$ مانا جاتا ہے۔

لوگار تھم

(LOGARITHMS)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

3.1	سائنسی ترقیم (Scientific Notation)
3.2	لوگار تھم (Logarithm)
3.3	عام اور قدرتی لوگار تھم (Common and Natural Logarithm)
3.4	لوگار تھم کے قوانین (Laws of Logarithm)
3.5	لوگار تھم کا استعمال (Application of Logarithm)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر علمی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ عام ترقیم (standard form) میں دیے گئے عدد کو سائنسی ترقیم (scientific notation) میں اور اس کے برعکس لکھ سکیں۔

☆ تعریف کر سکیں کہ اساس 'a' پر کسی عدد y کے لوگار تھم سے مراد 'a' کا وہ قوت نما x ہے جس سے $a^x = y$ حاصل ہو جائے۔

(یعنی $y > 0$ اور $a > 0, a \neq 1$ اور $a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x$)

☆ عام لوگار تھم، کسی عدد کے لوگار تھم کے خاصہ (Characteristic) اور مینٹیسا (Mantissa) کی تعریف کر سکیں۔

☆ کسی عدد کا log معلوم کرنے کے لیے لوگار تھم کی جدول (log tables) کے استعمال کا طریقہ سیکھ سکیں۔

☆ ضد لوگار تھم (antilog) کے تصور کو سیکھ کر متعلقہ جدول (antilog tables) کی مدد سے کسی عدد کا ضد لوگار تھم معلوم کر سکیں۔

☆ عام اور قدرتی لوگار تھم کے درمیان فرق کر سکیں۔

☆ لوگار تھم کے مندرجہ ذیل قوانین ثابت کر سکیں۔

$$(i) \log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$$

$$(ii) \log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$$

$$(iii) \log_a m^n = n \log_a m$$

$$(iv) \log_a m \log_m n = \log_a n$$

☆ لوگار تھم کے قوانین کو استعمال کر کے ضرب، تقسیم، اعداد کی کوئی قوت نمائی یا جذر لینے جیسے لمبے (پیچیدہ) ریاضیاتی عوامل کے استعمال کو جمع اور تفریق جیسے آسان تر عوامل میں تبدیل کر سکیں۔

تعارف

لوگار تھم کے استعمال سے مشکل اور پیچیدہ حساب کتاب کے مسائل آسان تر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایجاد کا سہرا مسلمان ریاضی دان ابو محمد موسیٰ الخوارزمی کے سر ہے۔ بعد میں جان نیپئر (John Napier) نے اس میں مزید اصلاح کی اور لوگار تھم کی جدولیں (log tables) تیار کیں۔ اس جدول کے لیے اس نے اساس (base) 'e' استعمال کی۔ پروفیسر ہنری برگز (Henry Briggs) کو جان نیپئر کے کام میں خاصی دلچسپی تھی۔ برگز نے اساس 10 والی لوگار تھم جدولیں تیار کیں۔ 1620ء میں جابست برگی (Jobst Burgi) نے ضد لوگار تھم (antilogarithms) کی جدول تیار کی۔

3.1 سائنسی ترقیم (Scientific Notation)

سائنس اور فنی کام میں ہمیں ایسے اعداد کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے جو یا تو بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین سے سورج تک فاصلہ قریباً 150,000,000 کلومیٹر اور ہائیڈروجن ایٹم کا وزن 0.000,000,000,000,000,000,001,7 گرام ہے۔ جب ان اعداد کو عام ترقیم میں لکھتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ کوئی ایک صفر چھوڑ دیا جائے یا صفر کی اصل تعداد سے زیادہ لکھ دیے جانے کی غلطی ہو جائے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے سائنسدانوں نے بہت چھوٹے یا بہت بڑے عام اعداد کو ظاہر کرنے کے لیے ایک جامع، بالکل ٹھیک اور موزوں طریقہ رائج (develop) کیا جسے ”سائنسی ترقیم“ کہتے ہیں۔

کسی دیے گئے عدد کو سائنسی ترقیم میں لکھنے کے لیے اسے $a \times 10^n$ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔

جبکہ $1 \leq a < 10$ اور n ایک صحیح عدد ہو۔

مذکورہ بالا اعداد کو سائنسی ترقیم میں آسانی کے ساتھ بالترتیب 1.5×10^8 کلومیٹر اور 1.7×10^{-24} گرام

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال 1 عام ترقیم میں لکھے گئے درج ذیل اعداد کو سائنسی ترقیم میں لکھیں۔

(i) 30600 (ii) 0.000058

(i) $30600 = 3.06 \times 10^4$ (نقطہ اعشاریہ کو چار درجے بائیں طرف حرکت دیں) حل

(ii) $0.000058 = 5.8 \times 10^{-5}$ (نقطہ اعشاریہ کو پانچ درجے دائیں طرف حرکت دیں)

مشاہدہ کریں کہ کسی عدد کو سائنسی ترقیم میں لکھنے کے لیے

(i) دیے گئے عدد کے بائیں جانب سے پہلے غیر صفر ہندسے کے بعد نقطہ اعشاریہ لگائیں۔

(ii) پہلے مرحلے یعنی (i) میں حاصل کردہ عدد کو 10^n سے ضرب دیتے ہیں اگر ہم نے نقطہ اعشاریہ کی جگہ کو n درجے بائیں جانب حرکت دی ہو۔

(iii) پہلے مرحلے یعنی (i) میں حاصل کردہ عدد کو 10^{-n} سے ضرب دیتے ہیں اگر ہم نے نقطہ اعشاریہ کی جگہ کو n درجے دائیں جانب حرکت دی ہو۔

دوسری طرف اگر ہم کسی عدد کو سائنسی ترقیم سے عام ترقیم میں تبدیل کرنا چاہتے ہوں تو اوپر لکھے ہوئے طریق کار کو صرف برعکس عمل کر دیتے ہیں۔

مثال 2 سائنسی ترقیم میں لکھے گئے درج ذیل اعداد کو عام ترقیم میں تبدیل کریں۔

(i) 6.35×10^6 (ii) 7.61×10^{-4}

(i) $6.35 \times 10^6 = 6350000$ (نقطہ اعشاریہ کو چھ درجے دائیں طرف حرکت دیں) حل

(ii) $7.61 \times 10^{-4} = 0.000761$ (نقطہ اعشاریہ کو چار درجے بائیں طرف حرکت دیں)

مشق 3.1

مندرجہ ذیل اعداد کو سائنسی ترقیم میں لکھیے۔ -1

- | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| (i) 5700 | (ii) 49,800,000 | (iii) 96,000,000 |
| (iv) 416.9 | (v) 83,000 | (vi) 0.00643 |
| (vii) 0.0074 | (viii) 60,000,000 | (ix) 0.00000000395 |
| (x) $\frac{275,000}{0.0025}$ | | |

2- مندرجہ ذیل اعداد کو عام ترتیم میں لکھیے۔

(i) 6×10^{-4}

(ii) 5.06×10^{10}

(iii) 9.018×10^{-6}

(iv) 7.865×10^8

3.2 لوگارٹھم (Logarithm)

اعداد و شمار کے مسائل کو صحیح اور تیزی سے حل کرنے کے لیے لوگارٹھم کا عمل بہت مفید اور موثر طریقہ ہے۔ اساس '10' کے لوگارٹھم کو عام لوگارٹھم اور اساس 'e' کے لوگارٹھم کو قدرتی لوگارٹھم کہتے ہیں۔ اب ہم اساس 'a' کے لوگارٹھم کی تعریف کریں گے جبکہ 'a' ایک حقیقی عدد ہو اور $a > 0$ اور $a \neq 1$

3.2.1 حقیقی عدد کا لوگارٹھم

اگر $a^x = y$ جبکہ $a, x, y \in \mathbb{R}$ اور $a > 0$ اور $a \neq 1$ اور $y > 0$ تو x کو اساس 'a' پر y کا لوگارٹھم

کہتے ہیں اور اسے $\log_a y = x$ لکھتے ہیں۔

$\log_a y = x$ اور $a^x = y$ دو مترادف مساواتیں ہیں۔ اگر کوئی ایک مساوات دی گئی ہو تو اسے دوسری میں

بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی

$$a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x$$

$a^x = y$ کو قوت نمائی شکل اور $\log_a y = x$ کو لوگارٹھمی شکل کہتے ہیں۔

اس اضافی نقطہ کی وضاحت کے لیے مشاہدہ کریں کہ

$3^2 = 9$ مترادف ہے $\log_3 9 = 2$ کے (یعنی $3^2 = 9 \Rightarrow \log_3 9 = 2$)

اور $2^{-1} = \frac{1}{2}$ مترادف ہے $\log_2 \left(\frac{1}{2}\right) = -1$ کے (یعنی $2^{-1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \log_2 \left(\frac{1}{2}\right) = -1$)

اسی طرح $\log_3 27 = 3$ مترادف ہے $27 = 3^3$ کے (یعنی $\log_3 27 = 3 \Rightarrow 27 = 3^3$)

مثال 3 $\log_4 2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

$$\log_4 2 = x$$

اگر

کسی منفی عدد کا
لوگارٹھم اس مرحلے
پر زیر بحث نہیں ہے۔

تو قوت نمائی شکل میں لکھنے سے

$$4^x = 2$$

$$\Rightarrow 2^{2x} = 2^1$$

$$\Rightarrow 2x = 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \log_4 2 = \frac{1}{2}$$

x کی قیمت درج کرنے سے

لوگارٹھم کی تعریف سے اخذ کردہ نتائج

$$(i) \quad a^0 = 1 \Rightarrow \log_a 1 = 0$$

$$(ii) \quad a^1 = a \Rightarrow \log_a a = 1$$

3.2.2 عام لوگارٹھم، خاصہ اور مینٹیسا (Common Logarithm, Characteristic and Mantissa)

عام لوگارٹھم کی تعریف

روزمرہ زندگی میں اعداد و شمار کے لیے لوگارٹھم کی اساس 10 لی جاتی ہے۔ ایسے لوگارٹھم کو

عام لوگارٹھم یا برگز لوگارٹھم کہتے ہیں۔ ہنری برگز (Henry Briggs) ایک انگریز ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھا جس نے اساس 10 کی لوگارٹھم جدولیں تیار کیں۔ اس کے اعزاز میں ہی عام لوگارٹھم کو برگز لوگارٹھم کہتے ہیں۔

کسی عدد کے لوگارٹھم کا خاصہ اور مینٹیسا

مندرجہ ذیل پر غور کیجیے

$$10^3 = 1000 \quad \Leftrightarrow \quad \log 1000 = 3$$

$$10^2 = 100 \quad \Leftrightarrow \quad \log 100 = 2$$

$$10^1 = 10 \quad \Leftrightarrow \quad \log 10 = 1$$

$$10^0 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \log 1 = 0$$

$$10^{-1} = 0.1 \quad \Leftrightarrow \quad \log 0.1 = -1$$

$$10^{-2} = 0.01 \quad \Leftrightarrow \quad \log 0.01 = -2$$

$$10^{-3} = 0.001 \quad \Leftrightarrow \quad \log 0.001 = -3$$

نوٹ: اگر صرف عام لوگارٹھم کا استعمال ہی زیر بحث ہو تو اساس 10 نہیں لکھی جاتی۔ یعنی log کے ساتھ اساس نہ لکھی ہو تو اساس 10 تصور کی جائے گی۔

اب درج ذیل جدول پر بھی غور کیجیے۔

لوگار تھم	برائے اعداد
کسرا عشاریہ	1 اور 10 کے درمیان
کسرا عشاریہ +1	10 اور 100 کے درمیان
کسرا عشاریہ +2	100 اور 1000 کے درمیان
کسرا عشاریہ -1	0.1 اور 1 کے درمیان
کسرا عشاریہ -2	0.01 اور 0.1 کے درمیان
کسرا عشاریہ -3	0.001 اور 0.01 کے درمیان

مشاہدہ کریں کہ

- کسی عدد کا لوگار تھم (جو 10 کی صحیح عددی قوت نہ ہو) دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
- (i) ایک صحیح عددی حصہ جو '1' سے بڑے عدد کے لیے مثبت اور '1' سے چھوٹے عدد کے لیے منفی ہوتا ہے۔
- کسی عدد کے لوگار تھم کے صحیح عددی حصے کو لوگار تھم کا خاصہ (characteristic) کہتے ہیں۔
- (ii) ایک کسری حصہ جو ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ اس کسری حصے کو مینٹیسما (mantissa) کہتے ہیں۔

(i) '1' سے بڑے عدد کے لوگار تھم کا خاصہ

مندرجہ بالا جدول کے پہلے حصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی عدد کا صحیح عددی حصہ ایک ہندسہ پر مشتمل ہو تو عدد کے لوگار تھم کا خاصہ 0 ہوتا ہے۔ اگر کسی عدد کا صحیح عددی حصہ دو ہندسوں پر مشتمل ہو تو عدد کے لوگار تھم کا خاصہ 1 ہوتا ہے۔ اگر کسی عدد کا صحیح عددی حصہ تین ہندسوں پر مشتمل ہو تو عدد کے لوگار تھم کا خاصہ 2 ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ دوسرے الفاظ میں '1' سے بڑے عدد کے لوگار تھم کا خاصہ ہمیشہ صحیح عددی حصے کے ہندسوں کی تعداد سے ایک کم ہوتا ہے۔

عدد کو سائنسی ترقیم میں لکھ کر بھی خاصہ معلوم کر سکتے ہیں۔

اگر کسی عدد 'b' کو سائنسی ترقیم میں لکھا جائے۔ یعنی

$$b = a \times 10^n, 1 \leq a < 10$$

تو $\log b$ کا خاصہ 10 کے قوت نما n کے برابر ہوتا ہے۔

مثال سائنسی ترقیم میں لکھ کر اور 10 کی قوت نمائی شکل کو نوٹ کرتے ہوئے درج ذیل اعداد کے لوگار تھم کا خاصہ معلوم کریں:

1.02، 99.6، 102 اور 1662.4

عدد	سائنسی ترقیم	لوگار تھم کا خاصہ
1.02	1.02×10^0	0
99.6	9.96×10^1	1
102	1.02×10^2	2
1662.4	1.6624×10^3	3

'1' سے چھوٹے عدد کے لوگار تھم کا خاصہ

زیر بحث جدول کا دوسرا حصہ ظاہر کرتا ہے کہ

اگر کسی عدد میں نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد کوئی '0' موجود نہ ہو تو عدد کے لوگار تھم کا خاصہ '1-' ہوتا ہے۔

اگر کسی عدد میں نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد ایک '0' موجود ہو تو عدد کے لوگار تھم کا خاصہ '2-' ہوتا ہے۔

اگر کسی عدد میں نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد دو '0' موجود ہوں تو عدد کے لوگار تھم کا خاصہ '3-' ہوتا ہے۔

وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے الفاظ میں '1' سے کم عدد کے لوگار تھم کا خاصہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے اور عدد کے نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد موجود

صفر کی تعداد سے '1' زیادہ۔

مثال (سائنسی ترقیم کا استعمال)

سائنسی ترقیم میں لکھ کر اور 10 کی قوت نما نوٹ کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اعداد کے لوگار تھم کا خاصہ معلوم کریں:

0.00345 اور 0.02، 0.872

حل

عدد	سائنسی ترقیم	لوگار تھم کا خاصہ
0.872	8.72×10^{-1}	-1
0.02	2.0×10^{-2}	-2
0.00345	3.45×10^{-3}	-3

جب کوئی عدد '1' سے چھوٹا ہو تو عام طور پر اس عدد کے لوگار تھم کے خاصہ مثلاً 3- کو '3' اور 2- کو '2' اور

1- کو '1' لکھا جاتا ہے (3 کو بار 3 پڑھتے ہیں) تاکہ مینٹیس کو منفی نہ سمجھ لیا جائے۔

نوٹ 2.3748 کا مطلب -2.3748 نہیں ہوتا۔ بلکہ 2.3748 میں 2 منفی ہے اور 0.3748 مثبت،

جبکہ -2.3748 میں 2 اور 0.3748 دونوں ہی منفی ہیں۔

(ii) کسی عدد کے لوگارٹھم کا مینٹیسما معلوم کرنے کا طریقہ

کسی عدد کے لوگارٹھم کا خاصہ مندرجہ بالا راہنمائی نقاط کی مدد سے محض بغور جائزہ لینے سے لکھا جاتا ہے۔ جبکہ مینٹیسما لوگارٹھمی جدول کے استعمال سے معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ جدول سات درجے کسرا عشریہ تک لوگارٹھم معلوم کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ لیکن تمام عملی مقاصد کے لیے چار ہندسی لوگارٹھمی جدول کافی حد تک صحیح جواب مہیا کر دیں گی۔
لوگارٹھمی جدول تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں:

(a) جدول کا پہلا حصہ انتہائی بائیں جانب والا کالم (column) ہے جس کا بالائی سر ایک خالی مربع ہے۔ اس کالم میں 10 سے 99 تک دو ہندسوں والے اعداد درج ہیں۔ جس عدد کا لوگارٹھم مطلوب ہو اس کے بائیں جانب والے پہلے دو ہندسے اس کالم میں سے تلاش کیے جاتے ہیں۔

(b) جدول کا دوسرا حصہ 10 کالموں پر مشتمل ہے جن کے بالائی سرے خالی مربع کی افقی سیدھ میں بنے ہوئے خانے ہیں۔ جن میں اعداد 0، 1، 2، ...، 9 درج ہیں۔ زیر بحث عدد کا بائیں جانب سے تیسرا ہندسہ ان (0 سے 9) میں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس تیسرے ہندسے والے کالم اور (a) والے دو ہندسوں کے عین سامنے والی قطار میں (دونوں کے تقاطع پر) درج شدہ عدد نوٹ کر لیتے ہیں۔ (مینٹیسما معلوم کرتے وقت دیے گئے عدد میں نقطہ اعشاریہ آسانی کے لیے وقتی طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں)

(c) جدول کا تیسرا حصہ 1 سے 9 تک مزید کالموں پر مشتمل ہوتا ہے جن کو فرق والے کالم (mean differences columns) کہتے ہیں۔ ان میں سے زیر بحث عدد کے چوتھے ہندسے کے مطابق کالم اور (a) میں بیان کردہ قطار کے تقاطع پر جو نمبر درج ہو اسے (b) میں نوٹ کیے ہوئے عدد میں جمع کر لیتے ہیں۔ اس مجموعہ کے ساتھ پہلے نظر انداز کیا ہوا نقطہ اعشاریہ لگا کر مطلوبہ مینٹیسما (کسرا عشریہ) حاصل ہو گا۔

کسی عدد کے log کا مینٹیسما معلوم کرنے کے لیے جب چار ہندسی لوگارٹھمی جدول کو استعمال کرنا ہو تو دیے گئے عدد میں نقطہ اعشاریہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے چار اہم ہندسوں (significant figures) تک قریباً صحیح (راؤنڈ آف) کر لیا جاتا ہے۔

3.2.3 کسی عدد کا لوگارٹھم معلوم کرنے کے لیے جدول کا استعمال

دیے گئے عدد کا لوگارٹھم معلوم کرنے کے طریقہ کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے کی جائے گی۔ پہلی دو مثالوں میں ہم صرف مینٹیسما معلوم کرنے تک محدود رہیں گے۔

مثال 1 $\log 43.254$ کا مینٹیسما معلوم کیجیے۔

حل نقطہ اعشاریہ کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے 43.254 کو راونڈ آف کرنے سے چار اہم ہندسوں والا عدد 4325 بنایا۔

(i) سب سے پہلے لوگارٹھی جدول کے انتہائی بائیں جانب کے پہلے کالم میں دو ہندسوں والے اعداد میں 43 کے سامنے کی قطار تلاش کریں گے۔

(ii) اس قطار اور کالم 2 کے نیچے (قطار اور کالم کے تقاطع) پر دیے گئے نمبر 6355 کو نوٹ کریں گے۔

(iii) اسی قطار میں فرق والے کالم 5 کے نیچے دونوں کے تقاطع پر عدد 5 درج ہے۔

(iv) ان دونوں اعداد کو جمع کر کے حاصل کردہ نمبر 6360 ($6355 + 0005$) مطلوبہ مینٹیسما کی نشاندہی کرتا ہے جو 0.6360 ہو گا۔

یعنی $\log 43.25 = 0.6360$ ہو گا۔

مثال 2 $\log 0.002347$ کا مینٹیسما معلوم کیجیے۔

حل یہاں بھی ہم چار اہم ہندسوں کو لیں گے یعنی 2347

پہلے کی طرح لوگارٹھی جدول میں 23 کے سامنے والی قطار اور 4 کے نیچے کالم کے تقاطع پر لکھا ہوا عدد 3692 نوٹ کیا۔

اسی قطار یعنی 23 کے سامنے والی قطار اور فرق والے کالم 7 کے تقاطع پر 13 درج ہے۔

3692 اور 13 کو جمع کر کے حاصل کردہ نمبر 3705 ہے۔

لہذا $\log(0.002347)$ کا مینٹیسما 0.3705 ہو گا۔

نوٹ: ایسے اعداد جن کے اہم ہندسوں کی ترتیب یکساں ہو ان کے \log کا مینٹیسما بھی یکساں ہوتا ہے۔
مثلاً $\log 0.02347$ اور $\log 0.2347$ دونوں کا مینٹیسما 0.3705 ہی ہے۔

کسی دیے گئے عدد کا لوگارٹھم معلوم کرنے کے لیے:

(i) عدد کو راونڈ آف (round off) کر کے چار اہم ہندسوں تک محدود کر دیں۔

(ii) بغور جائزہ لے کر عدد کے \log کا خاصہ معلوم کریں۔

(iii) لوگارٹھی جدول کی مدد سے عدد کے \log کا مینٹیسما معلوم کریں۔

(iv) خاصہ اور مینٹیسما دونوں کو ملا کر عدد کے \log کی قیمت حاصل ہوگی۔

مثال 3 (i) $\log 278.23$ اور (ii) $\log 0.07058$ کی قیمت معلوم کیجیے۔
 حل (i) 278.23 کو رائونڈ آف کرنے سے چار اہم ہندسوں والا عدد 278.2 ہے۔
 278.2 کا صحیح عددی حصہ 3 ہندسوں پر مشتمل ہے۔ پس

$$3 - 1 = 2, \dots\dots = 2 \text{ خاصہ}$$

اب مینٹیا معلوم کرنے کے لیے لوگار تھی جدول کے انتہائی بائیں جانب والے پہلے کالم میں 27 کے سامنے والی قطار میں اور کالم 8 کے عین نیچے (قطار اور کالم کے تقاطع پر) لکھا عدد 4440 نوٹ کیا۔
 اسی قطار میں فرق والے کالم 2 کے نیچے لکھا ہوا نمبر 3 ہے۔ 4440 اور 3 کو جمع کرنے سے عدد 4443 حاصل ہوا۔ اس لیے

$$\text{مینٹیا} = 0.4443$$

$$\log 278.23 = 2.4443 \quad \text{لہذا}$$

(ii) دیے گئے عدد 0.07058 میں چونکہ اعشاریہ کے فوراً بعد ایک '0' موجود ہے اس لیے $\log (0.07058)$ کا خاصہ -2 ہے جسے عام طور پر $\bar{2}$ لکھا جاتا ہے۔

اب مینٹیا معلوم کرنے کے لیے نقطہ اعشاریہ کو نظر انداز کرتے ہوئے چار ہندسی عدد 7058 جتا ہے۔
 لوگار تھی جدول کی مدد سے

$$\text{مینٹیا} = 0.8487$$

$$\log (0.07058) = \bar{2}.8487 \quad \text{لہذا}$$

3.2.4 ضد لوگار تھم (Antilogarithm) کا تصور اور متعلقہ جدول کا استعمال

وہ عدد جس کا لوگار تھم معلوم ہو ضد لوگار تھم کہلاتا ہے۔ یعنی اگر $\log y = x$ ہو تو y کو x کا ضد لوگار تھم کہتے ہیں اور اسے $y = \text{antilog } x$ لکھتے ہیں۔

ضد لوگار تھم معلوم کرنے کا طریقہ

خاصہ کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے مینٹیا پر غور کرتے ہوئے ضد لوگار تھم کے جدول کو استعمال کرتے ہیں۔
 آخر میں جدول سے حاصل کردہ عدد میں خاصہ کی مدد سے نقطہ اعشاریہ کی نشان دہی کی جاتی ہے۔

ضد لوگار تھم جدول میں انتہائی بائیں جانب کے پہلے کالم (خالی مربع والا) میں مینٹیا کے پہلے دو ہندسے (بمعدہ نقطہ اعشاریہ) تلاش کرتے ہیں۔ ان کے عین سامنے کی قطار اور تیسرے ہندسے کے مطابق کالم کے تقاطع پر لکھا ہوا عدد نوٹ

کر لیتے ہیں۔ اسی قطار اور چوتھے ہندسے کے مطابق فرق والے کالم کے تقاطع پر لکھا ہوا نمبر بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ نوٹ کیے ہوئے ان دونوں نمبرز کو جمع کرنے سے اہم ہندسوں پر مشتمل مطلوبہ عدد حاصل ہوتا ہے۔

اب خاصہ کی مدد سے صرف نقطہ اعشاریہ کی نشان دہی باقی رہ جاتی ہے۔

(i) دیے گئے log کا خاصہ اگر مثبت عدد ہے تو اس میں '1' جمع کرنے سے وہ نمبر حاصل ہو گا جو مطلوبہ عدد میں

نقطہ اعشاریہ سے بائیں جانب والے ہندسوں کی تعداد کا تعین کرے گا۔

(ii) اگر خاصہ منفی ہو تو اس کی عددی قدر کو '1' کم کرنے سے صفروں کی وہ تعداد معلوم ہو جائے گی جو مطلوبہ عدد

میں نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد دائیں جانب لکھے جائیں گے۔

مثال وہ اعداد معلوم کیجیے جن کے لوگارٹھم کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$1.3247 \quad (i)$$

$$\bar{2}.1324 \quad (ii)$$

(i) فرض کریں $\log x = 1.3247$ حل

اب $x = \text{antilog } 1.3247$ کی قیمت معلوم کرنا ہے۔

یہاں $\log x = 1$ کا خاصہ

اور $\log x = 0.3247$ کا مینٹیسیا

ضد لوگارٹھم جدول کے انتہائی بائیں جانب پہلے کالم میں 0.32 کے عین سامنے والی قطار اور 4 کے نیچے والے کالم

کے تقاطع پر لکھا ہوا نمبر 2109 نوٹ کر لیں۔ اسی قطار اور فرق والے کالم 7 کے نیچے دونوں کے تقاطع پر

نمبر '3' لکھا ہے۔ 2109 اور 3 کو جمع کرنے سے حاصل کردہ نمبر 2112 ہے۔

خاصہ میں '1' جمع کرنے سے $1+1=2$ حاصل ہوا (خاصہ '1' ہو تو صحیح عددی حصہ 2 ہندسوں پر مشتمل

ہوتا ہے)۔

اس لیے 2112 میں نقطہ اعشاریہ بائیں جانب سے دو ہندسوں کے بعد لگا یا جائے گا۔ لہذا

$$x = \text{antilog } (1.3247)$$

$$= 21.12$$

$$(ii) \quad \bar{2}.1324 \quad \text{میں}$$

$$\text{خاصہ} = \bar{2}$$

$$\text{اور مینٹیسیا} = 0.1324$$

(i) میں کیے گئے عمل کو دہراتے ہوئے (ضد لوگار تھم جدول کے استعمال سے) مینیسما 0.1324 کے مطابق چار اہم ہندسوں والا حاصل کردہ نمبر 1356 ہے۔

خاصہ $\bar{2}$ کی عددی قدر 2 کو '1' کم کرنے سے '1' = 2-1 حاصل ہوئی۔ لہذا نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد

ایک '0' ہوگا۔

$$\text{antilog}(\bar{2}.1324) = 0.01356$$

پس

مشق 3.2

1 مندرجہ ذیل اعداد کا عام لوگار تھم معلوم کیجیے۔

(i) 232.92 (ii) 29.326

(iii) 0.00032 (iv) 0.3206

2 جدول کو استعمال کیے بغیر مندرجہ ذیل کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ اگر $\log 31.09 = 1.4926$ ہو

(i) $\log 3.109$ (ii) $\log 310.9$ (iii) $\log 0.003109$ (iv) $\log 0.3109$

3 وہ اعداد معلوم کیجیے جن کے عام لوگار تھم کی قیمت درج ذیل ہے۔

(i) 3.5622 (ii) $\bar{2}.7427$

4 نامعلوم کی کس قیمت کے لیے مندرجہ ذیل بیانات درست ہوں گے۔

(i) $\log_3 81 = L$ (ii) $\log_a 6 = 0.5$

(iii) $\log_5 n = 2$ (iv) $10^p = 40$

5 قیمت معلوم کریں۔

(i) $\log_2 \frac{1}{128}$ (ii) $\log 512$ to the base $2\sqrt{2}$

6 مندرجہ ذیل مساواتوں میں سے x کی قیمت معلوم کریں۔

(i) $\log_2 x = 5$ (ii) $\log_{81} 9 = x$ (iii) $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$

(iv) $\log_x 64 = 2$ (v) $\log_3 x = 4$

3.3 عام لوگار تھم اور قدرتی لوگار تھم (Common Logarithm and Natural Logarithm)

3.2.2 میں ہم نے اساس 10 والے عام لوگار تھم کو متعارف کروایا ہے۔ عام لوگار تھم اساس 10 کی وجہ سے

ڈیکڈیک (decadic) لوگار تھم بھی کہلاتے ہیں۔ ہم عام طور پر $\log_{10} x$ کو $\log x$ لکھتے ہیں اور اس قسم کے لوگار تھم عددی وضاحت کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ جان نیپیر (John Napier) نے اساس e والی لوگار تھمی

جدولیں تیار کریں۔ نیپیر لوگارٹھم کو قدرتی لوگارٹھم بھی کہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے 1614 میں لوگارٹھم جدول شائع کیے۔ روایتی طور پر $\log_e x$ کو ہم $\ln x$ لکھتے ہیں۔
 سائنس اور انجینئرنگ کی نظریاتی تحقیقات میں اکثر اوقات اساس e کا استعمال موزوں ہوتا ہے۔ e ایک غیر ناطق عدد ہے جس کی قیمت $2.7182818\dots$ یعنی قریباً 2.718 ہے۔

3.4 لوگارٹھم کے قوانین (Laws of Logarithm)

یونٹ کے اس حصہ میں ہم لوگارٹھم کے قوانین ثابت کریں گے اور پھر انہیں اعداد کی ضرب، تقسیم، قوت نما اور جذر لینے جیسے عوامل کی وضاحت کے لیے استعمال کریں گے۔

$$(i) \log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$$

$$(ii) \log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$$

$$(iii) \log_a m^n = n \log_a m$$

$$(iv) \log_a n = \log_b n \times \log_a b$$

$$\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$$

قانون (i)

ثبوت

$$\log_a m = x \quad \text{اور} \quad \log_a n = y$$

فرض کیجیے

$$a^x = m \quad \text{اور} \quad a^y = n$$

قوت نمائی شکل میں لکھنے سے

$$\therefore a^x \times a^y = mn$$

طرفین کو ضرب دینے سے

$$\text{یا} \quad a^{x+y} = mn$$

قوت نماؤں کے حاصل ضرب کا قانون

$$\text{یا} \quad \log_a(mn) = x + y$$

لوگارٹھم کی تعریف کی رو سے

$$\text{یا} \quad \log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$$

x اور y کی قیمتیں درج کرنے سے

نوٹ

$$(i) \log_a(mn) \neq \log_a m \times \log_a n$$

$$(ii) \log_a m + \log_a n \neq \log_a(m + n)$$

$$(iii) \log_a(mnp \dots) = \log_a m + \log_a n + \log_a p + \dots$$

لوگارٹھم کے مندرجہ بالا قوانین کا استعمال دو یا دو سے زیادہ اعداد کا حاصل ضرب معلوم کرنے کے لیے مفید ہے۔ ہم اس کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال 1

لوگار تھم کی مدد سے 291.3×42.36 کی قیمت معلوم کریں۔

حل

$$x = 291.3 \times 42.36$$

فرض کریں کہ

$$\log x = \log (291.3 \times 42.36)$$

دونوں طرف لوگار تھم لینے سے

$$= \log 291.3 + \log 42.36, \quad (\log_a mn = \log_a m + \log_a n)$$

$$= 2.4643 + 1.6269 = 4.0912$$

$$\Rightarrow x = \text{antilog } 4.0912 = 12340$$

یاد رکھیے
 $\log_a a = 1$

مثال 2

لوگار تھم کی مدد سے 0.2913×0.004236 کی قیمت معلوم کریں۔

حل

$$y = 0.2913 \times 0.004236$$

فرض کریں کہ

$$\log y = \log 0.2913 + \log 0.004236$$

طرفین کا log لینے سے

$$= \bar{1}.4643 + \bar{3}.6269$$

$$= \bar{3}.0912$$

$$\Rightarrow y = \text{antilog } \bar{3}.0912 = 0.001234$$

$$\log_a \left(\frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n$$

(ii) قانون

ثبوت

$$\log_a m = x \quad \text{اور} \quad \log_a n = y$$

فرض کریں کہ

$$\Rightarrow a^x = m \quad \text{اور} \quad a^y = n$$

$$\therefore \frac{a^x}{a^y} = \frac{m}{n} \Rightarrow a^{x-y} = \frac{m}{n}$$

$$\therefore \log_a \left(\frac{m}{n} \right) = x - y$$

$$\therefore \log_a \left(\frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n$$

نوٹ

$$(i) \log_a \left(\frac{m}{n} \right) \neq \frac{\log_a m}{\log_a n}$$

$$(ii) \log_a m - \log_a n \neq \log_a (m - n)$$

$$(iii) \log_a \left(\frac{1}{n} \right) = \log_a 1 - \log_a n = -\log_a n, \dots \dots (\because \log_a 1 = 0)$$

مثال 1

لوگار تھم کی مدد سے $\frac{291.3}{42.36}$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل فرض کریں کہ

$$x = \frac{291.3}{42.36} \Rightarrow \log x = \log \left(\frac{291.3}{42.36} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{یا } \log x &= \log 291.3 - \log 42.36, \dots \dots (\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n) \\ &= 2.4643 - 1.6269 = 0.8374 \end{aligned}$$

$$\therefore x = \text{antilog } 0.8374 = 6.877$$

مثال 2

لوگار تھم کی مدد سے $\frac{0.002913}{0.04236}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$y = \frac{0.002913}{0.04236} \Rightarrow \log y = \log \left(\frac{0.002913}{0.04236} \right) \quad \text{حل فرض کریں کہ}$$

$$\begin{aligned} \text{یا } \log y &= \log 0.002913 - \log 0.04236 \\ &= \bar{3}.4643 - \bar{2}.6269 \\ &= \bar{3} + (0.4643 - 0.6269) - \bar{2} \\ &= \bar{3} - 0.1626 - \bar{2} \end{aligned}$$

$$= \bar{3} + (1 - 0.1626) - 1 - \bar{2}, \quad ('1' \text{ جمع اور تفریق کرنے سے})$$

$$= \bar{2}.8374 \quad [\because \bar{3} - 1 - \bar{2} = -3 - 1 - (-2) = -2 = \bar{2}]$$

$$\Rightarrow y = \text{antilog } \bar{2}.8374 = 0.06877$$

$$\log_a(m^n) = n \log_a m \quad (\text{iii) قانون}$$

$$\log_a m^n = x, \Rightarrow a^x = m^n \quad \text{ثبوت} \quad \text{فرض کریں کہ}$$

$$\log_a m = y, \Rightarrow a^y = m \quad \text{اور}$$

$$\therefore a^x = m^n = (a^y)^n$$

$$\text{یا } a^x = (a^y)^n = a^{yn} \Rightarrow x = ny$$

$$\therefore \log_a m^n = n \log_a m$$

x اور y کی قیمت درج کرنے سے

مثال 1

لوگارتھم کی مدد سے $\sqrt[4]{(0.0163)^3}$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل

$$y = \sqrt[4]{(0.0163)^3} = (0.0163)^{3/4} \quad \text{فرض کریں کہ}$$

$$\Rightarrow \log y = \frac{3}{4} (\log 0.0163) = \frac{3}{4} \times \bar{2}.2122 = \frac{\bar{6}.6366}{4} = \frac{\bar{8} + 2.6366}{4}$$

$$= \bar{2} + 0.6592 = \bar{2}.6592$$

$$\Rightarrow y = \text{antilog } \bar{2}.6592$$

$$= 0.04562$$

(iv) قانون

(اساس کی تبدیلی کا فارمولا)

$$\log_a n = \log_b n \times \log_a b \quad \text{یا} \quad \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

ثبوت فرض کریں کہ

$$\log_b n = x \Rightarrow n = b^x$$

'a' کی اساس پر طرفین کا log لینے سے

$$\log_a n = \log_a b^x = x \log_a b$$

$$\therefore \log_a n = \log_b n \log_a b$$

(i) x کی قیمت درج کرنے سے

نتیجہ (i) میں $n = a$ درج کرنے سے

$$\log_b a \times \log_a b = \log_a a = 1$$

$$\text{یا } \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

(i) میں $\log_a b$ کی قیمت درج کرنے سے

$$\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

(ii)

مندرجہ بالا قانون کی مدد سے قدرتی لوگارٹھم کو عام لوگارٹھم میں اور عام لوگارٹھم کو قدرتی لوگارٹھم میں

تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

$$\log_e n = \log_{10} n \times \log_e 10 \quad \text{یا} \quad \frac{\log_{10} n}{\log_{10} e}$$

$$\log_{10} n = \log_e n \times \log_{10} e \quad \text{یا} \quad \frac{\log_e n}{\log_e 10}$$

لوگارٹھم جدول میں $\log_{10} e$ اور $\log_e 10$ کی قیمت دستیاب ہے۔

$$\log_e 10 = \frac{1}{0.4343} = 2.3026 \quad \text{اور} \quad \log_{10} e = \log 2.718 = 0.4343$$

مثال مندرجہ بالا قانون کی مدد سے $\log_2 3 \times \log_3 8$ کی قیمت معلوم کریں۔

مثال

حل ہم جانتے ہیں کہ

حل

$$\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

$$\therefore \log_2 3 \times \log_3 8 = \frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 8}{\log 3}$$

$$\begin{aligned}\log_2 3 \times \log_3 8 &= \frac{\log 8}{\log 2} \\ &= \frac{\log 2^3}{\log 2} \\ &= \frac{3 \log 2}{\log 2} = 3\end{aligned}$$

نوٹ

- (i) اساس کی تبدیلی کا قانون حاصل ضرب شکل (form) میں اکثر اوقات موزوں رہتا ہے۔
- (ii) 1 اور e کے علاوہ کسی بھی مثبت اساس پر لوگارٹھم کو متعارف کرانا ایسی مساوات کو حل کرنے کے لیے کارآمد ہے جس میں نامعلوم کسی اور عدد کی قوت نما کے طور پر ظاہر ہو۔

مشق 3.3

1 مندرجہ ذیل کو لوگارٹھم کے مجموعے یا فرق کی شکل میں لکھیں۔

(i) $\log(A \times B)$ (ii) $\log \frac{15.2}{30.5}$ (iii) $\log \frac{25 \times 5}{8}$

(iv) $\log \sqrt[3]{\frac{7}{15}}$ (v) $\log \frac{(22)^{1/3}}{5^3}$ (vi) $\log \frac{25 \times 47}{29}$

2 واحد لوگارٹھم کی شکل میں ظاہر کیجیے۔

$$\log x - 2 \log x + 3 \log(x+1) - \log(x^2 - 1)$$

3 مندرجہ ذیل کو واحد لوگارٹھم کی شکل میں لکھیں۔

(i) $\log 21 + \log 5$ (ii) $\log 25 - 2 \log 3$

(iii) $2 \log x - 3 \log y$ (iv) $\log 5 + \log 6 - \log 2$

4 مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجیے۔

(i) $\log_3 2 \times \log_2 81$ (ii) $\log_5 3 \times \log_3 25$

5 مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کریں۔ اگر $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\log 5 = 0.6990$

(i) $\log 32$ (ii) $\log 24$ (iii) $\log \sqrt{3\frac{1}{3}}$

(iv) $\log \frac{8}{3}$ (v) $\log 30$

3.5 لوگار تھم کے قوانین کا عددی وضاحت میں استعمال

اب تک ہم نے لوگار تھم کے قوانین کو آسان قسم کی عددی ضرب، تقسیم، قوت نما اور جذر لینے کے عوامل کے لیے استعمال کیا ہے۔ زیادہ مشکل مثالوں میں ان کے استعمال کے موثر ہونے کی تصدیق اور وضاحت درج ذیل ہے۔

مثال 1 ثابت کریں کہ

$$7 \log \frac{16}{15} + 5 \log \frac{25}{24} + 3 \log \frac{81}{80} = \log 2$$

حل

$$\begin{aligned} \text{بائیں طرف} &= 7 \log \frac{16}{15} + 5 \log \frac{25}{24} + 3 \log \frac{81}{80} \\ &= 7[\log 16 - \log 15] + 5[\log 25 - \log 24] + 3[\log 81 - \log 80] \\ &= 7[\log 2^4 - \log (3 \times 5)] + 5[\log 5^2 - \log (2^3 \times 3)] \\ &\quad + 3[\log 3^4 - \log (2^4 \times 5)] \\ &= 7[4 \log 2 - \log 3 - \log 5] + 5[2 \log 5 - 3 \log 2 - \log 3] \\ &\quad + 3[4 \log 3 - 4 \log 2 - \log 5] \\ &= (28 - 15 - 12) \log 2 + (-7 - 5 + 12) \log 3 + (-7 + 10 - 3) \log 5 \\ &= \log 2 + 0 + 0 = \log 2 = \text{دائیں طرف} \end{aligned}$$

مثال 2

$$\sqrt[3]{\frac{0.07921 \times (18.99)^2}{(5.79)^4 \times 0.9474}} \quad \text{لوگار تھم کی مدد سے قیمت معلوم کریں۔}$$

حل فرض کریں کہ

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[3]{\frac{0.07921 \times (18.99)^2}{(5.79)^4 \times 0.9474}} = \left(\frac{0.07921 \times (18.99)^2}{(5.79)^4 \times 0.9474} \right)^{1/3} \\ \therefore \log y &= \frac{1}{3} \log \left(\frac{0.07921 \times (18.99)^2}{(5.79)^4 \times 0.9474} \right) \\ &= \frac{1}{3} [\log \{0.07921 \times (18.99)^2\} - \log \{(5.79)^4 \times 0.9474\}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\log y &= \frac{1}{3} [\log 0.07921 + 2 \log 18.99 - 4 \log 5.79 - \log 0.9474] \\
&= \frac{1}{3} [\bar{2}.8988 + 2(1.2786) - 4(0.7627) - \bar{1}.9765] \\
&= \frac{1}{3} [\bar{2}.8988 + 2.5572 - 3.0508 - \bar{1}.9765] \\
&= \frac{1}{3} [1.4560 - 3.0273] = \frac{1}{3} (\bar{2}.4287) \\
&= \frac{1}{3} (\bar{3} + 1.4287) \\
&= \bar{1} + 0.4762 = \bar{1}.4762 \\
\Rightarrow y &= \text{antilog } \bar{1}.4762 = 0.2993
\end{aligned}$$

مثال 3

دیے گئے کلیہ $A = A_0 e^{-kd}$ میں اگر $k = 2$ ہو تو d کی کس قیمت کے لیے $A = \frac{A_0}{2}$ ہوگا۔
حل دیا گیا کلیہ

$$\begin{aligned}
A &= A_0 e^{-kd} \Rightarrow \frac{A}{A_0} = e^{-kd} \\
\therefore k &= 2, \text{ اور } A = \frac{A_0}{2}, \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-2d}
\end{aligned}$$

طرفین کا عام لوگار تھم لینے سے

$$\log_{10} 1 - \log_{10} 2 = -2d \log_{10} e \quad (e \approx 2.718)$$

$$0 - 0.3010 = -2d (0.4343)$$

$$d = \frac{0.3010}{2 \times 0.4343} = 0.3465$$

مشق 3.4

1- لوگار تھم جدول کی مدد سے مندرجہ ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔

(i) 0.8176×13.64

(ii) $(789.5)^{1/8}$

(iii) $\frac{0.678 \times 9.01}{0.0234}$

(iv) $\sqrt[5]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$

(v) $\frac{(1.23)(0.6975)}{(0.0075)(1278)}$

(vi) $\sqrt[3]{\frac{0.7214 \times 20.37}{60.8}}$

(vii) $\frac{83 \times \sqrt[3]{92}}{127 \times \sqrt[5]{246}}$

(viii) $\frac{(438)^3 \sqrt{0.056}}{(388)^4}$

2- ایک گیس کا پھیلاؤ مندرجہ ذیل قانون کے مطابق ہوتا ہے۔

$$pv^n = C$$

C کی قیمت معلوم کریں۔ جبکہ $p = 80$ ، $v = 3.1$ اور $n = \frac{5}{4}$ ہو۔

3- کسی پروڈکٹ (product) کی طلب کا فارمولہ درج ذیل ہے۔

$$p = 90(5)^{-9/10}$$

جس میں q مصنوعہ (بنائے گئے) یونٹوں کی تعداد اور p ایک یونٹ کی قیمت ہے۔ بتائیں کہ 18.00 روپے میں کتنے یونٹ طلب کیے جاسکیں گے؟

4- اگر $A = \pi r^2$ ہو تو A کی قیمت معلوم کریں۔ جبکہ $r = 15$ اور $\pi = \frac{22}{7}$

5- اگر $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہو تو V کی قیمت معلوم کریں۔ جبکہ $r = 2.5$ ، $\pi = \frac{22}{7}$ اور $h = 4.2$

اعادہ مشق 3

1- دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) اگر $a^x = n$ ہو تو.....

(a) $a = \log_x n$ (b) $x = \log_n a$ (c) $x = \log_a n$ (d) $a = \log_n x$

(ii) اگر $y = \log_2 x$ ہو تو.....

(a) $x^y = z$ (b) $z^y = x$ (c) $x^z = y$ (d) $y^z = x$

(iii) کسی اساس پر '1' کا لوگارٹھم..... کے برابر ہوتا ہے۔

(a) 1 (b) 10 (c) e (d) 0

(iv) اگر کسی عدد کے لوگارٹھم کی اساس وہی عدد ہو تو جواب..... ہوتا ہے۔

(a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) 10

(v) $\log e = \dots\dots\dots - (e \approx 2.718)$

(a) 0 (b) 0.4343 (c) ∞ (d) 1

(vi) $\log\left(\frac{p}{q}\right)$ کی قیمت =

(a) $\log p - \log q$

(b) $\frac{\log p}{\log q}$

(c) $\log p + \log q$

(d) $\log q - \log p$

(vii) $\dots\dots\dots = \log p - \log q$

(a) $\log\left(\frac{p}{q}\right)$

(b) $\log(p - q)$

(c) $\frac{\log p}{\log q}$

(d) $\log\left(\frac{p}{q}\right)$

(viii) $\log m^n$ کو بھی لکھا جاسکتا ہے۔

- (a) $(\log m)^n$ (b) $m \log n$ (c) $n \log m$ (d) $\log(mn)$

(ix) $\log_b a \times \log_c b$ کو بھی لکھا جاسکتا ہے۔

- (a) $\log_a c$ (b) $\log_c a$ (c) $\log_a b$ (d) $\log_b c$

(x) $\log_y x$ برابر ہوگا کے۔

- (a) $\frac{\log_z x}{\log_y z}$ (b) $\frac{\log_x z}{\log_y z}$ (c) $\frac{\log_z x}{\log_z y}$ (d) $\frac{\log_z y}{\log_z x}$

2- خالی جگہ پُر کر کے مندرجہ ذیل بیانات کو مکمل کریں۔

(i) عام لوگارٹھم کی اساس ہوتی ہے۔

(ii) کسی عدد کے عام لوگارٹھم کے صحیح عددی حصہ کو کہتے ہیں۔

(iii) کسی عدد کے عام لوگارٹھم کے کسری حصہ کو کہتے ہیں۔

(iv) اگر $x = \log y$ ہو تو y کو x کا کہتے ہیں۔

(v) اگر کسی عدد کے لوگارٹھم کا خاصہ '2' ہو تو اس نمبر میں نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد صفروں کی تعداد ہوگی۔

(vi) اگر کسی عدد کے لوگارٹھم کا خاصہ '1' ہو تو اس کے صحیح عددی حصے میں ہندسوں کی تعداد ہوگی۔

3- مندرجہ ذیل میں x کی قیمت معلوم کریں۔

(i) $\log_3 x = 5$

(ii) $\log_4 256 = x$

(iii) $\log_{625} 5 = \frac{1}{4} x$

(iv) $\log_{64} x = \frac{-2}{3}$

4- مندرجہ ذیل میں x کی قیمت معلوم کریں۔

(i) $\log x = 2.4543$

(ii) $\log x = 0.1821$

(iii) $\log x = 0.0044$

(iv) $\log x = \bar{1}.6238$

5- مندرجہ ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔ اگر $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, اور $\log 5 = 0.6990$ ہو

(i) $\log 45$

(ii) $\log \frac{16}{15}$

(iii) $\log 0.048$

6- لوگارٹھم جدول کی مدد سے مندرجہ ذیل کو مختصر کریں۔

(i) $\sqrt[3]{25.47}$

(ii) $\sqrt[5]{342.2}$

(iii) $\frac{(8.97)^3 \times (3.95)^2}{\sqrt[3]{15.37}}$

خلاصہ

☆ اگر $a^x = y$ جبکہ $a, x, y \in \mathbb{R}$ اور $a \neq 1, a > 0, y > 0$ ہو تو x کو اساس 'a' پر y کا لوگارٹھم کہتے ہیں اور اسے $x = \log_a y$ لکھتے ہیں۔

☆ اگر $a^x = y$ ہو تو $x = \log_a y$

☆ اگر لوگارٹھم کی اساس 10 لی جائے تو اسے عام یا برگز (Briggs) لوگارٹھم کہتے ہیں۔ اساس $e (\approx 2.718)$ کے لوگارٹھم کو قدرتی یا نیپیرین (Naperian) لوگارٹھم کہتے ہیں۔

☆ کسی عدد کے عام لوگارٹھم کے صحیح عددی حصہ کو لوگارٹھم کا خاصہ (characteristic) اور اسکے کسری حصہ کو مینٹیسا (mantissa) کہتے ہیں۔

☆ (i) '1' سے بڑے عدد کے لوگارٹھم کا خاصہ ہمیشہ عدد کے صحیح عددی حصہ کے ہندسوں کی تعداد سے '1' کم ہوتا ہے۔

(ii) '1' سے چھوٹے عدد کے لوگارٹھم کا خاصہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے اور عدد کے نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد موجود صفروں کی تعداد سے '1' زیادہ۔

☆ جب کوئی عدد '1' سے چھوٹا ہو تو خاصہ کو -1, -2, -3 کی بجائے $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}$ لکھا جاتا ہے تاکہ مینٹیسا کو منفی نہ سمجھ لیا جائے۔ (یاد رہے کہ مینٹیسا ہمیشہ مثبت ہوتا ہے)

☆ ایک ہی تسلسل والے اہم ہندسوں پر مشتمل اعداد کے لوگارٹھم کا مینٹیسا ایک ہی (یکساں) ہوتا ہے۔

☆ وہ عدد جس کے لوگارٹھم کی قیمت معلوم ہو ضد لوگارٹھم کہلاتا ہے۔

☆ $\log_{10} e = 0.4343$ اور $\log_e 10 = 2.3026$

☆ لوگارٹھم کے قوانین

$$\log_a (mn) = \log_a m + \log_a n \quad (i)$$

$$\log_a \left(\frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n \quad (ii)$$

$$\log_a (m^n) = n \log_a m \quad (iii)$$

$$\log_a n = \log_b n \times \log_a b \quad (iv)$$

الجبری جملے اور الجبری کلیے

(ALGEBRAIC EXPRESSIONS AND ALGEBRAIC FORMULAS)

(Unit Outlines) یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود

(Algebraic Expressions) الجبری جملے 4.1

(Algebraic Formulae) الجبری کلیے 4.2

(Surds and their Application) مقادیر اہم اور ان کا استعمال 4.3

(Rationalization) ناطق بنانے کا عمل 4.4

(Students Learning Outcomes) یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع ترما حاصل نتائج

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ ان کو معلوم ہو کہ کوئی ناطق جملہ خصوصیات اور طرز عمل کے لحاظ سے ناطق عدد کی طرح ہوتا ہے۔

☆ تعریف کر سکیں کہ ایسا الجبری جملہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی شکل میں لکھا جاسکتا ہو جبکہ $p(x)$ اور $q(x)$ متغیر x میں دو

کثیر رقمیاں ہوں اور $q(x) \neq 0$ ، ناطق جملہ کہلاتا ہے۔

☆ بغور مشاہدہ (پڑتال) کر سکیں کہ کوئی دیا گیا الجبری جملہ

• کثیر رقمی ہے یا نہیں

• ناطق جملہ ہے یا نہیں

☆ ناطق جملہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ کو مختصر ترین شکل میں تحویل کر سکیں جبکہ $p(x)$ اور $q(x)$ کے تمام ارکان کے عددی سرچ

اعداد ہوں اور ان میں کوئی جزو ضربی مشترک نہ ہو۔

☆ پڑتال کر سکیں کہ کوئی دیا گیا ناطق الجبری جملہ مختصر ترین شکل میں ہے یا نہیں۔

☆ دیے گئے ناطق جملہ کو اس کی مختصر ترین شکل میں تحویل کر سکیں۔

☆ ناطق جملوں کا مجموعہ، فرق اور حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔

☆ ایک ناطق جملہ کو دوسرے ناطق جملے سے تقسیم کر کے جواب کو مختصر ترین شکل میں لکھ سکیں۔

☆ کسی الجبری جملے میں متغیر کی جگہ کوئی خاص حقیقی عدد درج کر کے الجبری جملے کی قیمت (جو کہ ایک حقیقی عدد ہوگا)

حاصل کر سکیں۔

☆ درج ذیل کلیات سے واقف ہوں۔

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

• $a^2 + b^2$ اور ab کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ $a + b$ اور $a - b$ کی قیمتیں دی گئی ہوں۔

☆ کلیہ $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ کی پہچان ہو اور

• $a^2 + b^2 + c^2$ کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ $a + b + c$ اور $ab + bc + ca$ کی قیمتیں دی گئی ہوں۔

• $a + b + c$ کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ $a^2 + b^2 + c^2$ اور $ab + bc + ca$ کی قیمتیں دی گئی ہوں۔

• $ab + bc + ca$ کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ $a^2 + b^2 + c^2$ اور $a + b + c$ کی قیمتیں دی گئی ہوں۔

☆ کلیات : $(a + b)^3 = a^3 + 3ab(a + b) + b^3$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3ab(a - b) - b^3$$

کا علم ہو اور

• $a^3 \pm b^3$ کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ $a \pm b$ اور ab کی قیمتیں دی گئی ہوں۔

• $x^3 \pm \frac{1}{x^3}$ کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ $x \pm \frac{1}{x}$ کی قیمت دی گئی ہو۔

☆ کلیات : $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \pm ab + b^2)$ کو جانتے ہوں اور

• $(x + \frac{1}{x})$ اور $(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1)$ کا حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔

• $(x - \frac{1}{x})$ اور $(x^2 + \frac{1}{x^2} + 1)$ کا حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔

• $(x + y)(x - y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$ کا متواتر (مسلل) حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔

☆ مقادیر اصم کو پہچان سکیں اور ان کو عملی طور پر استعمال کر سکیں۔

☆ دوسرے درجے کی مقادیر اصم کی وضاحت کر سکیں اور ان پر بنیادی عوامل کا استعمال کر کے مخرج (نسب نما) کو ناطق بنا کر ہم قیمت کسر میں تحویل کر سکیں۔

☆ حقیقی اعداد $\frac{1}{\sqrt{x+y}}$ ، $\frac{1}{a+b\sqrt{x}}$ اور ان کے اتصال سے حاصل کردہ عدد، جبکہ y, x قدرتی اعداد اور b, a صحیح اعداد ہوں، کو ناطق بنانے کے عمل کی (بالکل ٹھیک مطلب کے ساتھ) وضاحت کر سکیں۔

4.1 الجبری جملے (Algebraic Expressions)

حسابیات کے تعمیری اطلاق کو الجبرا کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ الجبری رقوم کو جمع اور تفریق کے عوامل کے ذریعے ملانے سے ہم الجبری جملہ حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر $5x^2 - 3x + \frac{2}{\sqrt{x}}$ اور $3xy + \frac{3}{x}$ ($x \neq 0$) الجبری جملے ہیں۔

کثیررتی جملہ یا کثیرتی (Polynomial)

ایک متغیر x میں کثیررتی جملہ درج ذیل کی قسم کا الجبری جملہ ہوتا ہے۔

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0, \quad \dots (i)$$

جس میں n ایک غیر منفی صحیح عدد (صفر یا مثبت صحیح عدد) ہے اور متغیر x کا سب سے بڑا قوت نما ہے اور

کثیررتی (i) کا درجہ (ڈگری) کہلاتا ہے۔ یعنی (i) ایک متغیر x میں n th درجے کی کثیررتی ہے۔ علاوہ ازیں ہر عددی سر

عددی سر کہتے ہیں۔ $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0$ حقیقی عدد ہے۔ x^n کے عددی سر a_n کو کثیررتی کا سب سے پہلا (اول)

عددی سر کہتے ہیں۔ $(2x^4y^3 + x^2y^2 + 8x)$ دو متغیرات میں کثیررتی جملہ ہے۔ اس کی رقم $2x^4y^3$ کا درجہ 7

(متغیرات کے قوت نماؤں کا مجموعہ) باقی رقموں کی نسبت سب سے بڑا ہے۔ اس لیے کثیررتی کا درجہ بھی 7 شمار ہو گا۔

جمع اور ضرب کے عوامل کے لحاظ سے صحیح اعداد اور کثیررتی جملوں میں ایک جیسی خصوصیات کے مطالعہ سے ہم

یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثیررتی جملوں کا طرز عمل صحیح اعداد جیسا ہے۔

اپنی معلومات کو خود جانچیں

مندرجہ ذیل کے لیے جو از پیش کریں کہ کثیر رقمی ہے یا نہیں۔

(i) $3x^2 + 8x + 5$

(ii) $x^3 + \sqrt{2}x^2 + 5x - 3$

(iii) $x^2 + \sqrt{x} - 4$

(iv) $\frac{3x^2 + 2x + 8}{3x + 4}$

4.1.1 ناطق جملے خصوصیات کے لحاظ سے ناطق اعداد جیسے ہوتے ہیں

اگر a اور b دو صحیح اعداد ہوں تو ضروری نہیں کہ $\frac{a}{b}$ بھی ایک صحیح عدد ہو۔ اس لیے نمبر سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے $\frac{a}{b}$ کو بطور ناطق عدد متعارف کرایا گیا جبکہ a اور b صحیح اعداد ہیں اور $b \neq 0$ اسی طرح اگر $p(x)$ اور $q(x)$ دو کثیر رقمی جملے ہوں تو ضروری نہیں کہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ (جبکہ $q(x) \neq 0$) بھی ایک کثیر رقمی جملہ ہو۔ اس لیے ناطق اعداد کی طرح ناطق جملوں کے تصور کو اجاگر کیا جاتا ہے۔

4.1.2 ناطق جملہ

ایسا جملہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی شکل میں لکھا جاسکے جبکہ $p(x)$ اور $q(x)$ متغیر x میں کثیر رقمی ہوں اور $q(x) \neq 0$ ، ناطق جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر $\frac{2x+1}{3x+8}$ ، جبکہ $3x+8 \neq 0$ ، ایک متغیر x میں ناطق جملہ ہے۔ ناطق جملہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ میں $p(x)$ کو شمار کنندہ اور $q(x)$ کو مخرج (نسب نما) کہتے ہیں۔ ناطق جملہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ کا کثیر رقمی ہونا ضروری نہیں ہے۔

نوٹ ہر کثیر رقمی جملہ $p(x)$ ناطق جملہ ہوتا ہے کیونکہ ہم $p(x)$ کو $\frac{p(x)}{1}$ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ پس ہر کثیر رقمی جملہ ناطق ہوتا ہے مگر ہر ناطق جملے کا کثیر رقمی ہونا ضروری نہیں ہے۔

اپنی معلومات کو خود جانچیں

درج ذیل کی شناخت کریں کہ ناطق جملہ ہے یا نہیں۔

(i) $\frac{2x+6}{3x-4}$

(ii) $\frac{3x+8}{x^2+x+2}$

(iii) $\frac{x^2+4x+5}{x^2+3\sqrt{x}+4}$

(iv) $\frac{\sqrt{x}}{3x^2+1}$

4.1.3 ناطق جملوں کی خصوصیات

ناطق جملوں پر بنیادی عوامل کا طریق کار ناطق اعداد پر عوامل جیسا ہی ہے۔
فرض کریں $s(x), r(x), q(x), p(x)$ ایسے کثیر رتی جملے ہیں۔ متغیر x کی وہ تمام قیمتیں خارج کر دی گئی ہیں جن کے حلقہ اثر میں کثیر رتیوں سے بننے والے کسی ناطق جملے کی تعریف مبہم ہو جاتی ہو۔
اس مفروضہ کے تحت کہ ناطق جملوں کی تعریف مبہم نہیں، ان کی درج ذیل خصوصیات مؤثر اور صحیح ہیں۔

(i) $\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{r(x)}{s(x)} \Leftrightarrow p(x) s(x) = q(x) r(x)$ ناطق جملوں کی برابری

(ii) $\frac{p(x)k}{q(x)k} = \frac{p(x)}{q(x)}$ تنسیخی خاصیت (k ایک غیر صفر مستقل مقدار ہے)

(iii) $\frac{p(x)}{q(x)} + \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x) s(x) + q(x) r(x)}{q(x) s(x)}$ ناطق جملوں کی جمع

(iv) $\frac{p(x)}{q(x)} - \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x) s(x) - q(x) r(x)}{q(x) s(x)}$ ناطق جملوں کی تفریق

(v) $\frac{p(x)}{q(x)} \cdot \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x) r(x)}{q(x) s(x)}$ ناطق جملوں کی ضرب

(vi) $\frac{p(x)}{q(x)} \div \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x)}{q(x)} \cdot \frac{s(x)}{r(x)} = \frac{p(x) s(x)}{q(x) r(x)}$ ناطق جملوں کی تقسیم ($\frac{r(x)}{s(x)}$ غیر صفر ہے)

(vii) $-\frac{p(x)}{q(x)}$ کا جمعی معکوس $\frac{p(x)}{q(x)}$ ناطق جملوں کا جمعی معکوس ہوتا ہے۔

(viii) $\frac{q(x)}{p(x)}$ کا ضربی معکوس $\frac{p(x)}{q(x)}$ ناطق جملوں کا ضربی معکوس ہوتا ہے۔

4.1.4 ناطق جملے کی مختصر ترین شکل

- ناطق جملہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ اپنی مختصر ترین شکل میں ہوگا۔ اگر
- (i) $p(x)$ اور $q(x)$ کے تمام عددی سر صحیح اعداد ہوں۔
 - (ii) $p(x)$ اور $q(x)$ میں کوئی جزو ضربی مشترک نہ ہو۔
- مثال کے طور پر $\frac{x+1}{x^2+3}$ اپنی مختصر ترین شکل میں ہے۔

4.1.5 کسی ناطق جملے کا بغور مشاہدہ کر کے بتانا کہ مختصر ترین شکل میں ہے یا نہیں

ناطق جملے $\frac{p(x)}{q(x)}$ کا مشاہدہ کر کے یہ بتانا مقصود ہو کہ جملہ اپنی مختصر ترین شکل میں ہے یا نہیں، تو $p(x)$ اور $q(x)$ کا عاوا عظم معلوم کریں۔ اگر ان کثیر رقمیوں کا عاوا عظم '1' ہو تو ناطق جملہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ اپنی مختصر ترین شکل میں ہو گا۔

مثلاً ناطق جملہ $\frac{x-1}{x^2+1}$ اپنی مختصر ترین شکل میں ہے۔ کیونکہ $(x-1)$ اور (x^2+1) کا عاوا عظم '1' ہے۔

4.1.6 کسی ناطق جملے کو اس کی مختصر ترین شکل میں لانے کا طریق کار

فرض کریں دیا گیا ناطق جملہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ ہے۔

I دونوں کثیر رقمی جملوں $p(x)$ اور $q(x)$ ہر ایک کی تجزی کریں۔

II $p(x)$ اور $q(x)$ کا عاوا عظم معلوم کریں۔

III میں $\frac{p(x)}{q(x)}$ اور $q(x)$ دونوں کو عاوا عظم پر تقسیم کریں اس طرح حاصل کردہ ناطق جملہ مختصر ترین شکل میں ہو گا۔

دوسرے الفاظ میں ناطق الجبری جملے $\frac{p(x)}{q(x)}$ کو اس کی مختصر ترین شکل میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے

$p(x)$ اور $q(x)$ دونوں کی تجزی کریں۔ پھر ان کے مشترک اجزائے ضربی کی تنسیخ کر دیں۔

مثال

درج ذیل الجبری ناطق جملوں کو ان کی مختصر ترین شکل میں لکھیں۔

$$(i) \frac{lx + mx - ly - my}{3x^2 - 3y^2}$$

$$(ii) \frac{3x^2 + 18x + 27}{5x^2 - 45}$$

حل

$$(i) \frac{lx + mx - ly - my}{3x^2 - 3y^2} = \frac{x(l + m) - y(l + m)}{3(x^2 - y^2)}$$

$$= \frac{(l+m)(x-y)}{3(x+y)(x-y)} \dots\dots \text{(تجزی کرنے سے)}$$

$$= \frac{l+m}{3(x+y)} \dots\dots \text{(مشترک اجزائے ضربی کی تہ تیغ سے)}$$

جو اب مختصر ترین شکل میں ہے۔

$$(ii) \quad \frac{3x^2 + 18x + 27}{5x^2 - 45} = \frac{3(x^2 + 6x + 9)}{5(x^2 - 9)} \dots\dots \text{(یک رقمی اجزائے ضربی)}$$

$$= \frac{3(x+3)(x+3)}{5(x+3)(x-3)} \dots\dots \text{(تجزی کرنے سے)}$$

$$= \frac{3(x+3)}{5(x-3)} \dots\dots \text{(مشترک اجزائے ضربی کی تہ تیغ سے)}$$

جو مختصر ترین شکل میں ہے۔

4.1.7 ناطق جملوں کا مجموعہ، فرق اور حاصل ضرب

الجبری ناطق جملوں کا مجموعہ اور فرق معلوم کرنے کے لیے ہم نسب نماؤں کا ذواضعاف اقل لے کر 4.1.3 میں بیان کردہ خصوصیات استعمال کرتے ہیں۔ مختصر کرنے کے طریق کار کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے کی جاتی ہے۔

مثال 1 مختصر کریں۔

$$(i) \quad \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} + \frac{2x}{x^2-y^2} \quad (ii) \quad \frac{2x^2}{x^4-16} - \frac{x}{x^2-4} + \frac{1}{x+2}$$

حل

$$(i) \quad \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} + \frac{2x}{x^2-y^2} \\ = \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} + \frac{2x}{(x+y)(x-y)} \quad \text{(تجزی کرنے سے)}$$

$$= \frac{x+y - (x-y) + 2x}{(x+y)(x-y)} \quad \text{(خصوصیات (iii) - 4.1.3)}$$

$$= \frac{x+y-x+y+2x}{(x+y)(x-y)}$$

$$= \frac{2x+2y}{(x+y)(x-y)} \dots\dots \text{(مختصر کرنے سے)}$$

$$= \frac{2(x+y)}{(x+y)(x-y)} = \frac{2}{x-y} \dots\dots \text{(مشترک اجزائے ضربی کی تلخ سے)}$$

$$(ii) \frac{2x^2}{x^4-16} - \frac{x}{x^2-4} + \frac{1}{x+2}$$

$$= \frac{2x^2}{(x^2+4)(x^2-4)} - \frac{x}{x^2-4} + \frac{1}{x+2} \dots\dots \text{(دو مربعوں کے فرق کا کلیہ)}$$

$$= \frac{2x^2}{(x^2+4)(x+2)(x-2)} - \frac{x}{(x+2)(x-2)} + \frac{1}{x+2}$$

$$= \frac{2x^2 - x(x^2+4) + (x^2+4)(x-2)}{(x^2+4)(x+2)(x-2)} = \frac{2x^2 - x^3 - 4x + x^3 + 4x - 2x^2 - 8}{(x^2+4)(x+2)(x-2)}$$

$$= \frac{-8}{(x^2+4)(x+2)(x-2)} \dots\dots \text{(مختصر کرنے سے)}$$

$$= \frac{-8}{(x^2+4)(x^2-4)} = \frac{-8}{x^4-16}$$

مثال 2

کو مختصر ترین شکل میں لکھیں۔
 $\frac{x+2}{2x-3y} \cdot \frac{4x^2-9y^2}{xy+2y}$

حل

$$\frac{x+2}{2x-3y} \cdot \frac{4x^2-9y^2}{xy+2y} = \frac{(x+2)[(2x)^2-(3y)^2]}{(2x-3y)(x+2)y} \dots\dots \text{(یک جملہ اجزائے ضربی)}$$

$$= \frac{(x+2)(2x+3y)(2x-3y)}{y(x+2)(2x-3y)} \dots\dots \text{(تجری کرنے سے)}$$

$$= \frac{2x+3y}{y} \dots\dots \text{(مختصر ترین شکل میں لکھنے سے)}$$

4.1.8 ایک ناطق جملے کو کسی دوسرے ناطق جملہ پر تقسیم کرنا

ایک ناطق جملے کو کسی دوسرے غیر صفر ناطق جملے پر تقسیم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تقسیم کنندہ یعنی تقسیم کرنے والے ناطق جملہ کا معکوس لے کر تقسیم کو ضرب کے عمل میں بدلتے ہیں اور پھر اس طرح حاصل ہونے والے حاصل ضرب کو اختصار کے عمل سے مختصر ترین شکل میں لکھتے ہیں۔

مثال مختصر کیجیے۔

$$\frac{7xy}{x^2 - 4x + 4} \div \frac{14y}{x^2 - 4}$$

حل

$$\frac{7xy}{x^2 - 4x + 4} \div \frac{14y}{x^2 - 4}$$

$$= \frac{7xy}{x^2 - 4x + 4} \cdot \frac{x^2 - 4}{14y} \quad \dots\dots \text{('÷' کو '×' میں بدلنے سے)}$$

$$= \frac{7xy}{(x-2)(x-2)} \cdot \frac{(x+2)(x-2)}{14y} \quad \dots\dots \text{(تجزی کرنے سے)}$$

$$= \frac{x(x+2)}{2(x-2)} \quad \dots\dots \text{(مختصر ترین شکل)}$$

4.1.9 الجبری جملے کی قیمت (کسی مخصوص حقیقی عدد کے لیے) معلوم کرنا

تعریف

ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات پر مشتمل الجبری جملہ میں متغیرات کی جگہ ان کی مخصوص قیمتیں (حقیقی اعداد) درج کی جائیں تو حاصل ہونے والا عدد الجبری جملہ کی قیمت کہلاتا ہے۔

مثال

$$\frac{3x^2\sqrt{y} + 6}{5(x+y)} \text{ کی قیمت معلوم کریں۔ جبکہ } x = -4 \text{ اور } y = 9 \text{ ہو۔}$$

حل

دی گئی قیمتیں $x = -4$ اور $y = 9$ درج کرنے سے

$$\frac{3x^2\sqrt{y} + 6}{5(x+y)} = \frac{3(-4)^2\sqrt{9} + 6}{5(-4+9)} = \frac{3(16)(3) + 6}{5(5)} = \frac{150}{25} = 6$$

مشق 4.1

1- شناخت کیجیے کہ درج ذیل الجبری جملے کثیر رتی ہیں یا نہیں (ہاں یا نہیں)۔

(i) $3x^2 + \frac{1}{x} - 5$

(ii) $3x^3 - 4x^2 - x\sqrt{x} + 3$

(iii) $x^2 - 3x + \sqrt{2}$

(iv) $\frac{3x}{2x-1} + 8$

2- بیان کریں کہ درج ذیل جملے ناطق جملے ہیں یا نہیں۔

(i) $\frac{3\sqrt{x}}{3\sqrt{x}+5}$

(ii) $\frac{x^3 - 2x^2 + \sqrt{3}}{2 + 3x - x^2}$

(iii) $\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9}$

(iv) $\frac{2\sqrt{x} + 3}{2\sqrt{x} - 3}$

3- درج ذیل ناطق جملوں کو مختصر ترین شکل میں تبدیل کریں۔

(i) $\frac{120x^2y^3z^5}{30x^3yz^2}$

(ii) $\frac{8a(x+1)}{2(x^2-1)}$

(iii) $\frac{(x+y)^2 - 4xy}{(x-y)^2}$

(iv) $\frac{(x^3 - y^3)(x^2 - 2xy + y^2)}{(x-y)(x^2 + xy + y^2)}$

(v) $\frac{(x+2)(x^2-1)}{(x+1)(x^2-4)}$

(vi) $\frac{x^2 - 4x + 4}{2x^2 - 8}$

(vii) $\frac{64x^5 - 64x}{(8x^2 + 8)(2x + 2)}$

(viii) $\frac{9x^2 - (x^2 - 4)^2}{4 + 3x - x^2}$

4- قیمت معلوم کریں۔

(a) $\frac{x^3y - 2z}{xz}$

(i) $x = 3, y = -1, z = -2$ (ii) $x = -1, y = -9, z = 4$ جبکہ

(b) $\frac{x^2y^3 - 5z^4}{xyz}$ جبکہ $x = 4, y = -2, z = -1$

5- دیے گئے عمل کی تکمیل کرتے ہوئے مختصر کریں۔

(i) $\frac{15}{2x-3y} - \frac{4}{3y-2x}$

(ii) $\frac{1+2x}{1-2x} - \frac{1-2x}{1+2x}$

(iii) $\frac{x^2-25}{x^2-36} - \frac{x+5}{x+6}$

(iv) $\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y} - \frac{2xy}{x^2-y^2}$

(v) $\frac{x-2}{x^2+6x+9} - \frac{x+2}{2x^2-18}$

(vi) $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{2}{x^2+1} - \frac{4}{x^4-1}$

6- دیے گئے عمل (عوامل) سے مختصر کریں۔

(i) $(x^2-49) \cdot \frac{5x+2}{x+7}$

(ii) $\frac{4x-12}{x^2-9} \div \frac{18-2x^2}{x^2+6x+9}$

(iii) $\frac{x^6-y^6}{x^2-y^2} \div (x^4+x^2y^2+y^4)$

(iv) $\frac{x^2-1}{x^2+2x+1} \cdot \frac{x+5}{1-x}$

(v) $\frac{x^2+xy}{y(x+y)} \cdot \frac{x^2+xy}{y(x+y)} \div \frac{x^2-x}{xy-2y}$

4.2 الجبری کلیات (Algebraic Formulae)

4.2.1 درج ذیل کلیات کا استعمال

(i) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2+b^2)$ اور $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$

(a^2+b^2) اور ab کی قیمتیں معلوم کرنے کے طریقہ کی وضاحت درج ذیل مثال سے کی جاتی ہے۔

مثال

اگر $a+b=7$ اور $a-b=3$ ہو تو (a^2+b^2) اور ab کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

حل

دی گئی قیمتیں ہیں $a+b=7$ اور $a-b=3$

$a^2 + b^2$ کی قیمت معلوم کرنے کے لیے کلیہ

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

درج کرنے سے $a - b = 3$ اور $a + b = 7$

$$(7)^2 + (3)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow 49 + 9 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow 58 = 2(a^2 + b^2) \quad \dots\dots \quad (\text{مختصر کرنے سے})$$

$$\Rightarrow 29 = a^2 + b^2 \quad \dots\dots \quad (2 \text{ پر تقسیم کرنے سے})$$

ab کی قیمت معلوم کرنے کے لیے کلیہ

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

$$\Rightarrow (7)^2 - (3)^2 = 4ab \quad \dots\dots \quad (\text{دی گئی قیمتیں درج کرنے سے})$$

$$\Rightarrow 49 - 9 = 4ab$$

$$40 = 4ab \quad \dots\dots \quad (\text{مختصر کرنے سے})$$

$$\Rightarrow 10 = ab \quad \dots\dots \quad (\text{لہذا } 4 \text{ پر تقسیم کرنے سے})$$

$$(ii) \quad (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

یہ فارمولہ رتبی جملہ کے مربع کے لیے ہے اور تین جملوں $(a + b + c)$ ، $(a^2 + b^2 + c^2)$ اور

$2(ab + bc + ca)$ پر مشتمل ہے۔ ان تین جملوں میں سے اگر دو جملوں کی قیمت دی گئی ہو تو تیسرے جملے کی قیمت معلوم کی جاسکتی ہے۔ طریق کار کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے کی جاتی ہے۔

مثال 1

اگر $a^2 + b^2 + c^2 = 43$ اور $ab + bc + ca = 3$ ہو تو $a + b + c$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

حل

ہم جانتے ہیں کہ

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$\Rightarrow (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

دی گئی قیمتیں $ab + bc + ca = 3$ اور $a^2 + b^2 + c^2 = 43$ درج کرنے سے

$$\Rightarrow (a+b+c)^2 = 43 + 2 \times 3$$

$$\Rightarrow (a+b+c)^2 = 49$$

$$\Rightarrow a+b+c = \pm \sqrt{49}$$

$$\therefore a+b+c = \pm 7$$

مثال 2

اگر $a+b+c=6$ اور $a^2+b^2+c^2=24$ ہو تو $ab+bc+ca$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل

ہم جانتے ہیں کہ

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$\therefore (6)^2 = 24 + 2(ab + bc + ca)$$

$$\Rightarrow 36 = 24 + 2(ab + bc + ca)$$

$$\Rightarrow 12 = 2(ab + bc + ca)$$

$$\therefore ab + bc + ca = 6$$

مثال 3

اگر $a+b+c=7$ اور $ab+bc+ca=9$ ہو تو $a^2+b^2+c^2$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل

ہم جانتے ہیں کہ

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$\Rightarrow (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$$\Rightarrow (7)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(9)$$

$$\Rightarrow 49 = a^2 + b^2 + c^2 + 18$$

$$\Rightarrow 31 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = 31$$

$$(iii) (a + b)^3 = a^3 + 3ab(a + b) + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3ab(a - b) - b^3$$

مثال 1

اگر $2x - 3y = 10$ اور $xy = 2$ ہو تو $8x^3 - 27y^3$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل

دی گئی قیمت کے مطابق

$$2x - 3y = 10$$

$$\Rightarrow (2x - 3y)^3 = (10)^3$$

$$\Rightarrow 8x^3 - 27y^3 - 3 \times 2x \times 3y(2x - 3y) = 1000$$

$$\Rightarrow 8x^3 - 27y^3 - 18xy(2x - 3y) = 1000$$

$$\Rightarrow 8x^3 - 27y^3 - 18 \times 2 \times 10 = 1000$$

$$\Rightarrow 8x^3 - 27y^3 - 360 = 1000$$

$$\therefore 8x^3 - 27y^3 = 1360$$

مثال 2

اگر $x + \frac{1}{x} = 8$ ہو تو $x^3 + \frac{1}{x^3}$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل

دی گئی قیمت کے مطابق

$$x + \frac{1}{x} = 8$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = (8)^3$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \times x \times \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 512$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \times \left(x + \frac{1}{x}\right) = 512$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \times 8 = 512$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 24 = 512$$

$$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = 488$$

مثال 3

اگر $x - \frac{1}{x} = 4$ ہو تو $x^3 - \frac{1}{x^3}$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل دی گئی قیمت کے مطابق

$$x - \frac{1}{x} = 4$$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 = 64$$

$$\Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} - 3x \times \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right) = 64$$

$$\Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} - 3(4) = 64$$

$$\Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} - 12 = 64$$

$$\Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} = 64 + 12$$

$$\Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} = 76$$

$$(iv) \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \pm ab + b^2)$$

مندرجہ ذیل مثالوں سے کی گئی ہے۔ اور $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \pm 1\right)$ کے حاصل ضرب معلوم کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت بھی

مندرجہ ذیل مثالوں سے کی گئی ہے۔

مثال 1

$$64x^3 + 343y^3 \text{ کی تجزی کریں۔}$$

حل

$$\begin{aligned} 64x^3 + 343y^3 &= (4x)^3 + (7y)^3 \\ &= (4x + 7y) [(4x)^2 - (4x)(7y) + (7y)^2] \\ &= (4x + 7y)(16x^2 - 28xy + 49y^2) \end{aligned}$$

مثال 2

$$125x^3 - 1331y^3 \text{ کی تجزی کریں۔}$$

حل

$$\begin{aligned} 125x^3 - 1331y^3 &= (5x)^3 - (11y)^3 \\ &= (5x - 11y) [(5x)^2 + (5x)(11y) + (11y)^2] \\ &= (5x - 11y)(25x^2 + 55xy + 121y^2) \end{aligned}$$

مثال 3

$$\left(\frac{2}{3}x + \frac{3}{2x}\right) \left(\frac{4}{9}x^2 - 1 + \frac{9}{4x^2}\right) \text{ حاصل ضرب معلوم کریں:}$$

حل

$$\begin{aligned} &\left(\frac{2}{3}x + \frac{3}{2x}\right) \left(\frac{4}{9}x^2 - 1 + \frac{9}{4x^2}\right) \\ &= \left(\frac{2}{3}x + \frac{3}{2x}\right) \left[\left(\frac{2}{3}x\right)^2 - \left(\frac{2}{3}x\right)\left(\frac{3}{2x}\right) + \left(\frac{3}{2x}\right)^2 \right] \\ &= \left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{3}{2x}\right)^3 \\ &= \frac{8}{27}x^3 + \frac{27}{8x^3} \end{aligned}$$

حاصل ضرب معلوم کریں: $\left(\frac{4}{5}x - \frac{5}{4x}\right)\left(\frac{16}{25}x^2 + \frac{25}{16x^2} + 1\right)$

حل

$$\left(\frac{4}{5}x - \frac{5}{4x}\right)\left(\frac{16}{25}x^2 + \frac{25}{16x^2} + 1\right)$$

$$= \left(\frac{4}{5}x - \frac{5}{4x}\right)\left(\frac{16x^2}{25} + 1 + \frac{25}{16x^2}\right) \quad \text{کلے کے مطابق ترتیب دینے سے}$$

$$= \left(\frac{4}{5}x - \frac{5}{4x}\right) \left[\left(\frac{4}{5}x\right)^2 + \left(\frac{4}{5}x\right)\left(\frac{5}{4x}\right) + \left(\frac{5}{4x}\right)^2 \right]$$

$$= \left(\frac{4}{5}x\right)^3 - \left(\frac{5}{4x}\right)^3 = \frac{64}{125}x^3 - \frac{125}{64x^3}$$

کلے کی مدد سے مسلسل حاصل ضرب معلوم کریں۔

$$(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$$

حل

$$(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$$

$$= (x+y)(x^2-xy+y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$$

$$= (x^3+y^3)(x^3-y^3) = (x^3)^2 - (y^3)^2 = x^6 - y^6$$

مشق 4.2

1- (i) اگر $a+b=10$ اور $a-b=6$ ہو تو (a^2+b^2) کی قیمت معلوم کریں۔

(ii) اگر $a+b=5$ اور $a-b=\sqrt{17}$ ہو تو ab کی قیمت معلوم کریں۔

2- اگر $a^2+b^2+c^2=45$ اور $a+b+c=-1$ ہو تو $ab+bc+ca$ کی قیمت معلوم کریں۔

3- اگر $m + n + p = 10$ اور $mn + np + mp = 27$ ہو تو $m^2 + n^2 + p^2$ کی قیمت معلوم کریں۔

4- اگر $x^2 + y^2 + z^2 = 78$ اور $xy + yz + zx = 59$ ہو تو $x + y + z$ کی قیمت معلوم کریں۔

5- اگر $x + y + z = 12$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 64$ ہو تو $xy + yz + zx$ کی قیمت معلوم کریں۔

6- اگر $x + y = 7$ اور $xy = 12$ ہو تو $x^3 + y^3$ کی قیمت معلوم کریں۔

7- اگر $3x + 4y = 11$ اور $xy = 12$ ہو تو $27x^3 + 64y^3$ کی قیمت معلوم کریں۔

8- اگر $x - y = 4$ اور $xy = 21$ ہو تو $x^3 - y^3$ کی قیمت معلوم کریں۔

9- اگر $5x - 6y = 13$ اور $xy = 6$ ہو تو $125x^3 - 216y^3$ کی قیمت معلوم کریں۔

10- اگر $x + \frac{1}{x} = 3$ ہو تو $x^3 + \frac{1}{x^3}$ کی قیمت معلوم کریں۔

11- اگر $x - \frac{1}{x} = 7$ ہو تو $x^3 - \frac{1}{x^3}$ کی قیمت معلوم کریں۔

12- اگر $\left(3x + \frac{1}{3x}\right) = 5$ ہو تو $\left(27x^3 + \frac{1}{27x^3}\right)$ کی قیمت معلوم کریں۔

13- اگر $\left(5x - \frac{1}{5x}\right) = 6$ ہو تو $\left(125x^3 - \frac{1}{125x^3}\right)$ کی قیمت معلوم کریں۔

14- تجزی کریں۔

(i) $x^3 - y^3 - x + y$ (ii) $8x^3 - \frac{1}{27y^3}$

15- کلیات کی مدد سے حاصل ضرب معلوم کریں۔

(i) $(x^2 + y^2)(x^4 - x^2y^2 + y^4)$ (ii) $(x^3 - y^3)(x^6 + x^3y^3 + y^6)$

(iii) $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)(x^4 - x^2y^2 + y^4)$

(iv) $(2x^2 - 1)(2x^2 + 1)(4x^4 + 2x^2 + 1)(4x^4 - 2x^2 + 1)$

4.3 مقادیر اصم اور ان کا استعمال

4.3.1 تعریف

ایسی غیر ناطق مقدار (یا جملہ) جس میں جذری علامت $\sqrt{\quad}$ کے نیچے ناطق مقدار درج ہو، اسے مقدار اصم کہتے ہیں۔

یعنی $\sqrt[n]{a}$ کو مقدار اصم کہیں گے اگر

(i) a ناطق ہو، (ii) $\sqrt[n]{a}$ غیر ناطق ہو

مثلاً $\sqrt{3}$ ، $\sqrt{\frac{2}{5}}$ ، $\sqrt[3]{7}$ ، $\sqrt[4]{10}$ مقادیر اصم ہیں۔

لیکن $\sqrt{\pi}$ اور $\sqrt{2 + \sqrt{17}}$ مقادیر اصم نہیں ہیں کیونکہ π اور $2 + \sqrt{17}$ ناطق اعداد نہیں ہیں۔

نوٹ کریں کہ مقدار اصم $\sqrt[n]{a}$ میں n کو مقدار اصم کا درجہ (order) کہتے ہیں اور ناطق عدد 'a' کو مجذور (radicand) کہتے ہیں۔ $\sqrt[3]{7}$ تیسرے درجے کی مقدار اصم ہے۔

ہر مقدار اصم ایک غیر ناطق عدد ہوتی ہے۔ لیکن ہر غیر ناطق عدد مقدار اصم نہیں ہوتا۔ مثلاً مقدار اصم $\sqrt[3]{5}$

ایک غیر ناطق عدد لیکن غیر ناطق عدد $\sqrt{\pi}$ مقدار اصم نہیں ہے۔

4.3.2 مقادیر اصم پر بنیادی عوامل کا اطلاق

(a) مقادیر اصم کی جمع و تفریق

تشابہ مقادیر اصم (مقادیر اصم جن کے غیر ناطق اجزائے ضربی باہم برابر ہوں) کو جمع یا تفریق کر کے ایک رقی مقدار اصم

کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ اس کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے کی گئی ہے۔

مثال متشابہ مقادیر اصم والے ارکان کو اکٹھا کر کے (الجبری مجموعہ لیکر) مختصر کریں۔

(i) $4\sqrt{3} - 3\sqrt{27} + 2\sqrt{75}$

(ii) $\sqrt[3]{128} - \sqrt[3]{250} + \sqrt[3]{432}$

حل

(i) $4\sqrt{3} - 3\sqrt{27} + 2\sqrt{75}$

$$= 4\sqrt{3} - 3\sqrt{9 \times 3} + 2\sqrt{25 \times 3} = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{9} \sqrt{3} + 2\sqrt{25} \times \sqrt{3}$$

$$= 4\sqrt{3} - 9\sqrt{3} + 10\sqrt{3}$$

$$= (4 - 9 + 10) \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

(ii) $\sqrt[3]{128} - \sqrt[3]{250} + \sqrt[3]{432}$

$$= \sqrt[3]{64 \times 2} - \sqrt[3]{125 \times 2} + \sqrt[3]{216 \times 2}$$

$$= \sqrt[3]{(4)^3 \times 2} - \sqrt[3]{(5)^3 \times 2} + \sqrt[3]{(6)^3 \times 2}$$

$$= \sqrt[3]{(4)^3} \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{(5)^3} \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{(6)^3} \sqrt[3]{2}$$

$$= 4\sqrt[3]{2} - 5\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{2}$$

$$= (4 - 5 + 6) \sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$$

(b) مقادیر اصم کی ضرب اور تقسیم

ایک ہی درجے کے مقادیر اصم کو ضرب دینے یا تقسیم کرنے کے لیے مقادیر اصم کے درج ذیل قوانین کو استعمال

کرتے ہیں۔

$$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab} \quad \text{اور} \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

جواب کے طور پر حاصل کردہ مقدارِ اصم کا درجہ بھی وہی ہوتا ہے جو دی گئی مقدارِ اصم کا درجہ ہو۔
 اگر دی گئی مقدارِ اصم جن کو ضرب دینا یا تقسیم کرنا مقصود ہو، ایک ہی درجے کی نہ ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے
 انہیں یکساں درجے کی مقدارِ اصم میں تھوکیل کریں۔

مثال مختصر کریں اور جواب کو سادہ ترین شکل میں لکھیں۔

$$(i) \sqrt{14} \sqrt{35} \quad (ii) \frac{\sqrt[6]{12}}{\sqrt{3} \sqrt[3]{2}}$$

حل

$$(i) \sqrt{14} \sqrt{35} = \sqrt{14 \times 35} = \sqrt{7 \times 2 \times 7 \times 5} = \sqrt{(7)^2 \times 2 \times 5} \\ = \sqrt{(7)^2 \times 10} = \sqrt{(7)^2} \times \sqrt{10} = 7\sqrt{10}$$

$$(ii) \frac{\sqrt[6]{12}}{\sqrt{3} \sqrt[3]{2}} \quad \text{دی گئی مقدارِ اصم}$$

$\sqrt{3} \sqrt[3]{2}$ میں درجے 2 اور 3 برابر نہیں ہیں۔ ان کا ذواضعاف اقل 6 ہے۔ اس لیے درجہ 6 کی مقدارِ اصم

میں تھوکیل کرتے ہوئے:

$$\sqrt{3} = (3)^{1/2} = (3)^{3/6} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{27}$$

$$\sqrt[3]{2} = (2)^{1/3} = (2)^{2/6} = \sqrt[6]{(2)^2} = \sqrt[6]{4}$$

$$\therefore \frac{\sqrt[6]{12}}{\sqrt{3} \sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[6]{12}}{\sqrt[6]{27} \sqrt[6]{4}} = \frac{\sqrt[6]{12}}{\sqrt[6]{108}} = \sqrt[6]{\frac{12}{108}} = \sqrt[6]{\frac{1}{9}}$$

مختصر ترین شکل میں

$$\sqrt[6]{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2/6} = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/3} = \sqrt[3]{\frac{1}{3}}$$

4.3 مشق

1- درج ذیل ہر ایک مقدارِ اصم کو مختصر ترین شکل میں لکھیں۔

(i) $\sqrt{180}$

(ii) $3\sqrt{162}$

(iii) $\frac{3}{4}\sqrt[3]{128}$

(iv) $\sqrt[5]{96x^6y^7z^8}$

2- مختصر کریں۔

(i) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}\sqrt{2}}$

(ii) $\frac{\sqrt{21}\sqrt{9}}{\sqrt{63}}$

(iii) $\sqrt[5]{243x^5y^{10}z^{15}}$

(iv) $\frac{4}{5}\sqrt[3]{125}$

(v) $\sqrt{21} \times \sqrt{7} \times \sqrt{3}$

3- متشابہ مقادیرِ اصم میں تجویل کر کے مختصر کریں۔

(i) $\sqrt{45} - 3\sqrt{20} + 4\sqrt{5}$

(ii) $4\sqrt{12} + 5\sqrt{27} - 3\sqrt{75} + \sqrt{300}$

(iii) $\sqrt{3}(2\sqrt{3} + 3\sqrt{3})$

(iv) $2(6\sqrt{5} - 3\sqrt{5})$

4- مختصر کریں۔

(i) $(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})$

(ii) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$

(iii) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

(iv) $\left(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(v) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x + y)(x^2 + y^2)$

4.4 مقادیرِ اصم کو ناطق بنانے کا طریقہ

(a) تعریفیں

(i) ایسی مقدارِ اصم جس میں ایک ہی رقم موجود ہو یک رقمی مقدارِ اصم کہلاتی ہے۔ مثلاً $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ وغیرہ۔

(ii) دو رقوم کے مجموعہ یا فرق پر مشتمل جملہ جس کے دونوں ارکان یک رتمی مقدار اصم ہوں یا یہ جملہ یک رتمی

مقدار اصم اور ایک ناطق عدد کا مجموعہ ہو، دو رتمی مقدار اصم (binomial surd) کہلاتا ہے۔

مثلاً $\sqrt{3} + \sqrt{7}$ یا $\sqrt{2} + 5$ یا $\sqrt{11} - 8$ وغیرہ، دو رتمی مقادیر اصم ہیں۔

ہم اس تعریف کو تین رقوم کے مجموعہ پر مشتمل سے رتمی مقدار اصم (trinomial surd) تک بڑھا سکتے ہیں۔

(iii) جب کسی دو مقادیر اصم کا حاصل ضرب ایک ناطق عدد ہو تو ہر ایک مقدار اصم کو دوسرے کا ناطق جزو ضربی کہا جاتا ہے۔

(iv) کسی دی گئی مقدار اصم کو اس کے ناطق جزو ضربی سے ضرب دے کر ایک ناطق عدد حاصل ضرب کے طور پر حاصل کرنے کے عمل کو ناطق بنانے کا طریقہ کہتے ہیں۔

(v) درجہ دوم کے دو رتمی مقادیر اصم جو ایک ہی مقداروں پر مشتمل ہوں اور جن کے درمیان علامات مختلف ہوں

(دونوں رقوموں میں سے کم از کم ایک رقم مقدار اصم ہو) زوج مقادیر اصم (conjugate surds) کہلاتی ہیں۔ مثلاً $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ اور $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ ایک دوسرے کے زوج مقادیر اصم ہیں۔ اسی طرح

مقادیر اصم $x + \sqrt{y}$ کا زوج جملہ $x - \sqrt{y}$ ہے۔ زوج مقادیر اصم کا مثلاً $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ اور $\sqrt{a} - \sqrt{b}$

کا حاصل ضرب $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$ لازماً ناطق مقدار ہوتی ہے۔

(جزری علامت سے آزاد)۔

اسی طرح $a + b\sqrt{m}$ اور اس کے زوج $a - b\sqrt{m}$ کا حاصل ضرب بھی جزری علامت کے بغیر ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر درج ذیل حاصل ضرب

$$(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) = (3)^2 - (\sqrt{5})^2 = 9 - 5 = 4$$

ایک ناطق عدد ہے۔

(b) مقادیر اصم پر مشتمل کسور کے مخرج کو ناطق بنانا

مندرجہ بالا بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مقادیر اصم پر مشتمل کسی کسر کے مخرج (نسب نما)

جو $a + b\sqrt{x}$ (یا $a - b\sqrt{x}$) کی شکل میں ہو، کو ناطق بنالینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ کسر کے مخرج کو

جس زوج جزو ضربی $a - b\sqrt{x}$ (یا $a + b\sqrt{x}$) سے ضربی دی جائے اسی سے شمار کنندہ کو بھی ضرب دیں۔ اس طرح

جزری علامت خارج ہو جاتی ہے اور ہم ناطق مخرج حاصل کر لیتے ہیں۔

$$(c) \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}, \frac{1}{a + b\sqrt{x}} \text{ کی اقسام کے حقیقی اعداد کو ناطق بنانا}$$

دیے گئے جملوں $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}, \frac{1}{a + b\sqrt{x}}$ اور ان پر بنیادی عوامل کے اطلاق سے حاصل کردہ جملوں (جبکہ

x, y قدرتی اور a, b صحیح اعداد ہیں) کو ناطق بنانے کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے کی گئی ہے۔

مثال 1

$$\frac{58}{7 - 2\sqrt{5}} \text{ میں مخرج کو ناطق بنائیے۔}$$

حل

مخرج کو ناطق بنانے کے لیے ہم شمار کنندہ اور مخرج دونوں کو $(7 - 2\sqrt{5})$ کے زوج $(7 + 2\sqrt{5})$ سے ضرب دیتے ہیں۔ یعنی

$$\begin{aligned} \frac{58}{7 - 2\sqrt{5}} &= \frac{58}{7 - 2\sqrt{5}} \times \frac{7 + 2\sqrt{5}}{7 + 2\sqrt{5}} = \frac{58(7 + 2\sqrt{5})}{(7)^2 - (2\sqrt{5})^2} \\ &= \frac{58(7 + 2\sqrt{5})}{49 - 20} \quad (\text{مخرج سے جذری علامت خارج ہو گئی ہے}) \\ &= \frac{58(7 + 2\sqrt{5})}{29} = 2(7 + 2\sqrt{5}) \end{aligned}$$

مثال 2

$$\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \text{ میں مخرج کو ناطق بنائیں۔}$$

حل

شمار کنندہ اور مخرج دونوں کو $(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ کے زوج $(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ سے ضرب دینے سے

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} &= \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{5 - 2} \\ &= \frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{6}{2\sqrt{3}-\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$$

حل

پہلے ہر ایک مخزج کو علیحدہ علیحدہ ناطق بنا کر اور پھر مختصر کرنے سے

$$\begin{aligned} & \frac{6}{2\sqrt{3}-\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} \\ &= \frac{6}{2\sqrt{3}-\sqrt{6}} \times \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2\sqrt{3}+\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} \\ &= \frac{6(2\sqrt{3}+\sqrt{6})}{(2\sqrt{3})^2-(\sqrt{6})^2} + \frac{\sqrt{6}(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2} - \frac{4\sqrt{3}(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{(\sqrt{6})^2-(\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{6(2\sqrt{3}+\sqrt{6})}{12-6} + \frac{\sqrt{6}(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{3-2} - \frac{4\sqrt{3}(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{6-2} \\ &= \frac{12\sqrt{3}+6\sqrt{6}}{6} + \frac{\sqrt{6}\sqrt{3}-\sqrt{6}\sqrt{2}}{1} - \frac{4\sqrt{3}\sqrt{6}+4\sqrt{3}\sqrt{2}}{4} \\ &= 2\sqrt{3} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} - \sqrt{6} = 0 \end{aligned}$$

مثال 4

$$\frac{4+3\sqrt{5}}{4-3\sqrt{5}} = x + y\sqrt{5}$$

ناطق اعداد x اور y کی قیمتیں معلوم کریں جبکہ

حل

دی گئی مقادیر اصم کی کسر

$$\begin{aligned} \frac{4+3\sqrt{5}}{4-3\sqrt{5}} &= \frac{4+3\sqrt{5}}{4-3\sqrt{5}} \times \frac{4+3\sqrt{5}}{4+3\sqrt{5}} = \frac{(4+3\sqrt{5})^2}{(4)^2-(3\sqrt{5})^2} \\ &= \frac{16+24\sqrt{5}+45}{16-45} = \frac{61+24\sqrt{5}}{-29} \\ \Rightarrow -\frac{61}{29} - \frac{24}{29}\sqrt{5} &= x + y\sqrt{5} \quad (\text{معلوم}) \end{aligned}$$

لہذا طرفین کا موازنہ کرنے سے

$$x = -\frac{61}{29}, \quad y = -\frac{24}{29}$$

اگر $x = 3 + \sqrt{8}$ ہو تو مندرجہ ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔

(i) $x + \frac{1}{x}$ اور (ii) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

حل

$$\therefore x = 3 + \sqrt{8}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x} &= \frac{1}{3 + \sqrt{8}} = \frac{1}{3 + \sqrt{8}} \times \frac{3 - \sqrt{8}}{3 - \sqrt{8}} = \frac{3 - \sqrt{8}}{(3)^2 - (\sqrt{8})^2} \\ &= \frac{3 - \sqrt{8}}{9 - 8} = 3 - \sqrt{8} \end{aligned}$$

(i) $x + \frac{1}{x} = 3 + \sqrt{8} + 3 - \sqrt{8} = 6$

(ii) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 36$

یا $x^2 + 2x \times \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 36$

یا $x^2 + \frac{1}{x^2} = 34$

مشق 4.4

مندرجہ ذیل کے مخرجوں کو ناطق بنائیے۔

-1

(i) $\frac{3}{4\sqrt{3}}$

(ii) $\frac{14}{\sqrt{98}}$

(iii) $\frac{6}{\sqrt{8}\sqrt{27}}$

(iv) $\frac{1}{3 + 2\sqrt{5}}$

(v) $\frac{15}{\sqrt{31} - 4}$

(vi) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

(vii) $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$

(viii) $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

(iii) $x + \sqrt{y}$ قسم کے درج ذیل مقادیر اصم کے زوج معلوم کیجیے۔ -2

(i) $3 + \sqrt{7}$ (ii) $4 - \sqrt{5}$ (iii) $2 + \sqrt{3}$ (iv) $2 + \sqrt{5}$

(v) $5 + \sqrt{7}$ (vi) $4 - \sqrt{15}$ (vii) $7 - \sqrt{6}$ (viii) $9 + \sqrt{2}$

(i) اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ ہو تو $\frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کیجیے۔ -3

(ii) اگر $x = 4 - \sqrt{17}$ ہو تو $\frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iii) اگر $x = \sqrt{3} + 2$ ہو تو $x + \frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

مختصر کیجیے۔ -4

(i) $\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ (ii) $\frac{1}{2 + \sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \frac{1}{2 + \sqrt{5}}$

(iii) $\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$

(i) اگر $x = 2 + \sqrt{3}$ ہو تو $x - \frac{1}{x}$ اور $(x - \frac{1}{x})^2$ کی قیمتیں معلوم کریں۔ -5

(ii) اگر $x = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$ ہو تو $x + \frac{1}{x}$ ، $x^2 + \frac{1}{x^2}$ اور $x^3 + \frac{1}{x^3}$ کی قیمتیں معلوم کریں۔

[اشارہ: $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ اور $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$]

(i) اگر $a + b\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} + \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$ ہو تو مناطق اعداد a اور b کی قیمتیں معلوم کریں۔ -6

اعادہ مشق 4

1- دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) $(4x + 3y - 2)$ ایک الجبری..... ہے۔

(a) جملہ (b) فقرہ (c) مساوات (d) غیر مساوات

(ii) کثیررتی $4x^4 + 2x^2y$ کا درجہ..... ہے۔

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

..... ہے برابر ہے $a^3 + b^3$ (iii)

- (a) $(a-b)(a^2 + ab + b^2)$ (b) $(a+b)(a^2 - ab + b^2)$
 (c) $(a-b)(a^2 - ab + b^2)$ (d) $(a-b)(a^2 + ab - b^2)$

..... ہے برابر ہے $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})$ (iv)

- (a) 7 (b) -7 (c) -1 (d) 1

..... ہے مقدارِ اصم $a + \sqrt{b}$ کا زوجِ جملہ (v)

- (a) $-a + \sqrt{b}$ (b) $a - \sqrt{b}$ (c) $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ (d) $\sqrt{a} - \sqrt{b}$

..... ہے برابر ہے $\frac{1}{a-b} - \frac{1}{a+b}$ (vi)

- (a) $\frac{2a}{a^2 - b^2}$ (b) $\frac{2b}{a^2 - b^2}$ (c) $\frac{-2a}{a^2 - b^2}$ (d) $\frac{-2b}{a^2 - b^2}$

..... ہے برابر ہے $\frac{a^2 - b^2}{a+b}$ (vii)

- (a) $(a-b)^2$ (b) $(a+b)^2$ (c) $a+b$ (d) $a-b$

..... ہے برابر ہے $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ (viii)

- (a) $a^2 + b^2$ (b) $a^2 - b^2$ (c) $a-b$ (d) $a+b$

خالی جگہ پُر کریں -2

..... ہے کثیر رقمی $x^2y^2 + 3xy + y^3$ کا درجہ (i)

..... ہے برابر ہے $x^2 - 4$ (ii)

$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right) (\dots\dots\dots)$ (iii)

$2(a^2 + b^2) = (a+b)^2 + (\dots\dots\dots)^2$ (iv)

$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \dots\dots\dots$ (v)

..... ہے مقدارِ اصم $\sqrt[3]{x}$ کا درجہ (vi)

$\frac{1}{2 - \sqrt{3}} = \dots\dots\dots$ (vii)

3- اگر $x + \frac{1}{x} = 3$ ہو تو درج ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔

(i) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

(ii) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

4- اگر $x - \frac{1}{x} = 2$ ہو تو درج ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔

(i) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

(ii) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

5- اگر $x + y = 5$ اور $x - y = 3$ ہو تو $x^3 + y^3$ اور xy کی قیمت معلوم کریں۔

6- اگر $p = 2 + \sqrt{3}$ ہو تو درج ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔

(i) $p + \frac{1}{p}$

(ii) $p - \frac{1}{p}$

(iii) $p^2 + \frac{1}{p^2}$

(iv) $p^2 - \frac{1}{p^2}$

7- اگر $q = \sqrt{5} + 2$ ہو تو درج ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔

(i) $q + \frac{1}{q}$

(ii) $q - \frac{1}{q}$

(iii) $q^2 + \frac{1}{q^2}$

(iv) $q^2 - \frac{1}{q^2}$

8- مختصر کریں۔

(i) $\frac{\sqrt{a^2+2} + \sqrt{a^2-2}}{\sqrt{a^2+2} - \sqrt{a^2-2}}$

(ii) $\frac{1}{a - \sqrt{a^2 - x^2}} - \frac{1}{a + \sqrt{a^2 - x^2}}$

خلاصہ

- ☆ مستقل مقداروں یا متغیرات یا دونوں کو بنیادی عوامل کے ذریعے ملائے سے الجبری جملہ بنتا ہے۔
- ☆ کثیررتی سے مراد ایک ایسا جملہ ہے جو کئی رتوں پر مشتمل ہو۔
- ☆ ایک متغیر x میں کثیررتی جملے کا درجہ x کا سب سے بڑا قوت نما ہوتا ہے۔
- ☆ $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی شکل کا جملہ (جبکہ $q(x) \neq 0$) ناطق جملہ کہلاتا ہے۔ اگر $p(x)$ اور $q(x)$ کثیررتیاں ہوں۔
- ☆ ایک غیر ناطق مقدار جس میں جذری علامت $\sqrt{\quad}$ کے نیچے ناطق مقدار درج ہو اسے مقدارِ اصم کہتے ہیں۔
- ☆ $\sqrt[n]{x}$ میں، n کو مقدارِ اصم کا درجہ (order) اور ناطق عدد x کو مجذور (radicand) کہتے ہیں۔
- ☆ ایسی مقدارِ اصم جس میں ایک ہی رقم موجود ہو یک رتی مقدارِ اصم کہلاتی ہے۔
- ☆ دو رتوں کے مجموعہ یا فرق پر مشتمل جملہ جس کے دونوں ارکان یک رتی مقدارِ اصم ہوں یا یہ جملہ یک رتی مقدارِ اصم اور ایک ناطق عدد کا مجموعہ ہو اسے دو رتی مقدارِ اصم (binomial surd) کہتے ہیں۔
- ☆ $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ کی زوج مقدارِ اصم $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ ہوتی ہے۔

تجزی

(FACTORIZATION)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

5.1 تجزی (Factorization)

5.2 مسئلہ باقی اور مسئلہ تجزی (Remainder Theorem and Factor Theorem)

5.3 تین درجہ کی کثیرتی کی تجزی (Factorization of a Cubic Polynomial)

یونٹ میں طلباء کے سیکھنے کے اہم وسیع ترما حاصل امتیاج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ ان کو یاد آ جائے کہ وہ درج ذیل ٹائپ کے الجبری جملوں کی تجزی کر چکے ہیں۔

- $ka + kb + kc$
- $ac + ad + bc + bd$
- $a^2 \pm 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2$
- $a^2 \pm 2ab + b^2 - c^2$

☆ درج ذیل ٹائپ (قسم / طرز) کے جملوں کے اجزائے ضربی بنا سکیں۔

$a^4 + a^2b^2 + b^4$, $a^4 + 4b^4$ ٹائپ I

$x^2 + px + q$ ٹائپ II

$ax^2 + bx + c$ ٹائپ III

$(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) + k$ ٹائپ IV

$(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + k$

$(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + kx^2$

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad \text{V ٹائپ}$$

$$a^3 \pm b^3 \quad \text{VI ٹائپ}$$

☆ مسئلہ باقی کو بیان اور ثابت کرنے کے علاوہ مثالوں سے اس کی وضاحت کر سکیں۔

☆ کسی کثیررتی جملے کو ایک درجے والی کثیررتی پر تقسیم کرنے سے (تقسیم کا عمل کے بغیر) باقی کی قیمت معلوم کر سکیں۔

☆ کسی کثیررتی جملے میں موجود متغیر کی وہ قیمت معلوم کر سکیں جو جملے کی قیمت '0' کے برابر کر دے۔

☆ مسئلہ تجزی کو بیان اور ثابت کر سکیں۔

☆ مسئلہ تجزی کی مدد سے تین درجی کثیررتی کے اجزائے ضربی بنا سکیں۔

تعارف

تجزی کا ریاضی میں ایک اہم کردار ہے۔ اس سے پیچیدہ جملوں کا مطالعہ نسبتاً آسان اور سادہ جملوں کے مطالعہ میں بدل جاتا ہے۔ اس یونٹ میں ہم مختلف قسم کے کثیررتی جملوں کی تجزی کرنے کے طریقے سیکھیں گے۔

5.1 تجزی

اگر ہم کثیررتی جملے $p(x)$ کا اظہار کثیررتیوں $g(x)$ اور $h(x)$ کے حاصل ضرب یعنی $p(x) = g(x)h(x)$

کی شکل میں کر سکیں تو کثیررتیوں $g(x)$ اور $h(x)$ میں سے ہر ایک کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی کہلاتا ہے۔

مثال کے طور پر ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع: $ab + ac = a(b + c)$ میں

a اور $(b + c)$ جملہ $ab + ac$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

جب کوئی کثیررتی جملہ ایسے اجزائے ضربی کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھا گیا ہو کہ ہر جزو ضربی مفرد جملہ ہو تو دیے گئے

کثیررتی جملے کی تجزی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسی تجزی کو مکمل تجزی یا مفرد تجزی کہتے ہیں۔

$$(a) \quad ka + kb + kc \quad \text{کی قسم کے جملے کی تجزی کرنا}$$

$$\text{مثال 1} \quad 5a - 5b + 5c \quad \text{کی تجزی کیجیے۔}$$

$$\text{حل} \quad (5 \text{ ہر رقم میں مشترک ہے}) \quad 5a - 5b + 5c = 5(a - b + c) \quad \text{دیا گیا جملہ}$$

$$\text{مثال 2} \quad 5a - 5b - 15c \quad \text{کی تجزی کیجیے۔}$$

$$\text{حل} \quad 5a - 5b - 15c = 5(a - b - 3c) \quad \text{دیا گیا جملہ}$$

(b) $ac + ad + bc + bd$ کی قسم کے جملے کی تجزی کرنا

$$ac + ad + bc + bd$$

$$(ac + ad) + (bc + db) \quad (\text{مناسب گروپ بنانے سے})$$

$$= a(c + d) + b(c + d) \quad (a \text{ پہلے گروپ میں اور } b \text{ دوسرے گروپ میں مشترک})$$

$$= (a + b)(c + d) \quad (c+d) \text{ مشترک لینے سے}$$

وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں میں کیے گئے عمل پر غور کریں۔

مثال 1 $3x - 3a + xy - ay$ کی تجزی کیجیے۔

حل دیے گئے کثیر رقمی جملے کو دوبارہ مناسب ترتیب دینے سے

$$3x + xy - 3a - ay = x(3 + y) - a(3 + y) \quad (\text{یک رقمی اجزائے ضربی})$$

$$= (3 + y)(x - a) \quad (3+y) \text{ مشترک جزو ضربی ہے}$$

مثال 2 $pqr + qr^2 - pr^2 - r^3$ کی تجزی کیجیے۔

$$\text{دیا گیا جملہ} = r(pq + qr - pr - r^2) \quad (\text{یک رقمی جُز و ضربی ہے})$$

$$= r[(pq + qr) - pr - r^2] \quad (\text{رقموں کو ترتیب دینے سے})$$

$$= r[q(p + r) - r(p + r)] \quad (\text{یک رقمی اجزائے ضربی})$$

$$= r(p + r)(q - r) \quad (p+r) \text{ مشترک لینے سے}$$

(c) $a^2 \pm 2ab + b^2$ کی قسم کے جملوں کی تجزی کرنا

ہم جانتے ہیں کہ

$$(i) \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = (a + b)(a + b)$$

$$(ii) \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 = (a - b)(a - b)$$

وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال 1 $25x^2 + 16 + 40x$ کی تجزی کیجیے۔

$$\text{دیا گیا جملہ} = 25x^2 + 40x + 16 = (5x)^2 + 2(5x)(4) + (4)^2$$

$$= (5x + 4)^2$$

$$= (5x + 4)(5x + 4)$$

(c) مثال 2 $12x^2 - 36x + 27$ کی تجزی کریں۔

$$\begin{aligned} \text{حل} \\ &= 12x^2 - 36x + 27 = 3(4x^2 - 12x + 9) \\ &= 3(2x - 3)^2 \\ &= 3(2x - 3)(2x - 3) \end{aligned}$$

(d) $a^2 - b^2$ کی قسم کے جملے کی تجزی کرنا

وضاحت کے لیے درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال درج ذیل جملوں کی تجزی کیجیے۔

(i) $4x^2 - (2y - z)^2$ (ii) $6x^4 - 96$

حل

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad 4x^2 - (2y - z)^2 &= (2x)^2 - (2y - z)^2 \\ &= [2x - (2y - z)][2x + (2y - z)] \\ &= (2x - 2y + z)(2x + 2y - z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad 6x^4 - 96 &= 6(x^4 - 16) \\ &= 6[(x^2)^2 - (4)^2] \\ &= 6(x^2 - 4)(x^2 + 4) \\ &= 6[(x^2 - (2)^2)(x^2 + 4)] \\ &= 6(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \end{aligned}$$

(e) $a^2 \pm 2ab + b^2 - c^2$ کی قسم کے جملوں کی تجزی کرنا

ہم جانتے ہیں کہ

$$a^2 \pm 2ab + b^2 - c^2 = (a \pm b)^2 - (c)^2 = (a \pm b - c)(a \pm b + c)$$

وضاحت کے لیے درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال تجزی کیجیے۔

(i) $x^2 + 6x + 9 - 4y^2$

(ii) $1 + 2ab - a^2 - b^2$

حل

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad x^2 + 6x + 9 - 4y^2 &= (x + 3)^2 - (2y)^2 \\ &= (x + 3 + 2y)(x + 3 - 2y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(ii)} \quad 1 + 2ab - a^2 - b^2 &= 1 - (a^2 - 2ab + b^2) \\
&= (1)^2 - (a - b)^2 \\
&= [1 - (a - b)] [1 + (a - b)] \\
&= (1 - a + b) (1 + a - b)
\end{aligned}$$

مشق 5.1

درج ذیل جملوں کی تجزیہ کیجیے۔

1. (i) $2abc - 4abx + 2abd$ (ii) $9xy - 12x^2y + 18y^2$
- (iii) $-3x^2y - 3x + 9xy^2$ (iv) $5ab^2c^3 - 10a^2b^3c - 20a^3bc^2$
- (v) $3x^3y(x - 3y) - 7x^2y^2(x - 3y)$ (vi) $2xy^3(x^2 + 5) + 8xy^2(x^2 + 5)$
2. (i) $5ax - 3ay - 5bx + 3by$ (ii) $3xy + 2y - 12x - 8$
- (iii) $x^3 + 3xy^2 - 2x^2y - 6y^3$ (iv) $(x^2 - y^2)z + (y^2 - z^2)x$
3. (i) $144a^2 + 24a + 1$ (ii) $\frac{a^2}{b^2} - 2 + \frac{b^2}{a^2}$
- (iii) $(x + y)^2 - 14z(x + y) + 49z^2$ (iv) $12x^2 - 36x + 27$
4. (i) $3x^2 - 75y^2$ (ii) $x(x - 1) - y(y - 1)$
- (iii) $128am^2 - 242an^2$ (iv) $3x - 243x^3$
5. (i) $x^2 - y^2 - 6y - 9$ (ii) $x^2 - a^2 + 2a - 1$
- (iii) $4x^2 - y^2 - 2y - 1$ (iv) $x^2 - y^2 - 4x - 2y + 3$
- (v) $25x^2 - 10x + 1 - 36z^2$ (vi) $x^2 - y^2 - 4xz + 4z^2$

ثابت I $a^4 + a^2b^2 + b^4$ or $a^4 + 4b^4$ کی قسم کے جملوں کی تجزیہ کرنا
اس قسم کے جملوں کی تجزیہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے کی جاتی ہے۔

مثال 1 $81x^4 + 36x^2y^2 + 16y^4$ کی تجزیہ کیجیے۔

$$\begin{aligned}
&81x^4 + 36x^2y^2 + 16y^4 \\
&= (9x^2)^2 + 72x^2y^2 + (4y^2)^2 - 36x^2y^2 \\
&= (9x^2 + 4y^2)^2 - (6xy)^2 \\
&= (9x^2 + 4y^2 + 6xy)(9x^2 + 4y^2 - 6xy) \\
&= (9x^2 + 6xy + 4y^2)(9x^2 - 6xy + 4y^2)
\end{aligned}$$

مثال 2 $9x^4 + 36y^4$ کی تجزی کیجیے۔

حل

$$\begin{aligned} 9x^4 + 36y^4 &= 9x^4 + 36y^4 + 36x^2y^2 - 36x^2y^2 \\ &= (3x^2)^2 + 2(3x^2)(6y^2) + (6y^2)^2 - (6xy)^2 \\ &= (3x^2 + 6y^2)^2 - (6xy)^2 \\ &= (3x^2 + 6y^2 + 6xy)(3x^2 + 6y^2 - 6xy) \\ &= (3x^2 + 6xy + 6y^2)(3x^2 - 6xy + 6y^2) \end{aligned}$$

ٹائپ II $x^2 + px + q$ کی قسم کے جملے کی تجزی کرنا

وضاحت کے لیے درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال درج ذیل جملوں کی تجزی کریں۔

(i) $x^2 - 7x + 12$

(ii) $x^2 + 5x - 36$

(i) $x^2 - 7x + 12$

حل

12 کے ممکنہ اجزائے ضربی میں سے مناسب اور کارآمد دو اعداد (جمع اور منفی کی علامت کا خیال رکھتے ہوئے) -3 اور

-4 ہیں۔ کیونکہ

$$(-3) + (-4) = -7 \quad \text{اور} \quad (-3)(-4) = 12$$

$$\therefore x^2 - 7x + 12 = x^2 - 3x - 4x + 12$$

$$= x(x-3) - 4(x-3)$$

$$= (x-3)(x-4)$$

(ii) $x^2 + 5x - 36$

36 کے ممکنہ اجزائے ضربی میں سے دو مناسب اور کارآمد اعداد 9 اور -4 ہیں۔ کیونکہ

$$9 + (-4) = 5 \quad \text{اور} \quad 9 \times (-4) = -36$$

$$\therefore x^2 + 5x - 36 = x^2 + 9x - 4x - 36$$

$$= x(x+9) - 4(x+9)$$

$$= (x+9)(x-4)$$

ثابث III $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ کی قسم کے جملے کی تجزی کرنا

ہم تجزی کرنے کے طریقہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال تجزی کیجیے۔

- (i) $9x^2 + 21x - 8$ (ii) $2x^2 - 8x - 42$ (iii) $10x^2 - 41xy + 21y^2$
 (i) $9x^2 + 21x - 8$

حل

دیے گئے جملے کا موازنہ $ax^2 + bx + c$ کے ساتھ کرنے سے ac کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$ac = (9)(-8) = -72$$

72 کے ممکنہ اجزائے ضربی میں سے اعداد کا مناسب جوڑا 24 اور -3 ہے۔ جن کا

$$x \text{ کا عددی سر } = 24 + (-3) = 21 \text{ مجموعہ}$$

$$\text{حاصل ضرب} = (24)(-3) = -72 = ac$$

$$\therefore 9x^2 + 21x - 8$$

$$= 9x^2 + 24x - 3x - 8$$

$$= 3x(3x + 8) - (3x + 8)$$

$$= (3x + 8)(3x - 1)$$

$$(ii) 2x^2 - 8x - 42 = 2(x^2 - 4x - 21) =$$

$x^2 - 4x - 21$ کا موازنہ $ax^2 + bx + c$ کے ساتھ کرنے سے ac کی حاصل کردہ قیمت:

$$ac = (+1)(-21) = -21$$

21 کے ممکنہ اجزائے ضربی میں سے کارآمد جوڑا -7 اور +3 ہے۔ جس کا

$$\text{مجموعہ} = -7 + 3 = -4, \text{ حاصل ضرب} = (-7)(3) = -21$$

$$\therefore x^2 - 4x - 21$$

$$= x^2 + 3x - 7x - 21$$

$$= x(x + 3) - 7(x + 3)$$

$$= (x + 3)(x - 7)$$

$$\therefore 2x^2 - 8x - 42 = 2(x^2 - 4x - 21) = 2(x + 3)(x - 7)$$

$$(iii) 10x^2 - 41xy + 21y^2$$

اس قسم کے جملوں کی تجزی بھی مذکورہ بالا طریقہ سے کی جاسکتی ہے۔

اس صورت میں ac کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$ac = (10)(21) = 210$$

210 کے ممکنہ اجزائے ضربی میں سے ہمارے لیے کارآمد جوڑا -35 اور -6 پر مشتمل ہے۔ جس کا

$$\text{حاصل ضرب} = (-35)(-6) = 210, \text{ حاصل جمع} = -35 - 6 = -41$$

$$\begin{aligned}
&\therefore 10x^2 - 41xy + 21y^2 \\
&= 10x^2 - 35xy - 6xy + 21y^2 \\
&= 5x(2x - 7y) - 3y(2x - 7y) \\
&= (2x - 7y)(5x - 3y)
\end{aligned}$$

ٹاپ IV درج ذیل اقسام کے جملوں کے تجزی کرنا

$$\begin{aligned}
&(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) + k \\
&(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + k \\
&(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + kx^2
\end{aligned}$$

ان اقسام کے جملوں کی تجزی کرنے کا طریقہ مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح کیا جائے گا۔

مثال 1 تجزی کیجیے۔

$$(x^2 - 4x - 5)(x^2 - 4x - 12) - 144$$

حل فرض کریں $x^2 - 4x = y$

$$(y - 5)(y - 12) - 144 = y^2 - 17y - 84$$

$$= y^2 - 21y + 4y - 84$$

$$= y(y - 21) + 4(y - 21)$$

$$= (y - 21)(y + 4)$$

$$= (x^2 - 4x - 21)(x^2 - 4x + 4) \quad (\because y = x^2 - 4x)$$

$$= (x^2 - 7x + 3x - 21)(x - 2)^2$$

$$= [x(x - 7) + 3(x - 7)](x - 2)^2$$

$$= (x - 7)(x + 3)(x - 2)(x - 2)$$

مثال 2 تجزی کیجیے۔

$$(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) - 120$$

حل ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ $1 + 4 = 2 + 3$

اس سے ہماری توجہ دیے گئے جملے کے درج ذیل گروپ بنانے کی طرف جاتی ہے۔

$$[(x + 1)(x + 4)][(x + 2)(x + 3)] - 120$$

$$= (x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) - 120$$

فرض کریں کہ $x^2 + 5x = y$ ، تب

$$(y + 4)(y + 6) - 120$$

$$= y^2 + 10y + 24 - 120$$

$$\begin{aligned}
&= y^2 + 10y - 96 \\
&= y^2 + 16y - 6y - 96 \\
&= y(y + 16) - 6(y + 16) \\
&= (y + 16)(y - 6) \\
&= (x^2 + 5x + 16)(x^2 + 5x - 6) \quad \dots (\because y = x^2 + 5x) \\
&= (x^2 + 5x + 16)(x + 6)(x - 1)
\end{aligned}$$

مثال 3 تجزی کریں۔

$$(x^2 - 5x + 6)(x^2 + 5x + 6) - 2x^2$$

$$(x^2 - 5x + 6)(x^2 + 5x + 6) - 2x^2$$

حل

$$= [x^2 - 3x - 2x + 6][x^2 + 3x + 2x + 6] - 2x^2$$

$$= [x(x - 3) - 2(x - 3)][x(x + 3) + 2(x + 3)] - 2x^2$$

$$= [(x - 3)(x - 2)][(x + 3)(x + 2)] - 2x^2$$

$$= [(x - 2)(x + 2)][(x - 3)(x + 3)] - 2x^2$$

$$= (x^2 - 4)(x^2 - 9) - 2x^2$$

$$= x^4 - 13x^2 + 36 - 2x^2$$

$$= x^4 - 15x^2 + 36$$

$$= x^4 - 12x^2 - 3x^2 + 36$$

$$= x^2(x^2 - 12) - 3(x^2 - 12)$$

$$= (x^2 - 12)(x^2 - 3)$$

$$= [(x)^2 - (2\sqrt{3})^2][(x)^2 - (\sqrt{3})^2]$$

$$= (x - 2\sqrt{3})(x + 2\sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

ٹائپ V درج ذیل قسم کے جملوں کی تجزی کرنا

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال تجزی کیجیے۔

$$x^3 - 8y^3 - 6x^2y + 12xy^2$$

حل

$$x^3 - 8y^3 - 6x^2y + 12xy^2$$

$$= (x)^3 - (2y)^3 - 3(x)^2(2y) + 3(x)(2y)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (x)^3 - 3(x)^2(2y) + 3(x)(2y)^2 - (2y)^3 \\
&= (x - 2y)^3 \\
&= (x - 2y)(x - 2y)(x - 2y)
\end{aligned}$$

VI ٹاپ $a^3 \pm b^3$ کی قسم کے جملوں کی تجزی کرنا

درج ذیل کلیات کو ذہن میں لائیں۔

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

وضاحت کے لیے درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال 1 $27x^3 + 64y^3$ کی تجزی کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
27x^3 + 64y^3 &= (3x)^3 + (4y)^3 \\
&= (3x + 4y)[(3x)^2 - (3x)(4y) + (4y)^2] \\
&= (3x + 4y)(9x^2 - 12xy + 16y^2)
\end{aligned}$$

مثال 2 $(1 - 125x^3)$ کی تجزی کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
1 - 125x^3 &= (1)^3 - (5x)^3 \\
&= (1 - 5x)[(1)^2 + (1)(5x) + (5x)^2] \\
&= (1 - 5x)(1 + 5x + 25x^2)
\end{aligned}$$

مشق 5.2

درج ذیل جملوں کی تجزی کریں۔

1. (i) $x^4 + \frac{1}{x^4} - 3$ (ii) $3x^4 + 12y^4$ (iii) $a^4 + 3a^2b^2 + 4b^4$
- (iv) $4x^4 + 81$ (v) $x^4 + x^2 + 25$ (vi) $x^4 + 4x^2 + 16$
2. (i) $x^2 + 14x + 48$ (ii) $x^2 - 21x + 108$
- (iii) $x^2 - 11x - 42$ (iv) $x^2 + x - 132$
3. (i) $4x^2 + 12x + 5$ (ii) $30x^2 + 7x - 15$
- (iii) $24x^2 - 65x + 21$ (iv) $5x^2 - 16x - 21$
- (v) $4x^2 - 17xy + 4y^2$ (vi) $3x^2 - 38xy - 13y^2$
- (vii) $5x^2 + 33xy - 14y^2$ (viii) $\left(5x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(5x - \frac{1}{x}\right) + 4, x \neq 0$

4. (i) $(x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) - 3$
(ii) $(x^2 - 4x)(x^2 - 4x - 1) - 20$
(iii) $(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 15$
(iv) $(x + 4)(x - 5)(x + 6)(x - 7) - 504$
(v) $(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6) - 3x^2$

5. (i) $x^3 + 48x - 12x^2 - 64$ (ii) $8x^3 + 60x^2 + 150x + 125$
(iii) $x^3 - 18x^2 + 108x - 216$ (iv) $8x^3 - 125y^3 - 60x^2y + 150xy^2$
6. (i) $27 + 8x^3$ (ii) $125x^3 - 216y^3$
(iii) $64x^3 + 27y^3$ (iv) $8x^3 + 125y^3$

5.2 مسئلہ باقی اور مسئلہ تجزی

5.2.1 (Remainder Theorem) مسئلہ باقی

”اگر کسی کثیررتبی جملے $p(x)$ کو یک درجی جملہ $(x - a)$ پر تقسیم کیا جائے تو $p(a)$ بطور باقی حاصل ہوتا ہے۔“

ثبوت

فرض کریں $p(x)$ کو $(x - a)$ پر تقسیم کرنے سے $q(x)$ بطور حاصل قسمت حاصل ہوتا ہے۔ لیکن تقسیم کنندہ $(x - a)$ کا درجہ ایک ہے اس لیے باقی کا درجہ صفر ہوگا۔ یعنی باقی ایک غیر صفر مستقل مقدار، فرض کریں R ہوگی۔ لہذا علامتی طور پر ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ

$$p(x) = (x - a)q(x) + R$$

یہ مساوات متغیر x کی ہر قیمت کے لیے درست ہے۔ اس لیے بالخصوص $x = a$ کے لیے بھی درست ہوگی۔ نتیجتاً

$$p(a) = (a - a)q(a) + R$$

$$= 0 + R = R$$

$$\text{یا } p(a) = R = (\text{باقی})$$

نوٹ

اگر تقسیم کنندہ $(ax - b)$ ہو تو

$$p(x) = (ax - b)q(x) + R$$

اس مساوات میں $x = \frac{b}{a}$ درج کرنے سے، تاکہ $ax - b = 0$

$$p\left(\frac{b}{a}\right) = 0 \cdot q\left(\frac{b}{a}\right) + R = 0 + R = R$$

پس اگر تقسیم کنندہ جملے کا درجہ ایک ہو تو تقسیم کا لمبا عمل کیے بغیر مندرجہ بالا مسئلہ باقی حاصل کرنے کا ایک مؤثر طریقہ فراہم

کرتا ہے۔

5.2.2 جب کسی کثیررتی جملے کو ایک درجہ والے جملہ پر تقسیم کرنا ہو تو (تقسیم کا عمل کیے بغیر) باقی معلوم کرنا

مثال 1 مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کریں جب $9x^2 - 6x + 2$ کو درج ذیل جملوں پر تقسیم کیا جائے۔

(i) $x - 3$ (ii) $x + 3$ (iii) $3x + 1$ (iv) x

حل فرض کریں کہ $p(x) = 9x^2 - 6x + 2$

(i) مسئلہ باقی کی مدد سے $p(x)$ کو $x - 3$ پر تقسیم کرنے سے،

$$\text{باقی } R = p(3) = 9(3)^2 - 6(3) + 2 = 65$$

(ii) $p(x)$ کو $x + 3 = x - (-3)$ پر تقسیم کرنے سے،

$$\text{باقی } R = p(-3) = 9(-3)^2 - 6(-3) + 2 = 101$$

(iii) $p(x)$ کو $3x + 1$ پر تقسیم کرنے سے،

$$\text{باقی } R = p\left(-\frac{1}{3}\right) = 9\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 6\left(-\frac{1}{3}\right) + 2 = 5$$

(iv) $p(x)$ کو x پر تقسیم کرنے سے،

$$\text{باقی } R = p(0) = 9(0)^2 - 6(0) + 2 = 2$$

مثال 2 اگر جملہ $x^3 + kx^2 + 3x - 4$ کو $x + 2$ پر تقسیم کرنے سے، باقی -2 بچے تو k کی قیمت معلوم کریں۔

حل فرض کریں کہ $p(x) = x^3 + kx^2 + 3x - 4$

$p(x)$ کو $x + 2 = x - (-2)$ پر تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والا باقی، مسئلہ باقی کی رو سے درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} p(-2) &= (-2)^3 + k(-2)^2 + 3(-2) - 4 \\ &= -8 + 4k - 6 - 4 \\ &= 4k - 18 \end{aligned}$$

دی گئی شرط کے مطابق

$$p(-2) = -2 \Rightarrow 4k - 18 = -2 \Rightarrow k = 4$$

5.2.3 کثیررتی جملے کا زیرو (Zero of a Polynomial)

تعریف

اگر کسی کثیررتی جملے $p(x)$ میں متغیر x کی جگہ ایک مخصوص نمبر a درج کرنے سے $p(a) = 0$ حاصل ہو تو

$x = a$ کو کثیررتی $p(x)$ کا زیرو (zero) کہتے ہیں۔

مسئلہ باقی کے ایک بہت کارآمد نتیجہ کو مسئلہ تجزی کہتے ہیں۔

5.2.4 مسئلہ تجزی (Factor Theorem)

(i) "اگر کسی کثیررتی $p(x)$ کے لیے $p(a) = 0$ ہو جائے تو $(x - a)$ کثیررتی کا ایک جزو ضربی ہوتا ہے۔"

(ii) "اس کے برعکس اگر $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $p(a) = 0$ ہوتا ہے۔"

ثبوت

فرض کریں کسی کثیررتی $p(x)$ کو $(x - a)$ پر تقسیم کرنے سے حاصل قسمت $q(x)$ اور باقی R حاصل ہوتا ہے۔

$$پس \quad p(x) = (x - a)q(x) + R$$

لیکن مسئلہ باقی کی رو سے $R = p(a)$

$$اس لیے \quad p(x) = (x - a)q(x) + p(a)$$

(i) اب اگر $p(a) = 0$ ہو تو

$$p(x) = (x - a)q(x)$$

یعنی $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا ایک جزو ضربی ہے۔

(ii) اس کے برعکس، اگر $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $p(x)$ کو $(x - a)$ پر تقسیم کرنے سے باقی صفر کے برابر

ہونا چاہیے۔ یعنی $p(a) = 0$

اس طرح مسئلہ تجزی کا ثبوت مکمل ہو جاتا ہے۔

نوٹ

مسئلہ تجزی کو درج ذیل الفاظ میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

" $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہو گا صرف اور صرف اگر $x = a$ مساوات $p(x) = 0$ کے حل سیٹ کا رکن ہو۔"

مسئلہ تجزی دیے گئے کثیررتی جملوں کے اجزائے ضربی معلوم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ

تجزی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہو گا یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے صرف یہ

معلوم (check) کرنا ہوتا ہے کہ $p(a) = 0$ ہے یا نہیں ہے۔

مثال 1 تعین کریں کہ $(x - 2)$ کثیررتی $x^3 - 4x^2 + 3x + 2$ کا جزو ضربی ہے یا نہیں۔

حل آسانی کی خاطر فرض کریں کہ

$$p(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 2$$

$(x - 2)$ کے لیے حاصل ہونے والا باقی

$$p(2) = (2)^3 - 4(2)^2 + 3(2) + 2$$

$$= 8 - 16 + 6 + 2 = 0$$

لہذا مسئلہ تجزی کی رو سے $(x - 2)$ کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہے۔

مثال 2 تین درجی کثیررتی $p(x)$ معلوم کریں جس کے زیرو $p(x) = 0$ کے حل سیٹ کے ارکان $1, 2$ اور 3 ہیں۔

حل چونکہ $x = 2, -1, 3$ مساوات $p(x) = 0$ کے حل سیٹ کے ارکان ہیں۔

اس لیے مسئلہ تجزی کی رو سے

$(x-2), (x+1)$ اور $(x-3)$ کثیررتی $p(x)$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

$$p(x) = a(x-2)(x+1)(x-3) \text{ پس}$$

جبکہ a کے لیے کوئی بھی غیر صفر قیمت لگائی جاسکتی ہے۔ اگر $a = 1$ لیں تو

$$p(x) = (x-2)(x+1)(x-3)$$

$$= x^3 - 4x^2 + x + 6$$

جو مطلوبہ کثیررتی جملہ ہے۔

مشق 5.3

1- مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے جب

(i) $3x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ کو $(x-2)$ پر تقسیم کیا جائے۔

(ii) $4x^3 - 4x + 3$ کو $(2x-1)$ پر تقسیم کیا جائے۔

(iii) $6x^4 + 2x^3 - x + 2$ کو $(x+2)$ پر تقسیم کیا جائے۔

(iv) $(2x-1)^3 + 6(3+4x)^2 - 10$ کو $(2x+1)$ پر تقسیم کیا جائے۔

(v) $x^3 - 3x^2 + 4x - 14$ کو $(x+2)$ پر تقسیم کیا جائے۔

2- (i) اگر $(x+2)$ کثیررتی $3x^2 - 4kx - 4k^2$ کا بجز و ضربی ہو تو k کی قیمتیں معلوم کریں۔

(ii) اگر $(x-1)$ کثیررتی $x^3 - kx^2 + 11x - 6$ کا بجز و ضربی ہو تو k کی قیمت معلوم کریں۔

3- تقسیم کا عمل کیے بغیر تعین کریں کہ

(i) $(x-2)$ اور $(x-3)$ کثیررتی $p(x) = x^3 - 12x^2 + 44x - 48$ کے اجزائے ضربی ہیں یا نہیں؟

(ii) $(x-2), (x+3)$ اور $(x-4)$ کثیررتی $q(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ کے اجزائے ضربی ہیں یا نہیں؟

4- معلوم کیجیے کہ m کی کس قیمت کے لیے $x+2$ کثیررتی $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ کو پورا پورا تقسیم کرے گا؟

5- k کی کس قیمت کے لیے کثیررتیوں $p(x) = kx^3 + 4x^2 + 3x - 4$ اور $q(x) = x^3 - 4x + k$ کو

$(x-3)$ پر تقسیم کرنے سے یکساں باقی بچے گا۔

6- کثیررتی $p(x) = x^3 + ax^2 + 7$ کو $(x+1)$ پر تقسیم کرنے سے $2b$ باقی بچتا ہے۔ اگر اس کثیررتی کو $(x-2)$ پر تقسیم کرنے سے $(b+5)$ باقی بچے تو a اور b کی قیمت معلوم کریں۔

7- $(x+4)$ کثیررتی $x^3 + lx^2 + mx + 24$ کا بجز و ضربی ہے۔ اگر اس کثیررتی کو $(x-2)$ پر تقسیم کیا جائے تو باقی 36 بچتا ہے۔ l اور m کی قیمتیں معلوم کریں۔

8- کثیررتی $lx^3 + mx^2 - 4$ کو $(x-1)$ اور $(x+2)$ پر تقسیم کرنے سے بالترتیب 3- اور 12 بطور باقی بچیں تو l اور m کی قیمتیں معلوم کریں۔

9- کثیررتی $ax^3 - 9x^2 + bx + 3a$ جملہ $x^2 - 5x + 6$ پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے۔ a اور b کی قیمتیں معلوم کریں۔

5.3 تین درجی کثیررتی جملہ کی تجزی

ہم مسئلہ تجزی کی مدد سے کسی دی گئی تین درجی کثیررتی جملہ کی تجزی کرنے کے عمل کی وضاحت درج ذیل طریقہ سے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ خاص طور پر تین درجی کثیررتی جملہ کی تجزی کے لیے بہت موزوں ہے۔ ہم ایک نہایت کارآمد مسئلہ (بغیر ثابت کیے) بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ (دی ہوئی مساوات کا ناطق حل معلوم کرنا)

فرض کریں کہ

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0, \quad a_0 \neq 0$$

ایک متغیر x میں کثیررتی مساوات ہے جس کا درجہ n ہے اور تمام عددی سر صیح اعداد ہیں۔ اس مساوات کے حل سیٹ کے ارکان میں کوئی ایک رکن ناطق عدد $\frac{p}{q}$ ہوگا اگر P مستقل مقدار a_n کا عا اور q پہلے عددی سر a_0 (کا عددی سر) کا عا ہو۔

مثال مسئلہ تجزی کی مدد سے کثیررتی $x^3 - 4x^2 + x + 6$ کی تجزی معلوم کریں۔

حل فرض کریں دیا گیا کثیررتی جملہ: $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$

$P(x)$ میں مستقل مقدار 6 ہے اور پہلا عددی سر '1' ہے۔

$$6 = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$$

$$1 = \pm 1$$

لہذا مساوات $P(x) = 0$ کے حل سیٹ کے ممکن ارکان درج ذیل میں سے ہوں گے۔

$$\frac{p}{q} = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$$

مسئلہ تجزی کی رو سے اگر $P(x)$ میں $x = a$ درج کرنے سے $P(a) = 0$ ہو تو $(x - a)$ کثیررتبی $P(x)$ کا جڑ و ضربی ہوگا۔

اب ہم $\frac{P}{q}$ کے ہر عا کو باری باری چیک کریں گے کہ x کی جگہ درج کرنے سے $P(a) = 0$ ہوگا یا نہیں۔
سعی اور خطا طریقہ سے $x = 1$ کے لیے کوشش کرنے سے

$$P(1) = (1)^3 - 4(1)^2 + 1 + 6 \\ = 1 - 4 + 1 + 6 = 4 \neq 0$$

لہذا $x - 1$ کثیررتبی $P(x)$ کا جڑ و ضربی نہیں ہے۔

اب $x = -1$ کے لیے کوشش کرنے سے

$$P(-1) = (-1)^3 - 4(-1)^2 - 1 + 6 \\ = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$$

لہذا $x - (-1) = (x + 1)$ کثیررتبی $P(x)$ کا جڑ و ضربی ہے۔

علاوہ ازیں $x = 2$ کے لیے کوشش کرنے سے

$$P(2) = (2)^3 - 4(2)^2 + 2 + 6 \\ = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$$

لہذا $(x - 2)$ کثیررتبی $P(x)$ کا دوسرا جڑ و ضربی ہے۔

$$P(3) = (3)^3 - 4(3)^2 + 3 + 6 \\ = 27 - 36 + 3 + 6 = 0$$

اسی طرح

لہذا $(x - 3)$ کثیررتبی $P(x)$ کا تیسرا جڑ و ضربی ہے۔

پس تجزی کی شکل میں

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6 \\ = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$$

مشق 5.4

مسئلہ تجزی کی مدد سے درج ذیل تین درجی کثیررتبی جملوں کی تجزی کیجیے۔

1. $x^3 - 2x^2 - x + 2$

2. $x^3 - x^2 - 22x + 40$

3. $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

4. $x^3 + x^2 - 10x + 8$

5. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

6. $x^3 + 5x^2 - 2x - 24$

7. $3x^3 - x^2 - 12x + 4$

8. $2x^3 + x^2 - 2x - 1$

اعادہ مشق 5

دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ -1

(i) $x^2 - 5x + 6$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

(a) $x + 1, x - 6$

(b) $x - 2, x - 3$

(c) $x + 6, x - 1$

(d) $x + 2, x + 3$.

(ii) $8x^3 + 27y^3$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

(a) $(2x + 3y), (4x^2 + 9y^2)$

(b) $(2x - 3y), (4x^2 - 9y^2)$

(c) $(2x + 3y), (4x^2 - 6xy + 9y^2)$

(d) $(2x - 3y), (4x^2 + 6xy + 9y^2)$

(iii) $3x^2 - x - 2$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

(a) $(x + 1), (3x - 2)$

(b) $(x + 1), (3x + 2)$

(c) $(x - 1), (3x - 2)$

(d) $(x - 1), (3x + 2)$

(iv) $a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

(a) $(a - b), (a + b), (a^2 + 4b^2)$

(b) $(a^2 - 2b^2), (a^2 + 2b^2)$

(c) $(a - b), (a + b), (a^2 - 4b^2)$

(d) $(a - 2b), (a^2 + 2b^2)$

(v) $9a^2 - 12ab$ کو کامل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟

(a) $-16b^2$

(b) $16b^2$

(c) $4b^2$

(d) $-4b^2$

(vi) m کی کس قیمت کے لیے $x^2 + 4x + m$ کامل مربع بن جائے گا؟

(a) 8

(b) -8

(c) 4

(d) 16

(vii) $5x^2 - 17xy - 12y^2$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

(a) $(x + 4y), (5x + 3y)$

(b) $(x - 4y), (5x - 3y)$

(c) $(x - 4y), (5x + 3y)$

(d) $(5x - 4y), (x + 3y)$

(viii) $27x^3 - \frac{1}{x^3}$ کے اجزائے ضربی ہیں۔

(a) $\left(3x - \frac{1}{x}\right), \left(9x^2 + 3 + \frac{1}{x^2}\right)$

(b) $\left(3x + \frac{1}{x}\right), \left(9x^2 + 3 + \frac{1}{x^2}\right)$

(c) $\left(3x - \frac{1}{x}\right), \left(9x^2 - 3 + \frac{1}{x^2}\right)$

(d) $\left(3x + \frac{1}{x}\right), \left(9x^2 - 3 + \frac{1}{x^2}\right)$

2- تکمیلی سوالات۔ خالی جگہ اس طرح پُر کیجیے کہ بیان درست ہو۔

(i) $x^2 + 5x + 6 = \dots\dots\dots$

(ii) $4a^2 - 16 = \dots\dots\dots$

(iii) $4a^2 + 4ab + \dots\dots\dots$ ایک کامل مربع ہے

(iv) $\frac{x^2}{y^2} - 2 + \frac{y^2}{x^2} = \dots\dots\dots$

(v) $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = \dots\dots\dots$

(vi) $x^4 - 16 = \dots\dots\dots$ کی تجزی

(vii) اگر $(x-2)$ کثیررتی $p(x) = x^2 + 2kx + 8$ کا جُز و ضربی ہو تو $k = \dots\dots\dots$

3- مندرجہ ذیل جملوں کی تجزی کیجیے۔

(i) $x^2 + 8x + 16 - 4y^2$

(ii) $4x^2 - 16y^2$

(iii) $9x^2 + 27x + 8$

(iv) $1 - 64z^3$

(v) $8x^3 - \frac{1}{27y^3}$

(vi) $2y^2 + 5y - 3$

(vii) $x^3 + x^2 - 4x - 4$

(viii) $25m^2n^2 + 10mn + 1$

(ix) $1 - 12pq + 36p^2q^2$

خلاصہ

☆ اگر کسی کثیررتی جملے کو کچھ دوسرے کثیررتی جملوں کے حاصل ضرب کے طور پر لکھا جائے تو ان جملوں میں سے ہر ایک کو دیے گئے جملے کا جُز و ضربی کہتے ہیں۔

☆ کسی الجبری جملے کو اس کے اجزائے ضربی کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھنے کے عمل کو تجزی کہتے ہیں۔ ہم نے مندرجہ ذیل قسم کے جملوں کی تجزی کرنا سیکھا۔

- $ka + kb + kc$
- $ac + ad + bc + bd$
- $a^2 \pm 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2$
- $(a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2$

- $a^4 + a^2b^2 + b^4$ یا $a^4 + 4b^4$
- $x^2 + px + q$
- $ax^2 + bx + c$
- $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) + k$
- $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + k$
- $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + kx^2$
- $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $a^3 \pm b^3$

☆ اگر کثیررتی جملے $p(x)$ کو $(x - a)$ پر تقسیم کیا جائے تو $p(a)$ بطور باقی حاصل ہوتا ہے۔

☆ اگر کسی کثیررتی $p(x)$ میں متغیر x کی جگہ کوئی خاص نمبر $x = a$ درج کرنے سے $p(a) = 0$ ہو جائے تو $x = a$ کو

کثیررتی $p(x)$ کا زیرو کہتے ہیں۔

☆ اگر $p(a) = 0$ ہو تو $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہوتا ہے۔ برعکس اس کے اگر $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $p(a) = 0$ ہوگا۔

مسئلہ تجزی کی مدد سے تین درجی کثیررتی جملوں کی تجزی کی ہے۔

یونٹ 6

الجبری جملوں کا ذواضعاف اقل، عاِدِ اعظم اور جذر المربع (ALGEBRAIC MANIPULATION)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

6.1 بڑے سے بڑا مشترک جزو ضربی اور چھوٹے سے چھوٹا مشترک حاصل ضربی

(Highest Common Factor and Least Common Multiple)

6.2 الجبری کسروں کے بنیادی عوامل (Basic Operations on Algebraic Fractions)

6.3 الجبری جملے کا جذر المربع (Square Root of Algebraic Expression)

یونٹ میں طلباء کے سیکھنے کے اہم وسیع ترما حاصل نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت تک نامکمل سمجھا جائے گا جب تک ہر طالب علم درج ذیل تصورات کو ہو بہو بیان کرنے پر علمی دسترس حاصل نہ کرے۔

☆ دو یا دو سے زیادہ الجبری جملوں کا بڑے سے بڑا مشترک جزو ضربی یعنی عاِدِ اعظم (H.C.F.) اور چھوٹے سے چھوٹا مشترک حاصل ضربی یعنی ذواضعاف اقل (L.C.M.) معلوم کرنا۔

☆ ذواضعاف اقل اور عاِدِ اعظم کو بذریعہ تجزی یا بذریعہ تقسیم معلوم کرنا۔

☆ ذواضعاف اقل اور عاِدِ اعظم کے درمیان تعلق کو جاننا۔

☆ حقیقی عملی زندگی کے مسائل کو ذواضعاف اقل اور عاِدِ اعظم سے مناسبت قائم کرنا اور ان کو حل کرنا۔

☆ عاِدِ اعظم اور ذواضعاف اقل کی مدد سے کسری جملوں کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے عوامل کی مدد سے مختصر کرنا۔

☆ دیے ہوئے الجبری جملوں کا بذریعہ تجزی اور بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کرنا۔

تعارف (Introduction)

اس یونٹ میں ہم پہلے الجبری جملوں کے عاوا عظم اور ذواضعاف اقل بذریعہ تجزی اور بذریعہ تقسیم معلوم کریں گے۔ اس کے بعد عاوا عظم اور ذواضعاف اقل کی مدد سے کسری جملوں کا اختصار کرنا سیکھیں گے۔

یونٹ کے آخری حصہ میں ہم الجبری جملوں کے جذرا المربع کو معلوم کرنے کو زیر بحث بھی لائیں گے۔

6.1 الجبری جملوں کا عاوا عظم اور ذواضعاف اقل

(H.C.F. and L.C.M. of Algebraic Expressions)

6.1.1 (a) عاوا عظم (H.C.F.)

اگر دو یا دو سے زیادہ الجبری جملے دیے گئے ہوں تو ان کے مشترک اجزائے ضربی کی بڑی سے بڑی قوت کو دیے ہوئے جملوں کا عاوا عظم کہا جاتا ہے۔

(b) ذواضعاف اقل (L.C.M.)

ایک الجبری جملہ $p(x)$ اگر دیے ہوئے دو یا دو سے زیادہ جملوں سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہو اور ان کے مشترک اور غیر مشترک اجزائے ضربی کا چھوٹے سے چھوٹا حاصل ضرب ہو تو $p(x)$ ان جملوں کا ذواضعاف اقل کہلاتا ہے۔

6.1.2 (a) عاوا عظم (H.C.F.) معلوم کرنا۔

دیے ہوئے جملوں کا عاوا عظم مندرجہ ذیل دو طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

(i) بذریعہ تجزی (ii) بذریعہ تقسیم

بعض دفعہ بذریعہ تجزی عاوا عظم معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عاوا عظم کو تقسیم کے طریقہ سے

حاصل کر لیتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں کی ہم مثالوں کی مدد سے وضاحت کرتے ہیں۔

(i) عاوا عظم بذریعہ تجزی معلوم کرنا

مثال کثیرتی جملوں $x^2 - 4$, $x^2 + 4x + 4$, $2x^2 + x - 6$ کا عاوا عظم معلوم کریں۔

حل جملوں کی تجزی کرنے سے

$$x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$$

$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$$

$$2x^2 + x - 6 = 2x^2 + 4x - 3x - 6 = 2x(x + 2) - 3(x + 2)$$

$$= (x + 2)(2x - 3)$$

پس بڑے سے بڑا مشترک جزو ضربی یعنی عاوا عظم $x + 2$ ہے۔

(ii) عاوا عظم بذریعہ تقسیم معلوم کرنا

مثال کثیرتی $p(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 8$ اور $q(x) = x^3 - 7x + 6$ کا بذریعہ تقسیم عاوا عظم معلوم کریں۔

حل

$$\begin{array}{r} 1 \\ x^3 - 7x + 6 \overline{) x^3 - 7x^2 + 14x - 8} \\ \underline{\pm x^3 \quad \mp 7x \pm 6} \\ -7x^2 + 21x - 14 \\ \underline{= -7(x^2 - 3x + 2)} \end{array}$$

باقی کثیرتی کا جزو ضربی -7 چونکہ دونوں کثیرتیوں میں مشترک نہیں اس لیے ہم -7 کو تقسیم کے عمل سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔

چونکہ

$$\begin{array}{r} x + 3 \\ x^2 - 3x + 2 \overline{) x^3 + 0x^2 - 7x + 6} \\ \underline{\pm x^3 \mp 3x^2 \pm 2x} \\ 3x^2 - 9x + 6 \\ \underline{\pm 3x^2 \mp 9x \pm 6} \\ 0 \end{array}$$

پس $p(x)$ اور $q(x)$ کا عاوا عظم $x^2 - 3x + 2$ ہے۔

مشاہدہ کریں کہ

(i) بذریعہ تقسیم عاوا عظم معلوم کرنے کے دوران ضرورت پڑنے پر کسی بھی مناسب عدد سے ضرب دی جا

سکتی ہے۔

(ii) اگر دی ہوئی کثیرتی کی تعداد تین ہو تو پہلے دو کا عاوا عظم معلوم کرنے کے بعد حاصل عاوا عظم اور تیسری

کثیرتی کا عاوا عظم مطلوبہ عاوا عظم ہوگا۔

(b) بذریعہ تجزی ذواضعاف اقل معلوم کرنا

دیے ہوئے الجبری جملوں کا ذواضعاف اقل معلوم کرنے کا عملی قانون

(i) دیے ہوئے جملوں کی سادہ ترین حد تک مکمل تجزی کیجیے۔

(ii) ذواضعاف اقل چونکہ ہر جملہ کے اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔ اس میں اجزائے ضربی کی قوت نمائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔

مثال $p(x) = 12(x^3 - y^3)$ اور $q(x) = 8(x^3 - xy^2)$ کا ذواضعاف معلوم کیجیے۔
حل جملوں کی تجزی کی مدد سے ہم حاصل کرتے ہیں:

$$p(x) = 12(x^3 - y^3) = 2^2 \times 3 \times (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$q(x) = 8(x^3 - xy^2) = 8x(x^2 - y^2)$$

$$= 2^3 x(x + y)(x - y)$$

پس $p(x)$ اور $q(x)$ کا ذواضعاف اقل

$$= 2^3 \times 3 \times x(x + y)(x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$= 24x(x + y)(x^3 - y^3)$$

6.1.3 عاوا عظم اور ذواضعاف اقل کے درمیان تعلق

مثال بذریعہ تجزی $p(x) = 12(x^5 - x^4)$ اور $q(x) = 8(x^4 - 3x^3 + 2x^2)$

(i) عاوا عظم (ii) ذواضعاف اقل

معلوم کریں۔

حل پہلے ہم $p(x)$ اور $q(x)$ کی تجزی کرتے ہیں۔ جیسا کہ

$$p(x) = 12(x^5 - x^4) = 12x^4(x - 1) = 2^2 \times 3 \times x^4(x - 1)$$

$$q(x) = 8(x^4 - 3x^3 + 2x^2) = 8x^2(x^2 - 3x + 2)$$

$$= 2^3 x^2(x - 1)(x - 2)$$

$$\text{عاوا عظم} = 2^2 x^2(x - 1) = 4x^2(x - 1)$$

$$\text{ذواضعاف اقل} = 2^3 \times 3 \times x^4(x - 1)(x - 2)$$

مشاہدہ کرتے ہیں کہ

$$p(x)q(x) = 12x^4(x - 1) \times 8x^2(x - 1)(x - 2)$$

$$= 96x^6(x - 1)^2(x - 2) \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{عاوا عظم} \times (\text{ذواضعاف اقل}) = [2^3 \times 3 \times x^4(x - 1)(x - 2)] [4x^2(x - 1)]$$

$$= [24x^4(x - 1)(x - 2)] [4x^2(x - 1)]$$

$$= 96x^6(x - 1)^2(x - 2) \dots\dots\dots(ii)$$

(i) اور (ii) سے واضح ہوتا ہے کہ

$$p(x) \times q(x) = (\text{ذواضعاف اقل}) \times (\text{عادِ اعظم})$$

یعنی

اگر $p(x)$ اور $q(x)$ دو الجبری جملے ہوں اور ان کا عادِ اعظم یا ذواضعاف اقل معلوم ہو تو فارمولا کی مدد سے ذواضعاف اقل یا عادِ اعظم بھی معلوم کر لیتے ہیں۔

جیسا کہ

$$\text{ذواضعاف اقل} = \frac{p(x) \times q(x)}{\text{عادِ اعظم}} \quad \text{I}$$

$$\text{عادِ اعظم} = \frac{p(x) \times q(x)}{\text{ذواضعاف اقل}} \quad \text{II}$$

$$p(x) = \frac{\text{ذواضعاف اقل} \times \text{عادِ اعظم}}{q(x)} \quad \text{III}$$

$$q(x) = \frac{\text{ذواضعاف اقل} \times \text{عادِ اعظم}}{p(x)} \quad \text{IV}$$

نوٹ

ذواضعاف اقل اور عادِ اعظم الگ الگ ہوتے ہیں ماسوائے جُز و ضربی (-1) ہو۔

مثال 1 دو کثیررتی $p(x) = 20(2x^3 + 3x^2 - 2x)$ اور $q(x) = 9(5x^4 + 40x)$ کا عادِ اعظم معلوم کریں۔
فارمولا (I) کی مدد سے ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

حل $p(x)$ اور $q(x)$ کا تجزیہ کی مدد سے عادِ اعظم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} p(x) &= 20(2x^3 + 3x^2 - 2x) = 20x(2x^2 + 3x - 2) \\ &= 20x(2x^2 + 4x - x - 2) = 20x[2x(x + 2) - (x + 2)] \\ &= 20x(x + 2)(2x - 1) = 2^2 \times 5 \times x(x + 2)(2x - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(x) &= 9(5x^4 + 40x) = 45x(x^3 + 8) \\ &= 45x(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = 5 \times 3^2 \times x(x + 2)(x^2 - 2x + 4) \end{aligned}$$

$$\text{عادِ اعظم} = 5x(x + 2) \quad \text{پس}$$

$$\text{زواضعاف اقل} = \frac{[20x(x+2)(2x-1)] [45x(x+2)(x^2-2x+4)]}{5x(x+2)}$$

$$\begin{aligned} \text{زواضعاف اقل} &= 4 \times 5 \times 9 \times x(x+2)(2x-1)(x^2-2x+4) \\ &= 180x(x+2)(2x-1)(x^2-2x+4) \end{aligned}$$

مثال 2 $p(x) = 6x^3 - 7x^2 - 27x + 8$ اور $q(x) = 6x^3 + 17x^2 + 9x - 4$ کا زواضعاف اقل معلوم کیجیے۔

حل بذریعہ تقسیم پہلے ہم $p(x)$ اور $q(x)$ کا عاوا عظم معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 6x^3 - 7x^2 - 27x + 8 \quad \left) \quad 6x^3 + 17x^2 + 9x - 4 \\ \underline{\pm 6x^3 \mp 7x^2 \mp 27x \pm 8} \\ 24x^2 + 36x - 12 \\ \underline{= 12(2x^2 + 3x - 1)} \end{array}$$

جزو ضربی 12 کو نظر انداز کرنے کے بعد کا عمل تقسیم

$$\begin{array}{r} 3x - 8 \\ 2x^2 + 3x - 1 \quad \left) \quad 6x^3 - 7x^2 - 27x + 8 \\ \underline{\pm 6x^3 \pm 9x^2 \mp 3x} \\ -16x^2 - 24x + 8 \\ \underline{\mp 16x^2 \mp 24x \pm 8} \\ 0 \end{array}$$

پس $p(x)$ اور $q(x)$ کا عاوا عظم $2x^2 + 3x - 1$ ہے۔

فارمولا (I) کی مدد سے

$$\text{زواضعاف اقل} = \frac{p(x) \times q(x)}{\text{عاوا عظم}}$$

$$\begin{aligned} \text{ذواضعاف اقل} &= \frac{(6x^3 - 7x^2 - 27x + 8)(6x^3 + 17x^2 + 9x - 4)}{2x^2 + 3x - 1} \\ &= \frac{6x^3 - 7x^2 - 27x + 8}{2x^2 + 3x - 1} \times (6x^3 + 17x^2 + 9x - 4) \\ &= (3x - 8)(6x^3 + 17x^2 + 9x - 4) \end{aligned}$$

جو مطلوبہ ذواضعاف اقل ہے۔

6.1.4 عاِدِ اعظم اور ذواضعاف اقل کا استعمال

مثال دیے ہوئے دو اعداد کا مجموعہ 120 ہے اور ان کا عاِدِ اعظم 12 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔
حل فرض کیجیے دو اعداد $12x$ اور $12y$ ہیں (کیونکہ x اور y کا عاِدِ اعظم 1 ہے)
 مثال کی شرائط کے مطابق

$$12x + 12y = 120$$

$$\Rightarrow x + y = 10$$

ایسے قدرتی اعداد کے جوڑے جن کا مجموعہ 10 ہے:

(1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5) ہیں۔

(1, 9) اور (3, 7) مطلوبہ اعداد کے جوڑے ہیں جن کا عاِدِ اعظم 1 ہے اور مثال کی شرائط پوری کرتے ہیں۔

پس مطلوبہ اعداد 1×12 , 9×12 ; 3×12 , 7×12 ہیں۔

یعنی 12, 108 اور 36, 84

مشق 6.1

1- مندرجہ ذیل جملوں کا عاِدِ اعظم معلوم کیجیے۔

(i) $39x^7y^3z$, $91x^5y^6z^7$ (ii) $102xy^2z$, $85x^2yz$, $187xyz^2$

2- مندرجہ ذیل جملوں کا عاِدِ اعظم بذریعہ تجزی معلوم کریں۔

(i) $x^2 + 5x + 6$, $x^2 - 4x - 12$

(ii) $x^3 - 27$, $x^2 + 6x - 27$, $2x^2 - 18$

(iii) $x^3 - 2x^2 + x$, $x^2 + 2x - 3$, $x^2 + 3x - 4$

(iv) $18(x^3 - 9x^2 + 8x)$, $24(x^2 - 3x + 2)$

(v) $36(3x^4 + 5x^3 - 2x^2)$, $54(27x^4 - x)$

3- مندرجہ ذیل کا بذریعہ تقسیم عاواً عظیم معلوم کریں

(i) $x^3 + 3x^2 - 16x + 12$, $x^3 + x^2 - 10x + 8$

(ii) $x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 3$, $5x^3 + 3x^2 - 17x + 6$

(iii) $2x^5 - 4x^4 - 6x$, $x^5 + x^4 - 3x^3 - 3x^2$

4- مندرجہ ذیل جملوں کا ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

(i) $39x^7y^3z$, $91x^5y^6z^7$ (ii) $102xy^2z$, $85x^2yz$, $187xyz^2$

5- بذریعہ تجزی مندرجہ ذیل جملوں کا ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

(i) $x^2 - 25x + 100$, $x^2 - x - 20$

(ii) $x^2 + 4x + 4$, $x^2 - 4$, $2x^2 + x - 6$

(iii) $2(x^4 - y^4)$, $3(x^3 + 2x^2y - xy^2 - 2y^3)$

(iv) $4(x^4 - 1)$, $6(x^3 - x^2 - x + 1)$

6- k کی کس قیمت کے لیے $(x + 4)$ عاواً عظیم ہے جملوں $x^2 + x - (2k + 2)$ اور $2x^2 + kx - 12$ کا؟

7- اگر $p(x) = (x + 3)(2x^2 - 3x + k)$ اور $q(x) = (x - 2)(3x^2 + 7x - 1)$ کا عاواً عظیم $(x - 2)$

$(x + 3)$ ہو تو k اور l کی قیمت معلوم کریں۔

8- اگر دو کثیررتی $p(x)$ اور $q(x)$ کا ذواضعاف اقل $2(x^4 - 1)$ اور عاواً عظیم $(x + 1)(x^2 + 1)$ ہو۔

اور $p(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ تو $q(x)$ معلوم کریں۔

9- اگر $p(x) = 10(x^2 - 9)(x^2 - 3x + 2)$ اور $q(x) = 10x(x + 3)(x - 1)^2$ اور ان کا عاواً عظیم

$10(x + 3)(x - 1)$ ہو تو ذواضعاف اقل معلوم کیجیے۔

10- اگر دو کثیررتی کے عاواً عظیم اور ذواضعاف اقل کا حاصل ضرب $(x + 5)(x - 2)(x + 3)^2$ ہو اور ایک کثیررتی

$(x - 2)(x + 3)$ اور دوسری $x^2 + kx + 15$ ہو تو k کی قیمت معلوم کریں۔

11- وقاص کی خواہش ہے کہ 128 کیلے اور 176 چند بچوں میں سب برابر برابر تقسیم کرے۔ بتائیے وقاص زیادہ سے زیادہ

کتنے بچوں میں تقسیم کر سکتا ہے؟

6.2 الجبری کسور کے بنیادی عوامل (Basic Operations on Algebraic Fractions)

ہم اب الجبری کسور پر بنیادی عوامل جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کا عمل کریں گے۔ جو ہم مثالوں سے واضح کریں گے اور فرض کریں گے کہ تمام کسور باعمل ہیں۔

مثال 1 مندرجہ ذیل کا اختصار کیجیے۔

$$\frac{x+3}{x^2-3x+2} + \frac{x+2}{x^2-4x+3} + \frac{x+1}{x^2-5x+6}$$

حل

$$\begin{aligned} & \frac{x+3}{x^2-3x+2} + \frac{x+2}{x^2-4x+3} + \frac{x+1}{x^2-5x+6} \\ &= \frac{x+3}{x^2-2x-x+2} + \frac{x+2}{x^2-3x-x+3} + \frac{x+1}{x^2-3x-2x+6} \\ &= \frac{x+3}{x(x-2)-1(x-2)} + \frac{x+2}{x(x-3)-1(x-3)} + \frac{x+1}{x(x-3)-2(x-3)} \\ &= \frac{x+3}{(x-2)(x-1)} + \frac{x+2}{(x-3)(x-1)} + \frac{x+1}{(x-3)(x-2)} \\ &= \frac{(x+3)(x-3) + (x+2)(x-2) + (x+1)(x-1)}{(x-1)(x-2)(x-3)} \\ &= \frac{x^2-9+x^2-4+x^2-1}{(x-1)(x-2)(x-3)} \\ &= \frac{3x^2-14}{(x-1)(x-2)(x-3)} \end{aligned}$$

مثال 2 $\frac{x^3-8}{x^2-4} \times \frac{x^2+6x+8}{x^2-2x+1}$ کو سادہ ترین الجبری جملہ میں مختصر کریں۔

حل مکمل تجزی سے ہم حاصل کرتے ہیں:

$$\frac{x^3-8}{x^2-4} \times \frac{x^2+6x+8}{x^2-2x+1} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4) \times (x+2)(x+4)}{(x-2)(x+2) \times (x-1)^2}$$

شارکنندہ کے اجزائے ضربی $(x-2)$ ، (x^2+2x+4) ، $(x+2)$ اور $(x+4)$ ہیں اور مخرج کے اجزائے ضربی

$(x-2)$ ، $(x+2)$ اور $(x-1)^2$ ہیں۔ ان کا عاوا عظم $(x-2)(x+2)$ ہے۔

$$= \frac{(x^2 + 2x + 4)(x + 4)}{(x - 1)^2} \text{ (عادا عظم پر تقسیم کرنے سے)}$$

مثال 3

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 9} \text{ کو } \frac{x^3 - 1}{x^2 - 4x + 3} \text{ پر تقسیم کریں اور سادہ ترین کسر میں ظاہر کریں۔}$$

حل

$$\begin{aligned} \text{حاصل تقسیم} &= \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 9} \div \frac{x^3 - 1}{x^2 - 4x + 3} \\ &= \frac{(x^2 + x + 1)}{(x^2 - 9)} \times \frac{(x^2 - 4x + 3)}{(x^3 - 1)} \\ &= \frac{(x^2 + x + 1)(x^2 - x - 3x + 3)}{(x^2 - 9)(x^3 - 1)} \\ &= \frac{(x^2 + x + 1)(x - 3)(x - 1)}{(x + 3)(x - 3)(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{1}{x + 3} \end{aligned}$$

مطلوبہ اختصار ہے۔

مشق 6.2

مندرجہ ذیل کو ناطق جملوں میں مختصر کریں۔

$$1. \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9} + \frac{x^2 + 2x - 24}{x^2 - x - 12}$$

$$2. \left[\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} - \frac{4x}{x^2+1} + \frac{4x}{x^4-1} \right]$$

$$3. \frac{1}{x^2 - 8x + 15} + \frac{1}{x^2 - 4x + 3} - \frac{2}{x^2 - 6x + 5}$$

$$4. \frac{(x+2)(x+3)}{x^2-9} + \frac{(x+2)(2x^2-32)}{(x-4)(x^2-x-6)}$$

$$5. \frac{x+3}{2x^2+9x+9} + \frac{1}{2(2x-3)} - \frac{4x}{4x^2-9}$$

$$6. \quad A - \frac{1}{A}, \text{ جب کہ } A = \frac{a+1}{a-1}$$

$$7. \quad \left[\frac{x-1}{x-2} + \frac{2}{2-x} \right] - \left[\frac{x+1}{x+2} + \frac{4}{4-x^2} \right]$$

$$8. \quad \text{کون سا ناطق جملہ } \frac{2x^2+2x-7}{x^2+x-6} \text{ سے تفریق کرنے سے حاصل تفریق } \frac{x-1}{x-2} \text{ حاصل کرتے ہیں؟}$$

ظاہر کیے گئے عوامل کے عمل کرنے سے سادہ ترین جملہ میں مختصر کیجیے۔

$$9. \quad \frac{x^2+x-6}{x^2-x-6} \times \frac{x^2-4}{x^2-9}$$

$$10. \quad \frac{x^3-8}{x^2-4} \times \frac{x^2+6x+8}{x^2-2x+1}$$

$$11. \quad \frac{x^4-8x}{2x^2+5x-3} \times \frac{2x-1}{x^2+2x+4} \times \frac{x+3}{x^2-2x}$$

$$12. \quad \frac{2y^2+7y-4}{3y^2-13y+4} \div \frac{4y^2-1}{6y^2+y-1}$$

$$13. \quad \left[\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} - \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \right] \div \left[\frac{x+y}{x-y} - \frac{x-y}{x+y} \right]$$

6.3 الجبری جملوں کا جذر المربع (Square Root of Algebraic Expressions)

6.3.1 تعریف

نمبرز کے جذر المربع کی طرح ہم دیے ہوئے الجبری جملے $p(x)$ کے جذر المربع کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ $p(x)$ ایک

$$\text{دوسرے جملہ } q(x) \text{ کا جذر المربع ہوگا اگر } q(x) \times q(x) = p(x)$$

جیسا کہ اگر $5 \times 5 = 25$ ہو تو 25 کا جذر المربع 5 ہوتا ہے۔

یعنی کسی بھی ایسے الجبری جملے $p(x)$ کا جذر المربع معلوم کر سکتے ہیں جو ایک مکمل مربع ہو یا مربع میں ظاہر کیا جاسکے۔

یونٹ کے اس حصہ میں الجبری جملوں کے جذر المربع معلوم کرنا سیکھیں گے۔

(i) بذریعہ تجزی

(ii) بذریعہ تقسیم

مثال 1 بذریعہ تجزی الجبری جملے $4x^2 - 12x + 9$ کا جذر المربع معلوم کیجیے۔

حل

$$\begin{aligned} 4x^2 - 12x + 9 &= 4x^2 - 6x - 6x + 9 \\ &= 2x(2x - 3) - 3(2x - 3) \\ &= (2x - 3)(2x - 3) \\ &= (2x - 3)^2 \end{aligned}$$

$$\sqrt{4x^2 - 12x + 9} = \pm (2x - 3) \text{ پس}$$

مثال 2 بذریعہ تجزی الجبری جملے $x^2 + \frac{1}{x^2} + 12\left(x + \frac{1}{x}\right) + 38$ کا جذر المربع معلوم کیجیے۔ جبکہ $x \neq 0$

حل

$$\text{جملہ } x^2 + \frac{1}{x^2} + 12\left(x + \frac{1}{x}\right) + 38$$

$$= x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 + 12\left(x + \frac{1}{x}\right) + 36 \quad \text{نمبر 2 کو جمع اور تفریق کرنے سے}$$

$$= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 2\left(x + \frac{1}{x}\right)(6) + (6)^2$$

$$= \left[\pm \left(x + \frac{1}{x} + 6\right) \right]^2; \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad \text{چونکہ}$$

$$\text{پس مطلوبہ جذر المربع } \pm \left(x + \frac{1}{x} + 6\right) \text{ ہے۔}$$

(ii) بذریعہ تقسیم

بعض حالات میں دیے ہوئے الجبری جملہ کو تجزی کی مدد سے مکمل مربع میں تبدیل کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں دیے ہوئے جملہ کا جذر المربع عام تقسیم کے طریقہ سے معلوم کر لیتے ہیں۔ تقسیم کا طریقہ وہی ہے جو ہم نمبر 2 کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔

نوٹ

تقسیم کے عمل سے پہلے ہم دیے ہوئے جملہ کو متغیر x کی قوت نما کو نزولی ترتیب میں تبدیل کر لیتے ہیں۔

مثال 1 الجبری جملہ $4x^4 + 12x^3 + x^2 - 12x + 4$ کا جذر المربع بذریعہ تقسیم معلوم کیجیے۔

حل چونکہ دیا ہوا الجبری جملہ x کی مطلوبہ قوت نمائی ترتیب نزولی میں موجود ہے۔ اس لیے اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔
اب جملہ کی پہلی رقم کا جذر المربع حاصل کیا۔ یعنی $\sqrt{4x^4} = 2x^2$ سے تقسیم کا عمل شروع کیا تو پہلا حاصل قسمت بھی $2x^2$ ہی ہوگا۔ اگلے ہر قدم پر باقی تمام رقموں کو شامل کر کے اسی عمل کو دہراتے جانے سے مطلوبہ جذر المربع حاصل کر لیں گے:

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 3x - 2 \\ 2x^2 \overline{) 4x^4 + 12x^3 + x^2 - 12x + 4} \\ \underline{\pm 4x^4} \\ 4x^2 + 3x \overline{) 12x^3 + x^2 - 12x + 4} \\ \underline{\pm 12x^3 \pm 9x^2} \\ 4x^2 + 6x - 2 \overline{) -8x^2 - 12x + 4} \\ \underline{\pm 8x^2 \pm 12x \pm 4} \\ 0 \end{array}$$

پس دیے ہوئے جملہ کا جذر المربع $\pm(2x^2 + 3x - 2)$ ہے۔

مثال 2 بذریعہ تقسیم الجبری جملہ $4\frac{x^2}{y^2} + 8\frac{x}{y} + 16 + 12\frac{y}{x} + 9\frac{y^2}{x^2}$ کا جذر المربع معلوم کیجیے۔

حل چونکہ جملہ میں x کی قوت نمائی ترتیب میں ہے اور پہلی رقم کا جذر المربع $\sqrt{4\frac{x^2}{y^2}} = 2\frac{x}{y}$ ہے اس لیے عمومی تقسیمی طریقہ سے جذر المربع معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2\frac{x}{y} + 2 + 3\frac{y}{x} \\ 2\frac{x}{y} \overline{) 4\frac{x^2}{y^2} + 8\frac{x}{y} + 16 + 12\frac{y}{x} + 9\frac{y^2}{x^2}} \\ \underline{\pm 4\frac{x^2}{y^2}} \phantom{+ 8\frac{x}{y} + 16 + 12\frac{y}{x} + 9\frac{y^2}{x^2}} \\ 4\frac{x}{y} + 2 \phantom{+ 3\frac{y}{x}} \overline{) 8\frac{x}{y} + 16 + 12\frac{y}{x} + 9\frac{y^2}{x^2}} \\ \underline{\pm 8\frac{x}{y} \pm 4} \phantom{+ 12\frac{y}{x} + 9\frac{y^2}{x^2}} \\ 12 + 12\frac{y}{x} + 9\frac{y^2}{x^2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 4\frac{x}{y} + 4 + 3\frac{y}{x} \quad \left) \quad 12 + 12\frac{y}{x} + 9\frac{y^2}{x^2} \\
 \underline{\pm 12 \pm 12\frac{y}{x} \pm 9\frac{y^2}{x^2}} \\
 0
 \end{array}$$

پس دیے ہوئے جملہ کا جذر المربع $\pm \left(2\frac{x}{y} + 2 + 3\frac{y}{x}\right)$ ہے۔

مثال 3 الجبری جملہ $x^4 - 10x^3 + 33x^2 - 42x + 20$ کو مکمل مربع میں ظاہر کرنے کے لیے

(i) جملہ میں کیا جمع کیا جائے؟

(ii) جملہ میں سے کیا تفریق کیا جائے؟

(iii) x کی کس قیمت پر جملہ مکمل مربع ہوگا؟

حل بذریعہ تقسیم ہم معلوم کرتے ہیں کہ

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 5x + 4 \quad \left) \quad x^4 - 10x^3 + 33x^2 - 42x + 20 \\
 \underline{\pm x^4} \\
 2x^2 - 5x \quad \left) \quad -10x^3 + 33x^2 \\
 \underline{\mp 10x^3 \pm 25x^2} \\
 2x^2 - 10x + 4 \quad \left) \quad 8x^2 - 42x + 20 \\
 \underline{- 8x^2 \mp 40x \pm 16} \\
 - 2x + 4
 \end{array}$$

دیے ہوئے جملہ کو مکمل مربع بنانے کے لیے بقایا $(-2x + 4)$ صفر کے برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے

(i) ہمیں جملہ میں $(2x - 4)$ جمع کرنا چاہیے۔

(ii) ہمیں جملہ میں سے $(-2x + 4)$ تفریق کرنا چاہیے۔

(iii) چونکہ دیے ہوئے جملہ کو مکمل مربع بنانے کے لیے $(-2x + 4)$ کو صفر کے برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے

$$-2x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x = 2$$

مشق 6.3

1- بذریعہ تجزی مندرجہ ذیل جملوں کا جذر المربع معلوم کیجیے۔

(i) $4x^2 - 12xy + 9y^2$

(ii) $x^2 - 1 + \frac{1}{4x^2}$, ($x \neq 0$)

(iii) $\frac{1}{16}x^2 - \frac{1}{12}xy + \frac{1}{36}y^2$

(iv) $4(a+b)^2 - 12(a^2 - b^2) + 9(a-b)^2$

(v) $\frac{4x^6 - 12x^3y^3 + 9y^6}{9x^4 + 24x^2y^2 + 16y^4}$, ($x, y \neq 0$)

(vi) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4\left(x - \frac{1}{x}\right)$, ($x \neq 0$)

(vii) $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 12$, ($x \neq 0$)

(viii) $(x^2 + 3x + 2)(x^2 + 4x + 3)(x^2 + 5x + 6)$

(ix) $(x^2 + 8x + 7)(2x^2 - x - 3)(2x^2 + 11x - 21)$

2- بذریعہ تقسیم مندرجہ ذیل جملوں کا جذر المربع معلوم کیجیے۔

(i) $4x^2 + 12xy + 9y^2 + 16x + 24y + 16$

(ii) $x^4 - 10x^3 + 37x^2 - 60x + 36$

(iii) $9x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 2x + 1$

(iv) $4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$

(v) $\frac{x^2}{y^2} - 10\frac{x}{y} + 27 - 10\frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$, ($x \neq 0, y \neq 0$)

3- k کی قیمت معلوم کریں جس سے مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل مربع بنایا جاسکے۔

(i) $4x^4 - 12x^3 + 37x^2 - 42x + k$

(ii) $x^4 - 4x^3 + 10x^2 - kx + 9$

4- اور m مقداروں کی قیمت معلوم کیجیے جن سے مندرجہ ذیل جملے مکمل مربع بن سکیں۔

(i) $x^4 + 4x^3 + 16x^2 + lx + m$

(ii) $49x^4 - 70x^3 + 109x^2 + lx - m$

5- جملہ $9x^4 - 12x^3 + 22x^2 - 13x + 12$ کو مکمل مربع بنانے کے لیے

(i) جملہ میں کیا جمع کرنا چاہیے؟

(ii) جملہ میں کیا تفریق کرنا چاہیے؟

(iii) x کی کیا قیمت ہوگی؟

اعادہ مشق 6

1- دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) جملوں $p^3q - pq^3$ اور $p^5q^2 - p^2q^5$ کا عاوا عظم ہے.....

(a) $pq(p^2 - q^2)$

(b) $pq(p - q)$

(c) $p^2q^2(p - q)$

(d) $pq(p^3 - q^3)$

(ii) جملوں $5x^2y^2$ اور $20x^3y^3$ کا عاوا عظم ہے.....

(a) $5x^2y^2$

(b) $20x^3y^3$

(c) $100x^5y^5$

(d) $5xy$

(iii) جملوں $x - 2$ اور $x^2 + x - 6$ کا عاوا عظم ہے.....

(a) $x^2 + x - 6$

(b) $x + 3$

(c) $x - 2$

(d) $x + 2$

(iv) جملوں $a^2 - ab + b^2$ اور $a^3 + b^3$ کا عاوا عظم ہے.....

(a) $a + b$

(b) $a^2 - ab + b^2$

(c) $(a - b)^2$

(d) $a^2 + b^2$

(v) جملوں $x^2 - x - 6$ اور $x^2 - 5x + 6$ کا عاوا عظم ہے.....

(a) $x - 3$

(b) $x + 2$

(c) $x^2 - 4$

(d) $x - 2$

..... ہے۔ (vi) $a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا عاوا عظم

(a) $a - b$

(b) $a + b$

(c) $a^2 + ab + b^2$

(d) $a^2 - ab + b^2$

..... ہے۔ (vii) $x^2 + 5x + 4$ اور $x^2 + 3x + 2, x^2 + 4x + 3$ کا عاوا عظم

(a) $x + 1$

(b) $(x + 1)(x + 2)$

(c) $x + 3$

(d) $(x + 4)(x + 1)$

..... ہے۔ (viii) $30xyz$ اور $45xy, 15x^2$ کا ذواضعاف اقل

(a) $90xyz$

(b) $90x^2yz$

(c) $15xyz$

(d) $15x^2yz$

..... ہے۔ (ix) $a^4 - b^4$ اور $a^2 + b^2$ کا ذواضعاف اقل

(a) $a^2 + b^2$

(b) $a^2 - b^2$

(c) $a^4 - b^4$

(d) $a - b$

..... کے برابر ہے۔ (x) دو جملوں کا حاصل ضرب، عاوا عظم اور ذواضعاف اقل کے

(a) حاصل تفریق

(b) حاصل جمع

(c) حاصل ضرب

(d) حاصل تقسیم

..... ہے۔ (xi) جملہ $\frac{a}{9a^2 - b^2} + \frac{1}{3a - b}$ کا اختصار

(a) $\frac{4a}{9a^2 - b^2}$

(b) $\frac{4a - b}{9a^2 - b^2}$

(c) $\frac{4a + b}{9a^2 - b^2}$

(d) $\frac{b}{9a^2 - b^2}$

..... ہے۔ (xii) $\frac{a^2 + 5a - 14}{a^2 - 3a - 18} \times \frac{a + 3}{a - 2}$ کا اختصار

(a) $\frac{a + 7}{a - 6}$

(b) $\frac{a + 7}{a - 2}$

(c) $\frac{a + 3}{a - 6}$

(d) $\frac{a - 2}{a + 3}$

..... کا اختصار $\frac{a^3 - b^3}{a^4 - b^4} \div \frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 + b^2}$ (xiii)

(a) $\frac{1}{a+b}$ (b) $\frac{1}{a-b}$ (c) $\frac{a-b}{a^2+b^2}$ (d) $\frac{a+b}{a^2+b^2}$

..... کا اختصار $\left(\frac{2x+y}{x+y} - 1\right) \div \left(1 - \frac{x}{x+y}\right)$ (xiv)

(a) $\frac{x}{x+y}$ (b) $\frac{y}{x+y}$ (c) $\frac{y}{x}$ (d) $\frac{x}{y}$

..... کا جذر المربع $a^2 - 2a + 1$ (xv)

(a) $\pm(a+1)$ (b) $\pm(a-1)$ (c) $a-1$ (d) $a+1$

جملہ $x^4 + 64$ میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے.....؟ (xvi)

(a) $8x^2$ (b) $-8x^2$ (c) $16x^2$ (d) $4x^2$

..... کا جذر المربع $x^4 + \frac{1}{x^4} + 2$ (xvii)

(a) $\pm\left(x + \frac{1}{x}\right)$ (b) $\pm\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$ (c) $\pm\left(x - \frac{1}{x}\right)$ (d) $\pm\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$

2- بذریعہ تجزی $8x^4 - 128$ اور $12x^3 - 96$ کا عاوا عظم معلوم کریں۔

3- بذریعہ تقسیم $y^3 + 3y^2 - 3y - 9$ اور $y^3 + 3y^2 - 8y - 24$ کا عاوا عظم معلوم کریں۔

4- بذریعہ تجزی $12x^2 - 75$ ، $6x^2 - 13x - 5$ اور $4x^2 - 20x + 25$ کا ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

5- اگر $x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 26x + 56$ اور $x^4 + 2x^3 - 4x^2 - x + 28$ کا عاوا عظم $x^2 + 5x + 7$ ہو تو

جملوں کا ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

6- مندرجہ ذیل کو مختصر کیجیے۔

(i) $\frac{3}{x^3 + x^2 + x + 1} - \frac{3}{x^3 - x^2 + x - 1}$

(ii) $\frac{a+b}{a^2 - b^2} \div \frac{a^2 - ab}{a^2 - 2ab + b^2}$

$$-7 \quad \text{بذریعہ تجزیہ } \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 10\left(x + \frac{1}{x}\right) + 27 \quad \text{کا جذر المربع معلوم کریں، جبکہ } (x \neq 0)$$

$$-8 \quad \text{بذریعہ تقسیم } \frac{4x^2}{y^2} + \frac{20x}{y} + 13 - \frac{30y}{x} + \frac{9y^2}{x^2} \quad \text{کا جذر المربع معلوم کریں، جبکہ } (x, y \neq 0)$$

خلاصہ

☆ ہم نے دیے ہوئے دو یا دو سے زیادہ الجبری جملوں کا عاِدِ اعظم اور ذواضعاف اقل معلوم کرنا بذریعہ تجزیہ اور تقسیمی عمل سیکھ لیا ہے۔

☆ ہم نے دیے ہوئے دو الجبری کثیررتبی $p(x)$ اور $q(x)$ کے عاِدِ اعظم اور ذواضعاف اقل کے درمیان تعلق کا فارمولا۔

$$p(x) \times q(x) = \text{ذواضعاف اقل} \times \text{عاِدِ اعظم}$$

تاکم کیا اور اس کے استعمال سے ذواضعاف اقل یا عاِدِ اعظم وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں۔

☆ فارمولا میں کوئی تین اجزا معلوم ہوں تو نا معلوم کو نیچے دی گئی مساوات کی مدد سے حاصل کرنا سیکھا ہے۔

$$p(x) \times q(x) = \text{ذواضعاف اقل} \times \text{عاِدِ اعظم}$$

☆ عاِدِ اعظم اور ذواضعاف کے استعمال سے کسری جملوں کا مختصر کرنا سیکھا ہے۔

جن میں بنیادی عوامل $+$, $-$, \times , \div مستعمل ہوں۔

☆ دیے ہوئے الجبری جملوں کے جذر المربع بذریعہ تجزیہ اور تقسیمی طریقے سے معلوم کرنا سیکھا ہے۔

یک درجی مساواتیں اور غیر مساواتیں

(LINEAR EQUATIONS AND INEQUALITIES)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

- 7.1 یک درجی مساواتیں (Linear Equations)
- 7.2 مطلق قیمت کی مساواتیں (Equations Involving Absolute Value)
- 7.3 یک درجی غیر مساواتیں (Linear Inequalities)
- 7.4 یک درجی غیر مساواتوں کو حل کرنا (Solving Linear Inequalities)
- یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ☆ ایک متغیر میں یک درجی مساوات کا اعادہ کر سکیں۔
- ☆ ایسی یک درجی مساوات کو حل کر سکیں جس میں متغیر کے عددی سرناطقی اعداد ہوں۔
- ☆ جذری مساواتوں کو یک درجی شکل میں تبدیل کر کے حل کر سکیں۔
- ☆ کسی حقیقی عدد x کی مطلق قیمت $|x|$ کی تعریف بیان کر سکیں۔
- ☆ ایک متغیر میں مطلق قیمت کی مساوات کو حل کر سکیں۔
- ☆ ایسی غیر مساواتوں کی تعریف کر سکیں جن میں علامات $(>)$ ، $(<)$ اور (\geq) ، (\leq) استعمال کی گئی ہوں۔
- ☆ غیر مساواتوں کی درج ذیل خصوصیات کو سمجھ اور ان کی شناخت کر سکیں:
- ☆ ثلاثی خاصیت، خاصیت تعددیت، جمعیت خاصیت، ضربی خاصیت
- ☆ ایسی یک درجی غیر مساواتوں کو حل کر سکیں جن میں متغیر کے عددی سرناطقی اعداد ہوں۔

تعارف (Introduction)

اس یونٹ میں ہم پچھلی جماعتوں میں حاصل کردہ علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ایسی مساواتوں کو حل کریں گے جن میں کوئی متغیر ناطق عددی سروں کا یا جذری علامت کا یا مطلق قیمت کا ہو۔ پھر غیر مساواتوں کی تعریف بیان کرنے کے بعد ان کی ثلاثی، تعددیت، جمعی اور ضربی خصوصیات کا اعادہ کریں گے۔ آخر میں ان خصوصیات کی مدد سے غیر مساواتوں کو حل کریں گے۔

7.1 یک درجہ مساواتیں

ایک متغیر x میں یک درجہ مساوات کی معیاری شکل درج ذیل ہے:

$$ax + b = 0 \quad \text{جبکہ } a, b \in \mathbb{R} \text{ اور } a \neq 0$$

یک درجہ مساوات کا حل سیٹ متغیر x کی وہ حقیقی قیمت ہوگی جو x کی جگہ درج کرنے سے مساوات کو درست ثابت کر دے۔ دو ایسی مساواتیں جن کے حل سیٹ یکساں ہوں متبادل مساواتیں کہلاتی ہیں۔

7.1.2 ایک متغیر میں یک درجہ مساوات کو حل کرنا

کسی مساوات کا حل معلوم کرنے کے لیے اس کو متبادل مساوات میں تحویل کرنے کا عمل اس میں موجود متغیر x کی قیمت معلوم ہو جانے تک جاری رہتا ہے۔

حل کرنے کا طریق کار

ایک متغیر میں یک درجہ مساوات کو حل کرنے کے طریق کار کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- ☆ اگر مساوات میں کسریں موجود ہوں تو مخزجوں کے ذواضعاف اقل سے ضرب دے کر کسور کے مخزجوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
- ☆ قوسین کو ختم کرنے کے لیے ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع استعمال کرتے ہیں۔
- ☆ طرفین میں موجود ایک جیسی (یکساں درجے والی) رقوم کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔
- ☆ برابری کی جمعی خاصیت (طرفین میں ایک ہی رقم جمع یا تفریق کرنے سے مساوات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی) کی مدد سے متغیر کو مساوات کے بائیں طرف اور مستقل مقداروں کو دوسری طرف اکٹھا کر کے مختصر کر لیتے ہیں۔
- ☆ برابری کی ضربی خاصیت کی مدد سے متغیر کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔
- ☆ جواب کے طور پر حاصل ہونے والی متغیر کی قیمت کو دی گئی مساوات میں متغیر کی جگہ درج کر کے پڑتال کر لیتے ہیں کہ جواب درست ہے یا نہیں۔

مثال 1 مندرجہ ذیل مساوات کو حل کریں

$$\frac{3x}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{25}{6}$$

حل کسور کے مخزجوں کو خارج کرنے کے لیے دی گئی مساوات کی دونوں اطراف کو 2، 3 اور 6 کے ذواضعاف اقل

6 سے ضرب دینے سے

$$\begin{aligned} 9x - 2(x-2) &= 25 \\ \Rightarrow 9x - 2x + 4 &= 25 \\ \Rightarrow 7x &= 21 \\ \Rightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

پڑتال دی گئی مساوات میں $x = 3$ درج کرنے سے

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}(3) - \frac{3-2}{3} &= \frac{25}{6} \\ \frac{9}{2} - \frac{1}{3} &= \frac{25}{6} \\ \frac{25}{6} &= \frac{25}{6} \end{aligned}$$

جو کہ درست نتیجہ ہے

چونکہ $x = 3$ رکھنے سے دی گئی مساوات درست فقرہ بنتی ہے، اس لیے حاصل کردہ اصل صحیح ہے۔

نوٹ کسری مساوات کے حل میں ایسی اصل (root) کے حاصل ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے جو دی گئی مساوات کو درست ثابت نہ کرے۔ یعنی حل سیٹ خالی سیٹ ہو۔

مثال 2 درج ذیل مساوات کو حل کیجیے۔

$$\frac{3}{y-1} - 2 = \frac{3y}{y-1}, \quad y \neq 1$$

حل

طرفین کو ذواضعاف اقل $y-1$ سے ضرب دینے سے

$$\begin{aligned} 3 - 2(y-1) &= 3y \\ \Rightarrow 3 - 2y + 2 &= 3y \\ \Rightarrow -5y &= -5 \\ \Rightarrow y &= 1 \end{aligned}$$

پڑتال دی گئی مساوات میں $y = 1$ درج کرنے سے

$$\begin{aligned} \frac{3}{1-1} - 2 &= \frac{3(1)}{1-1} \\ \frac{3}{0} - 2 &= \frac{3}{0} \end{aligned}$$

لیکن $\frac{3}{0}$ مبہم صورت ہے، اس لیے $y = 1$ اصل نہیں ہو سکتی۔

لہذا دی گئی مساوات کی کوئی اصل موجود نہیں۔ یعنی حل سیٹ $\{ \}$ ہے۔

مثال 3 درج ذیل مساوات کو حل کیجیے۔

$$\frac{3x-1}{3} - \frac{2x}{x-1} = x, \quad x \neq 1$$

حل اس مفروضے کے تحت کہ $x-1 \neq 0$ یعنی $x \neq 1$ ، طرفین کو $3(x-1)$ سے ضرب دینے سے

$$(x-1)(3x-1) - 6x = 3x(x-1)$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 4x + 1 - 6x = 3x^2 - 3x$$

$$\Rightarrow -10x + 1 = -3x$$

$$\Rightarrow -7x = -1$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{7}$$

پڑتا $x = \frac{1}{7}$ رکھنے سے دی گئی مساوات ایک درست فقرہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرط $x \neq 1$ کا مساوات

کے حل پر کوئی اثر نہیں ہے۔ کیونکہ $\frac{1}{7} \neq 1$

لہذا ہمارا حل $x = \frac{1}{7}$ درست ہے۔

7.1.3 جذری مساواتیں جن کو یک درجی مساواتوں میں تبدیل کیا جاسکے

تعریف

ایسی مساوات جس میں کوئی جذری علامت میں متغیر ہو، جذری مساوات کہلاتی ہے۔

کسی جذری مساوات کو حل کرنے کے لیے ہم طرفین کا وہ قوت نمایا کرتے ہیں جو جذری علامت کو خارج کر دے۔ مساوات

کی دو میں سے ہر ایک طرف کی کوئی خاص قوت لینے سے ایسی غیر مترادف مساوات بھی حاصل ہو سکتی ہے جس کے اصل (roots)

دی گئی مساوات سے زیادہ ہوں۔ ایسے اصل، اضافی اصل (extraneous roots) کہلاتے ہیں۔ جذری مساوات کو حل

کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم جواب کی پڑتال کریں کہ حاصل کردہ اصل کہیں اضافی اصل تو نہیں۔

نوٹ

یہاں ایک اہم اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ دی گئی مساوات کی دو میں سے ہر ایک طرف کی طاق قوت نمایا لینے سے

ہمیشہ ایک مترادف مساوات حاصل ہوگی۔ جبکہ جفت قوت نمایا لینے سے ایسا ہونا ضروری نہیں۔

مثال 1 درج ذیل مساواتوں کو حل کیجیے۔

(a) $\sqrt{2x-3}-7=0$

(b) $\sqrt[3]{3x+5}=\sqrt[3]{x-1}$

حل

(a) جذری علامت والے جملہ کو علیحدہ کرنے کے لیے مساوات کو دوبارہ لکھنے سے

$$\begin{aligned}\sqrt{2x-3} &= 7 \\ \Rightarrow 2x-3 &= 49 \quad \dots\dots\dots (\text{طرفین کا مربع لینے سے}) \\ \Rightarrow 2x &= 52 \Rightarrow x=26\end{aligned}$$

پڑتال

دی گئی مساوات میں $x=26$ درج کرنے سے

$$\sqrt{2(26)-3}-7=0$$

$$\sqrt{52-3}-7=0$$

$$\sqrt{49}-7=0$$

$$0=0$$

حل سیٹ {26} ہے

لہذا

(b)

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{3x+5} &= \sqrt[3]{x-1} \quad \dots\dots\dots (\text{معلوم}) \\ \Rightarrow 3x+5 &= x-1 \quad \dots\dots\dots (\text{طرفین کا مکعب لینے سے}) \\ \Rightarrow 2x &= -6 \Rightarrow x=-3\end{aligned}$$

پڑتال

دی گئی مساوات میں $x=-3$ درج کرنے سے

$$\sqrt[3]{3(-3)+5}=\sqrt[3]{-3-1} \Rightarrow \sqrt[3]{-4}=\sqrt[3]{-4}$$

پس دی گئی مساوات $x=-3$ رکھنے سے درست ثابت ہوتی ہے۔

یہاں $\sqrt[3]{-4}$ ایک حقیقی عدد ہے۔ کیونکہ ہم نے مساوات کی دو میں سے ہر ایک طرف کی طاق قوت نمائی۔

لہذا دی گئی مساوات کا حل سیٹ {-3} ہے۔

مثال 2 مندرجہ ذیل مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں اور پڑتال بھی کریں۔

$$\sqrt{5x-7} - \sqrt{x+10} = 0$$

حل

جب کسی جذری مساوات کی دو رقوم کے مجذور میں متغیر موجود ہو تو ان دونوں رقوم کو طرفین میں علیحدہ علیحدہ (یعنی ایک رقوم کو مساوات کی ایک طرف اور دوسری رقوم کو دوسری طرف) لکھ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مساوات کو دوبارہ لکھنے سے

$$\begin{aligned} \sqrt{5x-7} &= \sqrt{x+10} \\ 5x-7 &= x+10, \quad \dots\dots\dots \text{(طرفین کا مربع لینے سے)} \\ 4x &= 17 \Rightarrow x = \frac{17}{4} \end{aligned}$$

پڑتال

دی گئی مساوات میں $x = \frac{17}{4}$ درج کرنے سے

$$\begin{aligned} \sqrt{5x-7} - \sqrt{x+10} &= 0 \\ \sqrt{5\left(\frac{17}{4}\right) - 7} - \sqrt{\frac{17}{4} + 10} &= 0 \\ \sqrt{\frac{57}{4}} - \sqrt{\frac{57}{4}} &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

یعنی $x = \frac{17}{4}$ درج کرنے سے دی گئی مساوات درست فقرہ ثابت ہوتی ہے۔
پس حل سیٹ = $\left\{\frac{17}{4}\right\}$

مثال 3 مندرجہ ذیل مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں اور پڑتال بھی کریں۔

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$

حل

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$

طرفین کا مربع لینے سے

$$x+7 + x+2 + 2\sqrt{(x+7)(x+2)} = 6x+13$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{x^2+9x+14} = 4x+4$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2+9x+14} = 2x+2$$

$$x^2 + 9x + 14 = 4x^2 + 8x + 4$$

$$\Rightarrow 3x^2 - x - 10 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x + 5x - 10 = 0$$

$$\Rightarrow 3x(x - 2) + 5(x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 2)(3x + 5) = 0$$

$$\Rightarrow x = 2, -\frac{5}{3}$$

پڑتال کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = 2$ درج کرنے سے دی گئی مساوات درست ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ $x = -\frac{5}{3}$

درج کرنے سے مساوات درست ثابت نہیں ہوتی۔

لہذا حل سیٹ {2} ہے اور $x = -\frac{5}{3}$ اضافی اصل ہے۔

مشق 7.1

1- مندرجہ ذیل مساواتوں کا حل سیٹ معلوم کریں۔

(i) $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x = x + \frac{1}{6}$

(ii) $\frac{x-3}{3} - \frac{x-2}{2} = -1$

(iii) $\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{6}\right) + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} - 3x\right)$

(iv) $x + \frac{1}{3} = 2\left(x - \frac{2}{3}\right) - 6x$

(v) $\frac{5(x-3)}{6} - x = 1 - \frac{x}{9}$

(vi) $\frac{x}{3x-6} = 2 - \frac{2x}{x-2}, x \neq 2$

(vii) $\frac{2x}{2x+5} = \frac{2}{3} - \frac{5}{4x+10}, x \neq -\frac{5}{2}$

(viii) $\frac{2x}{x-1} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{2}{x-1}, x \neq 1$

(ix) $\frac{2}{x^2-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x+1}, x \neq \pm 1$

(x) $\frac{2}{3x+6} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2x+4}, x \neq -2$

2- درج ذیل ہر مساوات کو حل کریں اور اضافی اصل کی پڑتال بھی کریں۔

(i) $\sqrt{3x+4} = 2$

(ii) $\sqrt[3]{2x-4} - 2 = 0$

(iii) $\sqrt{x-3} - 7 = 0$

(iv) $2\sqrt{t+4} = 5$

$$(v) \sqrt[3]{2x+3} = \sqrt[3]{x-2}$$

$$(vi) \sqrt[3]{2-t} = \sqrt[3]{2t-28}$$

$$(vii) \sqrt{2t+6} - \sqrt{2t-5} = 0$$

$$(viii) \sqrt{\frac{x+1}{2x+5}} = 2, x \neq -\frac{5}{2}$$

7.2 مطلق قیمت میں مساوات

یک درجی مساوات کی ایک اور قسم متغیر کی مطلق قیمت میں مساوات ہے۔ ایسی مساواتوں کو حل کرنے سے پہلے مطلق

قیمت کی تعریف درج ذیل ہے:

7.2.1 تعریف

کسی حقیقی عدد 'a' کی مطلق قیمت کو |a| سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کی تعریف درج ذیل ہے

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{اگر } a \geq 0 \\ -a, & \text{اگر } a < 0 \end{cases}$$

مثال کے طور پر

$$|6| = 6, \quad |0| = 0 \quad \text{اور} \quad |-6| = -(-6) = 6$$

مطلق قیمت کی کچھ خصوصیات

اگر $a, b \in \mathbb{R}$ تو

$$(i) |a| \geq 0$$

$$(ii) |-a| = |a|$$

$$(iii) |ab| = |a| \cdot |b|$$

$$(iv) \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, b \neq 0$$

7.2.2 مطلق قیمت میں یک درجی مساوات کا حل معلوم کرنا

مطلق قیمت کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فوری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ

$$|x| = 3 \text{ مترادف ہے } x = 3 \text{ یا } x = -3$$

کیونکہ $x = -3$ یا $x = +3$ رکھنے سے بیان $|x| = 3$ درست ثابت ہوتا ہے۔

ایسی مساوات جس میں مطلق قیمت کا کوئی متغیر ہو، کو حل کرنے کے لیے اسے مترادف مرکب فقرے کے طور پر لکھ لیتے

ہیں۔ جس کے دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ حل کر لیا جاتا ہے۔

$$\text{مثال 1} \quad |2x+3| = 11 \text{ کا حل سیٹ معلوم کریں اور پڑتال بھی کریں۔}$$

حل

اس بات پر انحصار کرتے ہوئے کہ $(2x+3)$ مثبت ہے یا منفی، مطلق قیمت کی تعریف کی رو سے دی گئی مساوات درج

ذیل کے مترادف ہوگی:

$$+(2x+3) = 11 \quad \text{یا} \quad -(2x+3) = 11$$

عام طور پر ان دونوں مساوات کو یوں لکھا جاتا ہے:

$$2x + 3 = +11$$

یا

$$2x + 3 = -11$$

$$2x = 8$$

یا

$$2x = -14$$

$$x = 4$$

یا

$$x = -7$$

پڑتال

دی گئی مساوات میں $x = 4$ درج کرنے سے

$$|2(4) + 3| = 11$$

$$11 = 11 \text{ جو ہمیشہ درست ہے}$$

اب $x = -7$ درج کرنے سے

$$|2(-7) + 3| = 11$$

$$|-11| = 11$$

$$11 = 11 \text{ جو کہ درست نتیجہ ہے}$$

لہذا $x = 4, -7$ دی گئی مساوات کے اصل ہیں۔

پس حل سیٹ $\{-7, 4\}$ ہے۔

نوٹ

اگر مساوات $8 = |x - 1| - 6$ طرز کی ہو تو مطلق قیمت والے جملے کو ایک طرف علیحدہ کر کے مترادف مساواتیں

لکھی جاتی ہیں۔ زیر بحث مساوات کو حل کرنا ہو تو پہلے $|x - 1| = \frac{14}{3}$ کی شکل میں لکھ لینا چاہیے۔

مثال 2 $|8x - 3| = |4x + 5|$ کا حل سیٹ معلوم کریں۔

حل

چونکہ یکساں مطلق قیمت کے دو اعداد برابر ہوتے ہیں یا ان کی علامت میں فرق (+ یا -) کا ہوتا ہے۔ اس لیے دی گئی

مساوات درج ذیل مساواتوں کے مترادف ہوگی:

$$8x - 3 = 4x + 5$$

یا

$$8x - 3 = -(4x + 5)$$

$$4x = 8$$

یا

$$12x = -2$$

$$x = 2$$

یا

$$x = -\frac{1}{6}$$

پڑتال کرنے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ $x = 2, x = -\frac{1}{6}$ دونوں قیمتیں دی گئی مساوات کو درست ثابت کرتی ہیں۔

$$\text{لہذا } \{ -\frac{1}{6}, 2 \} = \text{حل سیٹ}$$

بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ حاصل کی گئی اصل دی گئی مساوات کو درست ثابت نہ کرے۔ اس صورت میں ایسے اضافی اصل کو رد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مناسب یہی ہوگا کہ حل سیٹ لکھنے سے پہلے پڑتال کر لی جائے۔

$$\text{مثال 3} \quad |3x + 10| = 5x + 6 \quad \text{کو حل کریں}$$

حل دی گئی مساوات درج ذیل مساواتوں کے مترادف ہے:

$$\begin{aligned} \pm(3x + 10) &= 5x + 6 \\ \Rightarrow \quad 3x + 10 &= 5x + 6 \quad \text{یا} \quad 3x + 10 = -(5x + 6) \\ -2x &= -4 \quad \text{یا} \quad 8x = -16 \\ x &= 2 \quad \text{یا} \quad x = -2 \end{aligned}$$

دی گئی مساوات میں $x = -2$ رکھنے سے وہ درست ثابت نہیں ہوتی۔

لہذا صرف $x = 2$ ہی مطلوبہ اصل ہے۔

مشق 7.2

1- مندرجہ ذیل بیانات میں سے درست یا غلط کی شناخت کریں۔

..... (i) $|x| = 0$ کے حل سیٹ میں صرف ایک ہی رکن ہے۔

..... (ii) مطلق قیمت کی تمام مساواتوں کے دو اصل ہوتے ہیں۔

..... (iii) مساوات $|x| = 2$ مترادف ہے $x = 2$ یا $x = -2$ کے۔

..... (iv) مساوات $|x - 4| = -4$ کا حل سیٹ خالی سیٹ ہے۔

..... (v) مساوات $|2x - 3| = 5$ مترادف ہے $2x - 3 = 5$ یا $2x + 3 = 5$ کے۔

2- مندرجہ ذیل مساواتوں کے حل سیٹ معلوم کریں۔

(i) $|3x - 5| = 4$

(ii) $\frac{1}{2}|3x + 2| - 4 = 11$

(iii) $|2x + 5| = 11$

(iv) $|3 + 2x| = |6x - 7|$

(v) $|x + 2| - 3 = 5 - |x + 2|$

(vi) $\frac{1}{2}|x + 3| + 21 = 9$

(vii) $\left| \frac{3 - 5x}{4} \right| - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

(viii) $\left| \frac{x + 5}{2 - x} \right| = 6$

7.3 ایک درجی غیر مساواتیں

یونٹ 2 میں ہم نے حقیقی اعداد کا موازنہ کرنے کی ایک اہم خاصیت پر روشنی ڈالی تھی۔ نابرابری کا تعلق $a \neq b$ ہمیں حقیقی اعداد a اور b کا موازنہ کرنے اور اس بات کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کوئی بھی عدد کسی دوسرے عدد سے یا تو چھوٹا یا بڑا ہے۔ اعداد کا یہ تقابلی روزمرہ زندگی کے بہت سے معاملات میں بنیادی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم قیمت، بلندی، وزن، درجہ حرارت، فاصلہ، مشینی پیداوار کی لاگت اور وقت وغیرہ کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ غیر مساوات کی علامات $<$ اور $>$ کو سب سے پہلے ایک انگریز ریاضی دان تھامس ہیریٹ (Thomas Harriot, 1560-1621) نے متعارف کروایا تھا۔

7.3.1 غیر مساوات کی تعریف

فرض کریں a اور b حقیقی اعداد ہیں۔ اگر ان کا فرق $a - b$ مثبت ہو تو a 'عدد b ' سے بڑا ہوگا۔ اس کو ہم غیر مساوات $a > b$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس غیر مساوات کو $b < a$ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ b 'عدد a ' سے چھوٹا ہے۔

اسی طرح اگر $a - b$ منفی ہو تو a ، b سے چھوٹا ہے اور اس کو $a < b$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ کبھی کبھار ایسی صورت حال بھی سامنے آتی ہے کہ ایک عدد دوسرے عدد سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں صحیح صورت حال کا ادراک نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں ہم علامت \leq کا استعمال کرتے ہیں۔ جس کو یوں پڑھا جائے گا "چھوٹا ہے یا برابر ہے" یعنی \geq کو پڑھا جائے گا "بڑا ہے یا برابر ہے"۔ علامات $<$ ، $>$ ، \leq اور \geq کو غیر مساواتی نشان بھی کہا جاتا ہے۔ غیر مساواتوں $x > y$ اور $x < y$ کو مضبوط جبکہ $x \geq y$ اور $x \leq y$ کو کمزور غیر مساواتیں کہا جاتا ہے۔

اگر ہم غیر مساواتوں کے جوڑے $a < b$ اور $b < c$ کو اکٹھا کر کے ایک مربوط اور ٹھوس شکل ' $a < b < c$ ' میں لکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a ، b اور c کے درمیان کہیں واقع ہے "یعنی $a \leq b \leq c$ " کو یوں پڑھا جائے گا۔ " a ، b اور c کے درمیان واقع ہے بشمول a اور c کے۔"

ایک متغیر x میں ایک درجی غیر مساوات کی معیاری شکل مندرجہ ذیل ہے:

$$ax + b < 0, \quad a \neq 0; \quad a, b \in \mathbb{R}$$

ہم علامت ' $<$ '، ' $>$ '، ' \leq ' یا ' \geq ' سے بھی بدل سکتے ہیں۔

7.3.2 غیر مساواتوں کی خصوصیات

ایک متغیر میں یک درجی غیر مساواتوں کو حل کرنے کے لیے جن خصوصیات کو ہم استعمال کریں گے، وہ درج ذیل ہیں۔

1- ثلاثی خاصیت

اگر $a, b \in \mathbb{R}$ تو درج ذیل بیانات میں سے ایک اور صرف ایک درست ہوتا ہے۔

$$a < b \quad \text{یا} \quad a = b \quad \text{یا} \quad a > b$$

اس خاصیت کا ایک خاص اہم نتیجہ $b = 0$ کے لیے ہے۔ یعنی کسی حقیقی عدد 'a' کے لیے

$$a < 0 \quad \text{یا} \quad a = 0 \quad \text{یا} \quad a > 0$$

2- خاصیت تعددیت

فرض کریں $a, b, c \in \mathbb{R}$

(i) $a > b$ اور $b > c \Rightarrow a > c$

(ii) $a < b$ اور $b < c \Rightarrow a < c$

3- جمعی خاصیت

$a, b, c \in \mathbb{R}$ کے لیے

(i) $a > 0$ اور $b > 0 \Rightarrow a + b > 0$ (خاصیت بندش بلحاظ جمع)

(ii) $a > b \Rightarrow a + c > b + c$

$a < b \Rightarrow a + c < b + c$

4- ضربی خاصیت

فرض کریں $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

(i) $a > 0$ اور $b > 0 \Rightarrow ab > 0$

$a < 0$ اور $b < 0 \Rightarrow ab > 0$ جبکہ

(ii) $a > b$ اور $c > 0 \Rightarrow ac > bc$

$a < b$ اور $c > 0 \Rightarrow ac < bc$ یا

(iii) $a > b$ اور $c < 0 \Rightarrow ac < bc$

$a < b$ اور $c < 0 \Rightarrow ac > bc$ یا

مندرجہ بالا خاصیت (iii) یہ ظاہر کرتی ہے کہ منفی حقیقی عدد سے کسی غیر مساوات کی طرفین کو ضرب دینے سے

غیر مساوات کا نشان برعکس ہو جاتا ہے (یعنی اس کا رخ مخالف سمت میں تبدیل ہو جاتا ہے):

(iv) $a > b$ اور $c < 0 \Rightarrow ac < bc$

7.4 ایک متغیر میں غیر مساواتوں کا حل معلوم کرنا

ایک متغیر میں الجبری غیر مساوات کو حل کرنے کے طریقہ کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے کی گئی ہے:

مثال 1

(جبکہ $x \in \mathbb{R}$) $9 - 7x > 19 - 2x$ کا حل سیٹ معلوم کریں۔

حل

$$9 - 7x > 19 - 2x$$

$$9 - 5x > 19 \quad (\text{طرفین میں } 2x \text{ جمع کرنے سے})$$

$$-5x > 10$$

$$x < -2 \quad (\text{طرفین کو } -\frac{1}{5} \text{ سے ضرب دینے سے})$$

$$\text{لہذا حل سیٹ} = \{x \mid x < -2\}$$

مثال 2

(جبکہ $x \in \mathbb{R}$) $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} \leq x + \frac{1}{3}$ کو حل کریں۔

حل

$$\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} \leq x + \frac{1}{3}$$

طرفین کو 6 سے یعنی سکور کے مخزجوں 2 اور 3 کے ذواضعاف اقل سے ضرب دینے سے

$$6 \left[\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} \right] \leq 6 \left[x + \frac{1}{3} \right]$$

$$\text{یا } 3x - 4 \leq 6x + 2$$

$$\text{یا } 3x \leq 6x + 6$$

$$\text{یا } -3x \leq 6$$

$$\text{یا } x \geq -2$$

$$\text{لہذا حل سیٹ} = \{x \mid x \geq -2\}$$

مثال 3 درج ذیل مرکب غیر مساوات کو حل کریں۔

$$x \in \mathbb{R} \text{ جبکہ } -2 < \frac{1-2x}{3} < 1$$

حل

دی گئی غیر مساوات دو ایسے حصوں پر مشتمل ہے جو لفظ 'اور' کی شرط سے مربوط ہیں۔ حل سیٹ ان دونوں کے حل سیٹوں کا تقاطع ہوگا۔

$$-2 < \frac{1-2x}{3} \quad \text{اور} \quad \frac{1-2x}{3} < 1$$

(مگر ہم اس مثال میں غیر مساوات کو اس کی دی گئی شکل میں ہی حل کریں گے جو کہ نسبتاً آسان ہے)

$$-2 < \frac{1-2x}{3} < 1 \quad \text{دی گئی غیر مساوات}$$

یا $-6 < 1-2x < 3$

یا $-7 < -2x < 2$

یا $\frac{7}{2} > x > -1$

یا $-1 < x < 3.5$

پس حل سیٹ $\{x \mid -1 < x < 3.5\}$ ہے۔

مثال 4

$x \in \mathbb{R}$ (جبکہ) $4x - 1 \leq 3 \leq 7 + 2x$ کو حل کریں۔

حل

دی گئی غیر مساوات برقرار رہے گی اگر اس کے دونوں حصے $4x - 1 \leq 3$ اور $3 \leq 7 + 2x$ مربوط رہیں۔ اب ہم ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ حل کرتے ہیں۔

$$4x - 1 \leq 3$$

پہلے حصے کی غیر مساوات سے

$$\Rightarrow 4x \leq 4 \quad \text{یعنی} \quad x \leq 1 \quad \dots\dots\dots (i)$$

$$3 \leq 7 + 2x \Rightarrow -4 \leq 2x$$

دوسرے حصے کی غیر مساوات سے

$$\text{یا } -2 \leq x \Rightarrow x \geq -2 \quad \dots\dots\dots (ii)$$

نتیجہ (i) اور (ii) کا تقاطع سیٹ $-2 \leq x \leq 1$ ہے۔

$$\text{حل سیٹ} = \{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$$

پس

مشق 7.3

1- مندرجہ ذیل غیر مساواتوں کو حل کریں۔

- (i) $3x + 1 < 5x - 4$ (ii) $4x - 10.3 \leq 21x - 1.8$
 (iii) $4 - \frac{1}{2}x \geq -7 + \frac{1}{4}x$ (iv) $x - 2(5 - 2x) \geq 6x - 3\frac{1}{2}$
 (v) $\frac{3x + 2}{9} - \frac{2x + 1}{3} > -1$ (vi) $3(2x + 1) - 2(2x + 5) < 5(3x - 2)$
 (vii) $3(x - 1) - (x - 2) > -2(x + 4)$ (viii) $2\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}(5x - 4) > -\frac{1}{3}(8x + 7)$

2- مندرجہ ذیل غیر مساواتوں کو حل کریں۔

- (i) $-4 < 3x + 5 < 8$ (ii) $-5 \leq \frac{4 - 3x}{2} < 1$
 (iii) $-6 < \frac{x - 2}{4} < 6$ (iv) $3 \geq \frac{7 - x}{2} \geq 1$
 (v) $3x - 10 \leq 5 < x + 3$ (vi) $-3 \leq \frac{x - 4}{-5} < 4$
 (vii) $1 - 2x < 5 - x \leq 25 - 6x$ (viii) $3x - 2 < 2x + 1 < 4x + 17$

اعادہ مشق 7

1- دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) درج ذیل میں سے کون سا عدد غیر مساوات $3 - 4x \leq 11$ کا حل ہوگا؟

- (a) -8 (b) -2 (c) $-\frac{14}{4}$ (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

(ii) کوئی بیان جس میں \geq یا \leq , $>$, $<$ میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے کہلاتی ہے۔

- (a) مساوات (b) ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو

- (c) غیر مساوات (d) یک درجی مساوات

(iii) $x = \dots\dots\dots$ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔

- (a) -5 (b) 3 (c) 0 (d) $\frac{3}{2}$

(iv) اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو $\dots\dots\dots$

- (a) $x \geq 8$ (b) $x \leq 10$ (c) $x < 10$ (d) $x > 10$

(v) ایک لفٹ کی بوجھ اٹھانے کی استعداد 'ج' زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ ہو تو $\dots\dots\dots$

- (a) $c < 1600$ (b) $c \geq 1600$ (c) $c \leq 1600$ (d) $c > 1600$

(vi) $x = 0$ غیر مساوات $\dots\dots\dots$ کے حل سیٹ کا رکن ہے۔

- (a) $x > 0$ (b) $3x + 5 < 0$
(c) $x + 2 < 0$ (d) $x - 2 < 0$

2- درج ذیل بیانات کی شناخت کریں کہ درست ہیں یا غلط۔

(i) مساوات $3x - 5 = 7 - x$ ایک درجی مساوات ہے۔

(ii) مساوات $x - 0.3x = 0.7x$ متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہے۔

(iii) مساوات $-2x + 3 = 8$ مساوات $-2x = 11$ کے مترادف ہے۔

(iv) مساوات میں کسور ہوں تو مخارج کو ختم کرنے کے لیے ہم مساوات کی دونوں اطراف کو مخرجوں کے

ذواضعاف اقل سے ضرب دیتے ہیں۔

(v) $4(x + 3) = x + 3$ مشروط مساوات ہے۔

(vi) متغیر کی کوئی بھی قیمت، مساوات $2(3x + 5) = 6x + 12$ کو درست ثابت نہیں کرتی۔

(vii) $\frac{2}{3}x = 12$ کو حل کرنے کے لیے طرفین کو $\frac{2}{3}$ سے ضرب دینی چاہیے۔

(viii) برابر حل سیٹ والی مساواتوں کو مترادف مساواتیں کہتے ہیں۔

(ix) ایسا حل جو دی گئی مساوات کو درست ثابت نہ کرے فالتوا اصل کہلاتا ہے۔

3- درج ذیل مختصر سوالات کے جواب تحریر کریں۔

(i) ایک متغیر میں ایک درجی مساوات کی تعریف کریں۔

(ii) غیر مساوات کی ثلاثی خاصیت اور خاصیت متعدیت بیان کریں۔

(iii) حرارت کی پیمائش کرنے کے لیے ڈگری فارن ہائیٹ اور C ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کلیہ درج ذیل ہے۔

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

C کی کس قیمت کے لیے $F < 0$ ہوگا؟

(iv) کسی صحیح عدد اور 12 کے مجموعہ کا 7 گنا کم از کم 50 اور زیادہ سے زیادہ 60 ہے۔ اس تعلق کو ظاہر کرنے والی غیر مساوات لکھیں اور اسے حل کریں۔

4- مندرجہ ذیل مساواتوں میں سے ہر ایک کو حل کریں اور پڑتال بھی کریں۔

(i) $\sqrt{2t+4} = \sqrt{t-1}$

(ii) $\sqrt{3x-1} - 2\sqrt{8-2x} = 0$

5- درج ذیل مساواتوں کے حل سیٹ معلوم کریں۔

(i) $|3x+14| - 2 = 5x$

(ii) $\frac{1}{3}|x-3| = \frac{1}{2}|x+2|$

6- مندرجہ ذیل غیر مساواتوں کو حل کریں۔

(i) $-\frac{1}{3}x + 5 \leq 1$

(ii) $-3 < \frac{1-2x}{5} < 1$

خلاصہ

☆ ایک متغیر x میں یک درجی مساوات $ax+b=0$ ہے۔ جبکہ $a, b \in \mathbb{R}$ اور $a \neq 0$

☆ یک درجی مساوات کا حل متغیر x کی وہ قیمت ہوتی ہے جو x کی جگہ درج کرنے سے مساوات کو درست ثابت کرے۔

☆ ایسی مساوات جس کا حل سیٹ ϕ ہو، ناقابل حل مساوات کہلاتی ہے۔

☆ برابری کی جمعی خاصیت: $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad a=b \Rightarrow a+c=b+c$

اور $a-c=b-c$

☆ برابری کی ضربی خاصیت: $a=b \Rightarrow ac=bc$

☆ تنسیخی خاصیت: $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad a+c=b+c \Rightarrow a=b$

$ac=bc, c \neq 0 \Rightarrow a=b,$

☆ مساوات کا حل معلوم کرنے کے لیے اس کو مترادف مساوات میں تبدیل کرنے کا عمل اس میں موجود متغیر کی قیمت معلوم

کرنے تک جاری رہتا ہے۔

☆ ایسی مساوات جس میں کوئی جذری علامت میں متغیر ہو، جذری مساوات کہلاتی ہے۔ اضافی اصل کے حوالے سے ایسی مساوات کی جانچ پڑتال ضروری ہوتی ہے۔

☆ کسی حقیقی عدد 'a' کی مطلق قیمت کی تعریف:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{جبکہ } a \geq 0 \\ -a, & \text{جبکہ } a < 0 \end{cases}$$

☆ مطلق قیمت کے خواص

اگر $a, b \in \mathbb{R}$ تو

(i) $|a| \geq 0$

(ii) $|-a| = |a|$

(iii) $|ab| = |a| \cdot |b|$

(iv) $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}, b \neq 0$

(v) $|x| = a$ ہے مترادف ہے $x = a$ یا $x = -a$

☆ غیر مساوات کی علامات: $<, >, \leq, \geq$

☆ ایک متغیر x میں یک درجی غیر مساوات: $ax + b < 0, a \neq 0$

☆ غیر مساوات کی خصوصیات:

(a) عملاتی خاصیت

اگر $a, b \in \mathbb{R}$ تو $a > b$ یا $a = b$ یا $a < b$

(b) خاصیت تعدیت

$a > b$ اور $b > c \Rightarrow a > c$

(c) ضربی خاصیت

(i) $a > b, c > 0, \Rightarrow ac > bc$ اور $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

(ii) $a > b, c < 0, \Rightarrow ac < bc$ اور $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

خطی یا لائن (لینئر) گراف اور اس کے مستعملات

(LINEAR GRAPH AND ITS APPLICATIONS)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

- 8.1 تعارف (Introduction)
- 8.2 کارتیسی مستوی (Cartesian Plane)
- 8.3 گراف میں باہم معکوس تبدیلی (Conversion Graphs)
- 8.4 دو متغیراتی خطی (لینئر) مساواتوں کا گرافیکل حل
- (Graphical Solution of Linear Equations in Two Variables)
- یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

یونٹ کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت تک نامکمل سمجھا جائے گا جب تک ہر طالب علم درج ذیل تصورات کو ہو بہو بیان کرنے پر علمی دسترس حاصل نہ کر لے:

- ☆ دو حقیقی نمبرز x اور y کے جوڑے (x, y) کی بطور مرتب جوڑا (ordered pair) کی پہچان کر سکے۔
- ☆ مثالوں کی مدد سے مرتب جوڑوں کی باہم شناخت کر سکے۔
- ☆ دو باہم عمودی خطوط میں سے ایک افقی اور دوسرا اسی مشترک نقطہ O سے گزرنے کی مدد سے کارتیسی (cartesian) یا مستطیلی (rectangular) مستوی کی تعریف کر سکے۔
- ☆ کارتیسی نظام (system) کو ظاہر کرتے ہوئے ذہن نشین کر سکے:
 - (i) افقی خط کو x - ایکسز (x - axis) یا x - محور سے ظاہر کرنا
 - (ii) راسی خط کو y - ایکسز (y - axis) یا y - محور سے ظاہر کرنا
 - (iii) مشترک نقطہ O کو مبدا (origin) کے حوالہ سے سمجھنا

☆ مترتب جوڑے (a, b) کی مناسبت سے مستوی میں نقطہ $P(a, b)$ کی نشاندہی کرنا جس میں
(i) حقیقی نمبر a کی نقطہ $P(a, b)$ میں x -محدد (abscissa) یا x -کوآرڈینیٹ
(x -coordinate) سے پہچان کرنا۔

(ii) حقیقی نمبر b کو نقطہ $P(a, b)$ میں y -محدد (ordinate) یا y -کوآرڈینیٹ
(y -coordinate) سے یاد رکھنا۔

☆ کارٹیسی مستوی میں نقاط کی مدد سے جیومیٹری کی مختلف اشکال مثلاً قطعہ خط (line-segment)،
تکون یا مثلث (triangle) اور مستطیل (rectangle) کی تشکیل کرنا۔

☆ دیے ہوئے خط مستقیم یا اس کی مساوات (equation) کی مدد سے اس پر نقاط کے x -محور اور
 y -محور کا جدول تیار کرنا جو مساوات کا حل سیٹ ہوں۔

☆ حل سیٹ کے مترتب جوڑوں کے نقاط کو مستوی میں ظاہر کرنا۔

☆ تشکیل کے لیے مناسب یونٹ انتخاب کرنا تاکہ ذرائع کے مطابق مساوات کا گراف حاصل ہو سکے۔

☆ مندرجہ ذیل مساواتوں کی اقسام کے گراف کی تشکیل دینا:

● ایک مخصوص حقیقی نمبر ہو $c \cdot y = c$

● ایک مخصوص حقیقی نمبر ہو $a \cdot x = a$

● ایک مخصوص حقیقی نمبر ہو $m \cdot y = mx$

● $m \cdot y = mx + c$ اور c دونوں مستقل حقیقی نمبر ہوں

☆ جدول میں دیے ہوئے مترتب جوڑوں کی مدد سے گراف تشکیل دینا۔

☆ عملی زندگی سے وابستہ مسائل کو حل کرنے کا شعور حاصل کرنا۔

☆ دی ہوئی دو متغیراتی مساوات میں x اور y کی قیمتوں میں ڈائریکٹ تناسب کے اعتبار سے باہم تبدیلی کی

وضاحت کرنا۔

☆ گراف کی مدد سے دیے ہوئے x سے y یا دیے ہوئے y سے x کا باہم مطالعہ کرنا۔

☆ دو متغیرات x اور y کی مساوات کے حل سیٹ کی مدد سے مندرجہ ذیل کی مساوات اور گراف بنانا اور

ان گراف کو معکوس کنورژن گراف (conversion graph) میں بدلنا اور مطالعہ کرنا۔

● میل اور کلومیٹر کے درمیان

- ایکڑ اور ہیکٹر کے درمیان
 - سیلیسیس اور فارن ہائیٹ ڈگری کے درمیان
 - پاکستانی کرنسی اور کوئی دوسری کرنسی وغیرہ کے درمیان
- ☆ دو متغیرات x اور y میں دو خطی لینیئر مساواتوں کو گراف کی مدد سے حل کرنا۔

8.1 کارٹیسی مستوی اور خطی یا لینیئر گراف

8.1.1 حقیقی نمبرز کا ایک مترتب جوڑا

دو حقیقی نمبرز x اور y کا ایک جوڑا (x, y) مترتب جوڑا کہلاتا ہے۔ جس میں اس کے ارکان x اور y

کو ایک مقررہ خاص ترتیب یا اصول کے مطابق درج کیا گیا ہو۔

مثلاً (x, y) ایک ایسا مترتب جوڑا ہے جس میں پہلا رکن x اور دوسرا رکن y ہے۔ اگر $x \neq y$ ہو تو

$(x, y) \neq (y, x)$ پس $(2, 3)$ اور $(3, 2)$ دونوں ایک دوسرے سے مختلف مترتب جوڑے ہیں۔

اگر $(x, y) = (m, n)$ ہو تو $x = m$ اور $y = n$ ہونا ضروری ہوگا۔

8.1.2 مترتب جوڑے کی شناخت

ایک کلاس روم میں ایک طالب علم کی سیٹ ایک مترتب جوڑے کی واضح مثال ہے۔ اگر طالب علم A کلاس میں

طلبہ کی تیسری لائن کی پانچویں نشست پر بیٹھا ہے تو اس کی نشست ایک مترتب جوڑے $(3, 5)$ کو ظاہر کرتی ہے۔ جس میں 3

اس لائن کا تعددی نمبر ہے اور 5 اس لائن میں سیٹ نمبر کو ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح مترتب جوڑا $(4, 3)$ ایسی سیٹ کی نشاندہی کرتا ہے جس پر طالب علم B کی کمرہ امتحان میں چوتھی قطار اور

تیسرے کالم یا چوتھی قطار کی تیسری نشست کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

8.1.3 کارٹیسی مستوی (Cartesian Plane)

کارٹیسی مستوی ایک ایسی مستوی ہے جو سیٹ $R \times R = \{(x, y) \mid x, y \in R\}$ کے مترتب جوڑوں اور

کارٹیسی مستوی کے نقاط کے درمیان $(1-1)$ کا تعلق قائم رکھتی ہے۔

مستوی میں دو باہم عمودی خطوط مستقیم کھینچے جاتے ہیں جن کو کوارڈینیٹ محور کہا جاتا ہے۔ نقطہ $O(0, 0)$ کو مستوی کا

مبدأ (origin) کہتے ہیں جہاں دونوں باہم عمودی خطوط مستقیم ملتے ہیں۔

کارٹیسی مستوی کو کوارڈینیٹ (coordinate) مستوی بھی کہتے ہیں۔ کارٹیسی مستوی میں نقاط کے محدودات


x اور y کو نقاط کے کوارڈینیٹ اسی لیے کہا جاتا ہے۔

8.1.4 مبدا اور کوآرڈینیٹ محور کی نشاندہی

افقی خط مستقیم 'XOX' کو x -محور اور عمودی خط مستقیم YOY' کو y -محور کہا جاتا ہے۔

نقطہ O جہاں دونوں x -محور اور y -محور


باہم ملتے ہیں مبدا کہلاتا ہے اور اسے نقطہ $O(0, 0)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



یہ بات عیاں ہے کہ مستوی کا ہر نقطہ x -محور یا y -محور پر ہوتا ہے یا دیے ہوئے مستوی کے چار ربع (quadrants) XOY، YOX، X'OY' اور Y'OX میں سے کسی ایک ربع میں ہوتا ہے۔ جن کو بالترتیب پہلا ربع، دوسرا ربع، تیسرا ربع اور چوتھا ربع کہتے ہیں۔

دونوں کوآرڈینیٹ محور مستوی کو چار ربع میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کو بالترتیب Q-I، Q-II، Q-III اور Q-IV سے ظاہر کرتے ہیں۔


نقاط (x, y) کے کوآرڈینیٹ کی ربع سکیم کو نیچے شکل میں ظاہر کیا گیا ہے



- مثلاً
- 1- نقطہ $(-3, -1)$ تیسرے ربع Q-III میں واقع ہے۔
 - 2- نقطہ $(2, -3)$ چوتھے ربع Q-IV میں واقع ہے۔
 - 3- نقطہ $(2, 5)$ پہلے ربع Q-I میں واقع ہے۔
 - 4- نقطہ $(2, 0)$ x -محور یا x -ایکسر پر واقع ہے۔

8.1.5 مرتب جوڑا (a, b) کا مستوی میں مطابقتی نقطہ $P(a, b)$ کو معلوم کرنا

فرض کیا (a, b) سیٹ $R \times R$ کا ایک مرتب جوڑا ہے۔



اوپر کے حوالہ سسٹم (reference system) میں حقیقی نمبر a کو x -محور پر مبدا O سے $a = OA$ اکائیاں OX کی سمت ناپا (اگر $a > 0$) ہو اور حقیقی نمبر b کو y -محور پر مبدا O سے $b = OB$ اکائیاں OY کی سمت ناپا (اگر $b > 0$) ہو۔ x -محور کے متوازی ایک خط مستقیم کھینچا۔ اسی طرح A سے y -محور کے متوازی ایک خط مستقیم کھینچا۔ دونوں خطوط ایک دوسرے کو نقطہ P پر مل گئے۔ وہ نقطہ ہے جو مرتب جوڑے (a, b) کا مستوی میں مطابقتی نقطہ $P(a, b)$ ہے۔

اوپر گراف میں $x = 2$ اور $y = 3$ لیا گیا ہے جس سے مرتب جوڑے $(2, 3)$ کا مطابقتی نقطہ $P(2, 3)$ ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی مرتب جوڑے کا نقطہ اور مستوی میں اس کے کوآرڈینیٹ معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

نقطہ $P(x, y)$ میں x -کوآرڈینیٹ کو اَبسیسا (abscissa) کہا جاتا ہے اور y -کوآرڈینیٹ کو (ordinate)

مانا جاتا ہے۔

1- مستوی کے ہر نقطہ P کی شناخت اس کے مرتب جوڑے (x, y) کے محددات x اور y سے ہوتی ہے اور اسے $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

2- مستوی کے وہ نقاط جن میں $y = 0$ ، تمام x -محور پر ہیں۔ یعنی $P(-2, 0)$ x -محور پر ہے۔

3- مستوی کے تمام وہ نقاط جن میں $x = 0$ ہو، y -محور پر ہوں گے۔ جیسے نقطہ $Q(0, 3)$ y -محور پر ہے۔


8.1.6 کارٹیس مستوی میں جیومیٹری کی مختلف اشکال کی تشکیل

جیومیٹری کی کسی بھی شکل کی تشکیل سے پہلے ہم نقاط کے ایک ہی خط کے ہم خط ہونے کا خیال اور تعریف یا وضاحت کریں گے۔

(a) قطعہ خط (Line-Segment)

مثال 1 فرض کیجیے کہ $P(2, 2)$ اور $Q(6, 6)$ مستوی کے دو

نقاط ہیں۔



1- سامنے شکل میں دونوں نقاط کو مستوی پر ظاہر کیا گیا ہے۔

2- نقاط P اور Q کو سیدھا ملانے سے قطعہ خط PQ بنتا ہے

اور اسے \overline{PQ} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو ان تمام نقاط کو


ظاہر کرتا ہے جو قطعہ خط PQ پر واقع ہیں۔

مثال 2 دو نقاط $P(2, 2)$ اور $Q(6, 2)$ کو مستوی پر ظاہر

کیا گیا۔ P اور Q کو باہم ملانے سے ہم نے قطعہ خط PQ

حاصل کیا جو کہ x-محور کے متوازی قطعہ خط ہے، کیونکہ P

اور Q دونوں نقاط کے y-کوآرڈینیٹ برابر ہیں۔




مثال 3 دو نقاط $P(3, 2)$ اور $Q(3, 7)$ کو مستوی پر


ظاہر کیا۔ دونوں نقاط P اور Q کو باہم ملانے سے قطعہ

خط PQ کو y-محور کے متوازی حاصل کیا۔ سامنے

شکل میں دونوں نقاط کے x-کوآرڈینیٹ


(coordinates) برابر ہیں۔






(Triangle) مثلث (b)

مثال 1 تین نقاط $P(3, 2)$ ، $Q(6, 7)$ اور $R(9, 3)$ کو مستوی پر ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ P کو نقاط Q اور R سے ملانے اور Q کو R سے ملانے سے ایک مثلث PQR تشکیل دی۔



مثال 2 دیے ہوئے تین نقاط $O(0, 0)$ ، $P(3, 0)$ اور $R(3, 3)$ کو مستوی پر ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ $O(0, 0)$ کو نقاط P اور R سے ملانے سے ایک مثلث OPR تشکیل دی جو سامنے شکل سے ظاہر ہے۔



(Rectangle) مستطیل (c)

مثال 1 دیے ہوئے چار نقاط $Q(2, 0)$ ، $P(2, 3)$ اور $R(-2, 3)$ کو مستوی پر ظاہر کیا۔ نقطہ P کو Q اور R سے ملانے، نقاط Q اور R کو نقطہ S سے ملانے پر ایک مستطیل $PQSR$ حاصل ہوتی ہے۔ 2 (مربع کے ضلع کی لمبائی) $y =$ یونٹ

8.1.7 دو متغیراتی لیئر مساوات کے جوڑوں کے محدودات کا جدول (Construction of Table for Pair of Values Satisfying a Linear Equation in two Variables)

دی ہوئی مساوات اگر،

$$2x + y = 1 \quad (i)$$

تو مرتب جوڑے جو مساوات (i) پر واقع ہیں کو حاصل کرنے کے لیے مساوات (i) کو درج ذیل مساوات (ii) میں تبدیل کرنا ہوگا۔

$$y = -2x + 1$$

(ii)

وہ جوڑے (x, y) جو مساوات (ii) پر ہیں نیچے جدول میں درج کیے جاتے ہیں:


x	y	(x, y)
-1	3	(-1, 3)
0	1	(0, 1)
1	-1	(1, -1)
3	-5	(3, -5)

اگر $x = -1$ ہو تو، $y = (-2)(-1) + 1 = 2 + 1 = 3$ ہے۔
اگر $x = 0$ ہو تو، $y = (-2)(0) + 1 = 0 + 1 = 1$ ہے۔
اگر $x = 1$ ہو تو، $y = (-2)(1) + 1 = -2 + 1 = -1$ ہے۔
اگر $x = 3$ ہو تو، $y = -6 + 1 = -5$ ہے۔

پس اسی طرح تمام نقاط کو حاصل کیا جاسکتا ہے جو مساوات (i) پر واقع ہیں۔

8.1.8 تمام نقاط کو مستوی پر ظاہر کرنے کے بعد گراف حاصل کرنا

جدول میں جوڑوں کو مستوی میں ظاہر کرنے کے ان کو باہم ملانے سے ہم دی ہوئی مساوات کا گراف حاصل کرتے ہیں۔
مساوات $y = -2x + 1$ کا گراف نیچے شکل میں دکھایا گیا ہے۔



8.1.9 گراف کی سکیل

ضرورت پڑنے پر مساوات کے سکیل کو اپنی آسانی کے مطابق لیا جاسکتا ہے مثلاً 1 cm کو 5 cm یا گراف پیپر سے 1 چھوٹا مربع کے ضلع کی لمبائی کو 10 یا 5 میٹر بھی یونٹ لیا جاسکتا ہے۔

سکیل یونٹ کا انتخاب کرتے ہوئے پیپر شیٹ کی جسامت ذہن میں رہے تاکہ گراف شیٹ پر ظاہر کیا جاسکے۔ بعض دفعہ ایک ہی سکیل دونوں x اور y کے لیے بھی مناسب لگتا ہے اور بعض دفعہ x اور y دونوں کے لیے مختلف سکیل بھی لیے جاسکتے ہیں جو x اور y کے محدودات کی قیمتوں پر انحصار رکھتے ہیں۔

8.1.10 نیچے دی ہوئی مساواتوں کی اقسام کے گراف کی تشکیل

(a) جبکہ $y = c$ ایک حقیقی نمبر ہے۔

(b) جبکہ $x = a$ ایک حقیقی نمبر ہے۔

(c) جبکہ $y = mx$ ایک حقیقی نمبر ہے۔

(d) جبکہ $y = mx + c$ اور m اور c دونوں مختلف حقیقی نمبر ہیں۔

اوپر دی ہوئی مساواتوں کے گراف کی تشکیل سے مراد ان کے ان نقاط کو مستوی میں ظاہر کرنا اور پھر ان نقاط کو باہم ملا کر ان کے گراف کی تشکیل حاصل کرنا ہے۔

(a) مستوی میں مساوات، $y = c$ ، نیچے دیے ہوئے نقاط کے سیٹ

$$S = \{(x, c) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$


کو ظاہر کرتی ہے جو اس پر واقع یا ہم خط ہیں۔

نیچے دی ہوئی مثال سے اس کے طریقے کی وضاحت کی جاتی ہے۔


اگر $y = 2$ ایک مساوات ہو تو سیٹ S کے نقاط کو نیچے جدول میں درج کیا گیا ہے۔ جیسا کہ

x	-3	-2	-1	0	1	2
y	2	2	2	2	2	2	2	2

سیٹ S کے نقاط کو نیچے مستوی میں ظاہر کیا گیا ہے اور ان نقاط کو باہم ملانے سے گراف کی شکل دی گئی ہے۔



اسی طرح مساوات $y = -4$ کا گراف ظاہر کیا گیا ہے۔



پس مساوات $y = c$ کی قسم کی تمام مساواتوں کے گراف کچھ یوں مشاہدہ میں آتے ہیں:

- (i) گراف ایک سیدھی لائن ہے۔
- (ii) گراف کی سیدھی لائن $-x$ محور کے متوازی ہے۔
- (iii) گراف کی لائن $-x$ محور کے اوپر c یونٹس کے فاصلہ پر ہے جبکہ $c > 0$ ہو۔
- (iv) گراف کی لائن $-x$ محور کے نیچے c یونٹس کے فاصلہ پر ہے اگر $c < 0$ ہے جیسا کہ، مثال $y = -4$ ظاہر ہے۔

(v) گراف کی لائن $-x$ محور ہی ہوگی اگر $c = 0$ ہو۔

(b) مستوی میں مساوات $x = a$ نیچے دیے ہوئے نقاط کے سیٹ،

$$S = \{(a, y) : y \in \mathbb{R}\}$$

کو ظاہر کرتی ہے جو دی ہوئی مساوات $x = a$ پر واقع یا ہم خط ہیں۔

سیٹ S کے نقاط کو نیچے جدول میں درج کرتے ہیں۔

x	a	...							
y	...	-2	-1	0	1	2	3	4	...

سیٹ S کے جن نقاط کو ہم مستوی پر ظاہر کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

$$S = \{..., (a, -2), (a, -1), (a, 0), (a, 1), (a, 2), ...\}$$


نقطہ $(a, 0)$ مساوات $x = a$ کا نقطہ ہے جو $-x$ محور پر واقع ہے جبکہ

نقطہ (a, y) $-x$ محور سے اوپر ہے اگر $y > 0$ اور $-x$ محور کے نیچے اگر $y < 0$ ہو۔


نقاط کو باہم ملانے سے ہم لائن کا مطلوبہ گراف حاصل کرتے ہیں۔
 تفصیل کے ساتھ وضاحت نیچے مثال میں دی جائے گی۔
 اگر مساوات $x = 2$ ہو تو اس کے نقاط کو نیچے جدول میں ظاہر کیا گیا ہے۔

x	2	2	2	2	2	2	... 2 ...
y	...	-2	-1	0	1	2	...

پس مساوات $x = 2$ کا گراف مستوی پر ظاہر کیا گیا ہے۔



اسی طرح مساوات $x = -2$ کا گراف بھی نیچے دکھایا گیا ہے۔



پس مساوات $x = a$ کے گراف سے ہم مشاہدہ سے اخذ کرتے ہیں کہ:
 (i) لائن گراف ایک سیدھی لائن ہے۔

- (ii) گراف $-y$ محور کے متوازی لائن ہے۔
 (iii) لائن گراف $-y$ محور کی دائیں طرف 'a' فاصلہ پر ہے اگر $a > 0$ ہے۔
 (iv) لائن گراف $x = -2$ ، $-y$ محور کے بائیں جانب 2 یونٹ کے فاصلہ پر ہے اگر $a < 0$ ہے۔
 (v) لائن گراف $-y$ محور ہے اگر $a = 0$

(c) مستوی میں مساوات $y = mx$ ($m \in \mathbb{R}$) کے نقاط کا سیٹ

$$W = \{(x, mx) : x \in \mathbb{R}\}$$

کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً

$$W = \{ \dots, (-2, -2m), (-1, -m), (0, 0), (1, m), (2, 2m), \dots \}$$


مرتب جوڑوں کی مطابقت میں سیٹ W کے نقاط نیچے جدول میں ظاہر کیے گئے ہیں۔

x	-2	-1	0	1	2
y	-2m	-m	0	m	2m

وضاحت کی خاطر ہم مساوات $y = x$ جبکہ $m = 1$ کو مثال بناتے ہیں تو نقاط کچھ یوں ظاہر کیے جائیں گے۔

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	-2	-1	0	1	2	...

نقاط کی مدد سے مساوات $y = x$ کا گراف نیچے دکھایا گیا ہے:



جدول کے مرتب جوڑوں سے نقاط $\dots, (-2, -2), (-1, -1), (0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots$ کو مستوی پر واقع ظاہر کیا گیا ہے۔ نقاط کو باہم ملانے سے گراف حاصل کیا۔ مشاہدہ سے مساوات $y = mx$ کے گراف کے بارے میں جانا کہ:

(i) گراف ایک سیدھی لائن ہے۔

(ii) لائن گراف مبدا $O(0, 0)$ سے گزرتی ہے۔

- (iii) لائن گراف میں $\frac{y}{x} = m$ ($x \neq 0$) لائن گراف x -محور کی طرف جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔
 (iv) لائن گراف مستوی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اگر $m = 1$ ہو تو یہ مساوات $y = x$ کا گراف ہوگا۔
 اگر $m = -1$ ہو تو مساوات $y = -x$ کا گراف ہوگا۔

(v) لائن گراف x -محور اور y -محور کو صرف مبدا پر ہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی نقطہ پر نہیں ملتی۔

(d) اس قسم میں ہم مساوات $y = mx + c$ جبکہ $m, c \neq 0$ کے گراف کے بارے میں جانیں گے
 مستوی میں مساوات کے مترتب جوڑوں کا سیٹ:

$$S = \{(x, mx + c) : m, c (\neq 0) \in \mathbb{R}\}$$


کے نقاط کو جدول میں نیچے ظاہر کیا گیا ہے:

x	0	1	2	3	x
y	c	m+c	2m+c	3m+c	mx+c

وضاحت کی خاطر ہم اس کو مثال کے طور پر زیر بحث لائیں گے جس میں $c = 1$ اور $m = 1$ لیا گیا ہے۔
 پس مساوات $y = x + 1$ کے گراف کے مترتب جوڑوں کو یوں نیچے جدول میں ظاہر کرتے ہیں:

x	... 0	1	2	3
y	... 1	2	3	4

جن کے مستوی میں نقاط $(0,1), (1,2), (2,3), (3,4), \dots$ وغیرہ کو ظاہر کر کے باہم ملانے سے نیچے گراف حاصل کیا گیا ہے۔



گراف کے مشاہدہ سے ہم مساوات $y = mx + c$ کے بارے میں جانتے ہیں کہ:

- (i) مساوات $y = mx + c$ کا گراف ایک سیدھی لائن کو ظاہر کرتا ہے۔
 (ii) لائن گراف مبدا $O(0,0)$ سے نہیں گزرتی۔
 (iii) لائن گراف مبدا سے c یونٹس کے فاصلہ پر y -محور کو ملتی ہے۔
 (iv) m جھکاؤ (slope) ہے مساوات $y = mx + c$ کی لائن گراف کا x -محور کی مثبت سمت میں۔

(v) اگر $c = 0$ ہو تو مساوات $y = mx$ یعنی مبدا (origin) $O(0, 0)$ سے گزرتی ہے۔

(vi) اگر $m = 0$ ہو تو لائن $y = c$ ، x -محور کے متوازی لائن ہے۔


8.1.11 دیے ہوئے جدول سے غیر تسلسل (Discrete) گراف بنانا

جدول کے مترتب جوڑوں کو مستوی کے نقاط میں ظاہر کرنا غیر تسلسل (discrete) گراف مانا جاتا ہے۔ یعنی نقاط کو باہم ملائے بغیر۔

مثال کے طور پر اگر نیچے دیے ہوئے جدول میں الگ الگ متغیرات x اور y کی قیمتیں درج ہوں جیسا کہ:

x	3	3	-3	-3
y	3	-3	3	-3

تو صرف مختلف نقاط ہی غیر تسلسل گراف کو ظاہر کرتے ہیں۔



8.1.12 حقیقی عملی زندگی کے مسائل کا حل

ہم اکثر گراف کے استعمال سے عملی زندگی کے مسائل سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گراف کی ہی مدد سے ہم مقداروں کے درمیان تعلق یا تعلق داری کو مساوات / مساواتوں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔

نیچے دی ہوئی مثال سے ہم عملی زندگی کے مسائل کے حل کے طریقہ کار کو گراف کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مثال مساوات $y = x + 16$ دو افراد کی عمروں کے درمیان متغیر x اور y کی تعلق داری سے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ

اگر ایک فرد کی عمر x ہے تو دوسرے کی عمر y کے تعلق کا گراف کھینچتے ہیں۔


حل ہم جانتے ہیں کہ

$$y = x + 16$$

مساوات کے نقاط کے اعتبار سے جدول کچھ یوں ظاہر کرتا ہے۔

x	0	4	8	12	16	...
y	16	20	24	28	32	...

x اور y کی قیمتوں کو پلاٹ کرنے سے اس مساوات کا گراف نیچے دی ہوئی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔



مشق 8.1

1- کوآرڈینیٹ مستوی (coordinate plane) کے ربع (quadrant) کا تعین کیجیے جن میں دیے ہوئے

نقاط واقع ہیں: P(-4, 3), Q(-5, -2), R(2, 2), S(2, -6)

2- نیچے دی ہوئی ہر مساوات کا گراف بنائیے۔

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| (i) $x = 2$ | (ii) $x = -3$ | (iii) $y = -1$ |
| (iv) $y = 3$ | (v) $y = 0$ | (vi) $x = 0$ |
| (vii) $y = 3x$ | (viii) $-y = 2x$ | (ix) $\frac{1}{2} = x$ |
| (x) $3y = 5x$ | (xi) $2x - y = 0$ | (xii) $2x - y = 2$ |
| (xiii) $x - 3y + 1 = 0$ | (xiv) $3x - 2y + 1 = 0$ | |

3- کیا دی ہوئی لائن (i) x -محور کے متوازی ہے (ii) y -محور کے متوازی ہے۔

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| (i) $2x - 1 = 3$ | (ii) $x + 2 = -1$ | (iii) $2y + 3 = 2$ |
| (iv) $x + y = 0$ | (v) $2x - 2y = 0$ | |

4- دی ہوئی مساواتوں کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمتیں معلوم کریں۔

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (a) $2x + 3y - 1 = 0$ | (b) $x - 2y = -2$ | (c) $3x + y - 1 = 0$ |
| (d) $2x - y = 7$ | (e) $3 - 2x + y = 0$ | (f) $2x = y + 3$ |

5- تصدیق کیجیے کہ کیا نیچے دیے گئے نقاط لائن $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہیں یا نہیں۔

- | | | |
|-------------|-------------|---------------|
| (i) (2, 3) | (ii) (0, 0) | (iii) (-1, 1) |
| (iv) (2, 5) | (v) (5, 3) | |

8.2 کنورشن گراف (Conversion Graphs)


8.2.1 کنورشن گراف کی وضاحت (To Interpret Conversion Graph)

یونٹ کے اس سیکشن میں ہم کنورشن (معکوس) گراف کو زیر مطالعہ لائیں گے۔ کنورشن گراف کی ایک لائن گراف کے طور پر وضاحت کریں گے جس میں دو مقدمات ایک دوسرے سے ڈائریکٹ پروپورشن (proportion) کے تعلق میں منسلک ہوتی ہیں۔

فرض کیجیے کہ $y = f(x)$ دو متغیرات x اور y کی ایک لائن مساوات ہے اور اس کے مترتب جوڑوں کے نقاط جو مساوات، $y = 3x + 3$ پر واقع ہیں نیچے جدول میں ظاہر کیے گئے ہیں۔

x	... 0	-1	-2 ...
y	... 3	0	-3 ...
(x, y)	... (0, 3)	(-1, 0)	(-2, -3) ...

ان مترتب جوڑوں کو مستوی پر ان کے نقاط $(0, 3)$ ، $(-1, 0)$ اور $(-2, -3)$ وغیرہ سے ظاہر کرنے کے بعد مساوات کے لائن گراف کی شکل حاصل کی:



8.2.2 دیے گئے گراف کا پڑھنا (Reading of a Given Graph)

مساوات $y = 3x + 3$ کے گراف کو اوپر ظاہر کیا گیا ہے۔

(i) مساوات $y = 3x + 3$ میں x کی کسی بھی حقیقی قیمت کے بالمقابل y کی قیمت معلوم کی جاسکتی ہے۔

(ii) y کی ایک مقدار کے بالمقابل ہم اس طرح x کی مقدار کو مساوات $x = \frac{1}{3}y - 1$ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔

(iii) مساوات $x = \frac{1}{3}y - 1$ کا گراف مساوات $y = 3x + 3$ کے گراف کا کنورشن گراف سمجھا جاتا ہے۔

اس گراف کو پہلے گراف کا کنورژن گراف کہتے ہیں جب کہ ہم نیچے دی ہوئی مساوات $y = 3x + 3$ کو $x = \frac{1}{3}y - 1$ میں تبدیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ

$$y = 3x + 3$$

$$\Rightarrow y - 3 = 3x + 3 - 3$$


$$\Rightarrow y - 3 = 3x \quad \text{یا} \quad 3x = y - 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{3}y - 1, \quad \text{یہاں } x \text{ کو } y \text{ کے حوالہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔}$$

جس میں جدول میں x کی قیمتیں y کی مدد سے حاصل کی گئی ہیں۔

y	... 3	0	6 ...
x	... 0	-1	1 ...
(y, x)	... (3, 0)	(0, -1)	(6, 1) ...

پس کنورژن گراف x کا y کی مدد سے نیچے شکل میں ظاہر ہے:



8.2.3 کنورژن گراف کا مطالعہ (Reading the Conversion Graph)

مثال (a) کلومیٹر (Km) اور میل (Mile) گراف

کلومیٹر (Km) اور میل (Mile) کے درمیان باہم گراف تشکیل دینے کے لیے ہم درج ذیل میں ان کی مقداروں کے درمیان تعلق کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$1 \text{ کلومیٹر} = 0.62 \text{ میل (قریباً)}$$

$$\text{اور} \quad 1 \text{ میل (قریباً)} = 1.6 \text{ کلومیٹر}$$


(i) میل کو کلومیٹر کے خلاف مساوات کی وساطت میں یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = 0.62x$$

اگر x ایک کلومیٹر ہو اور y ایک میل تو ہم ان کے مترتب جوڑوں (x, y) کا جدول نیچے ظاہر کرتے ہیں:

x	0	1	2	3	4 ...
y	0	0.62	1.24	1.86	2.48 ...

مساوات $y = 0.62x$ کے مترتب جوڑوں (x, y) کو کارٹیس مستوی میں نیچے شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ نقاط کو باہم ملانے سے مطلوبہ گراف حاصل ہوتا ہے۔




(ii) کنورشن گراف کے مطابق اگر میل کو x - ایکسز پر اور کلومیٹر کو y - ایکسز پر ظاہر کیا جائے تو مساوات قریباً یوں ظاہر کی جاسکتی ہے۔

$$y = 1.6x \text{ (قریباً)}$$

مندرجہ ذیل جدول میں x اور y کی متناسب قیمتیں یوں درج کرنے سے

x	0	1	2	3	4 ...
y	0	1.6	3.2	4.8	6.4 ...

مستوی میں مرتب جوڑوں $(0,0)$ ، $(1,1.6)$ ، $(2,3.2)$ ، $(3,4.8)$ اور $(4,6.4)$ کے نقاط کو ظاہر کرنے اور ان کو باہم ملانے سے مطلوبہ گراف حاصل ہوگا۔ جو نیچے شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔



(b) ہیکٹر اور ایکڑ کا کنورشن معکوس گراف (Conversion Graph of Hectors and Acres)

(i) ہیکٹر اور ایکڑ کی مساوات ان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔

$$1 \text{ ہیکٹر} = \frac{640}{259} \text{ ایکڑ}$$

$$= 2.5 \text{ ایکڑ (قریباً)}$$

اگر ہیکٹر کو x اور ایکڑ کو y سے ظاہر کیا جائے تو ان کے باہمی تعلق کی مساوات

$$y = 2.5x$$


لکھی جائے گی۔

مرتب جوڑے $(0,0)$ ، $(1,2.5)$ ، $(2,5)$ ، $(3,7.5)$ ، $(4,10)$ ،

مساوات $y = 2.5x$ کی مطابقت میں درج ذیل جدول میں ترتیب سے ظاہر ہیں:

x	0	1	2	3	4 ...
y	0	2.5	5.0	7.5	10 ...

مستوی پر اوپر دیے مترتب جوڑوں کے نقاط ظاہر کرنے اور ان کو باہم ملانے سے گراف لائن حاصل ہوتی ہے۔ اس کو نیچے شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔



(ii) اب ہم گراف (i) کا معکوس یا کنورژن گراف کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 1 \text{ Acre} &= \frac{1}{2.5} \text{ Hectare (ہیکٹر)} \\ &= \frac{10}{25} \text{ Hectare} \\ &= 0.4 \text{ Hectare (قریباً)} \end{aligned}$$

اگر ایکڑ کو x - ایکسز پر اور ہیکٹر کو y - ایکسز پر ظاہر کیا جائے تو مساوات


$$y = 0.4x$$

کی مدد سے مترتب جوڑے نیچے جدول میں یوں ظاہر کرنے سے

x	0	1	2	3 ...
y	0	0.4	0.8	1.2 ...

مستوی پر نقاط $(0, 0)$, $(1, 0.4)$, $(2, 0.8)$, $(3, 1.2)$ ظاہر کرنے کے بعد ان کو باہم ملانے سے مطلوبہ گراف حاصل ہوتا ہے۔

گراف b(ii) گراف b(i) کا کورشن گراف ہے۔



(c) ڈگری سیلسیس (Degree Celsius) اور ڈگری فارن ہائیٹ (Degree Fahrenheit) کا باہمی
مکھوں گراف

(i) ڈگری سیلسیس (C) اور ڈگری فارن ہائیٹ (F) کے درمیان تعلق مندرجہ ذیل مساوات کے تحت ہے۔

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

اگر $C = 0$

$$F = \frac{9}{5} \times 0 + 32 = 0 + 32 = 32$$

اس طرح اگر $C = 10, 20, \dots, 100$

$$F = \frac{9}{5} \times 10 + 32 = 18 + 32 = 50$$


$$F = \frac{9}{5} \times 20 + 32 = 36 + 32 = 68$$

$$F = \frac{9}{5} \times 100 + 32 = 180 + 32 = 212$$

C اور F کی قیمتوں کو جدول میں یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔

C	0°	10°	20°	50°	100° ...
F	32°	50°	68°	122°	212° ...

F° کا گراف بحوالہ C° یوں ظاہر کیا جاتا ہے



$10^\circ = 1$ چھوٹا مربع کے ضلع کی لمبائی

گراف کی مدد سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ

$$C = 30^\circ \text{ تو } F = 86^\circ \quad \text{(i)}$$

$$C = 40^\circ \text{ تو } F = 104^\circ \quad \text{(ii)}$$

(iii) اب ہم C کو F میں ظاہر کرتے ہیں جو مساوات ذیل میں ظاہر کرتے ہیں۔

$$C = \frac{5}{9} (F - 32) \quad \text{جیسا کہ}$$

$$\text{اگر } F = 68^\circ \text{ اور } F = 176^\circ \text{ ہو تو}$$

$$C = \frac{5}{9} (68 - 32) = \frac{5}{9} \times 36 = 20^\circ$$

$$C = \frac{5}{9} (176 - 32) = \frac{5}{9} (144) = 5 \times 16 = 80^\circ \text{ اور}$$

اگر معلوم کرنا مقصود ہو کہ سیلسیس اور فارن ہائیٹ ڈگری کی قیمت برابر کب ہوگی تو مساوات $F = \frac{9}{5} C + 32$ میں $F = C$ درج کرنے سے

$$C = \frac{9}{5} C + 32$$

$$\Rightarrow \left(\frac{9}{5} - 1\right) C = -32$$

$$\Rightarrow \frac{4}{5} C = -32 \Rightarrow C = \frac{-32 \times 5}{4} = -40$$

$$F = \frac{9}{5} \times (-40) + 32$$

$$= 9(-8) + 32$$

$$= -72 + 32 = -40$$

$$-40^\circ \text{C} = -40^\circ \text{F}$$

تصدیق کی خاطر

پس

(d) پاکستانی کرنسی اور امریکن US \$ کا کنورشن یا معکوس گراف

پاکستانی اخبار دی نیوز (The News) کے مطابق پاکستانی کرنسی روپے کا امریکن کرنسی US \$ کی تبدیلی کے تعلق کی مساوات یوں ظاہر کی گئی

$$1 \text{ US } \$ = 66.46 \text{ روپے}$$

اگر پاکستانی کرنسی y اور x US \$ ہو تو اوپر والی مساوات کو نیچے ظاہر کیا جاتا ہے۔


$$y = 66.46 x \approx 66x \quad \text{(قریباً)}$$

تبدیلی گراف کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی قیمتوں کو جدول میں یوں درج کرتے ہیں:

x	1	2	3	4 ...
y	66	132	198	264 ...

مترتب جوڑوں (x, y) کو اوپر جدول کی قیمتوں کے مطابق نقاط کو مستوی میں ظاہر کرنے اور باہم ملانے سے گراف کو تشکیل دیا گیا ہے۔

یہ لائن گراف پاکستانی کرنسی روپے کو US \$ کرنسی کے مقابلہ میں ظاہر کرتی ہے۔



اس کا معکوس گراف بحوالہ مساوات

$$x = \frac{1}{66}y \text{ یا } y = 66x$$

حاصل کیا جاسکتا ہے صرف x- ایکسز (axis) اور y- ایکسز (axis) کو باہم تبدیل کرنے سے۔

مشق 8.2

1- لٹر (litre) اور گیلن (gallon) کے درمیان مقداری مساوات، 2 گیلن = 9 لٹر کا گراف بنائیے۔ جبکہ

لٹر کو افقی اور گیلن کو راسی خط میں ظاہر کیا گیا ہو۔ مزید گراف کی مدد سے

(i) 18 لٹر میں گیلنوں کی

(ii) 8 گیلن میں لٹر کی مقدار بتائیے۔

2- 15 مارچ 2008 کے دن پاکستانی کرنسی روپے اور سعودی ریال کے آپسچھ فارمولے کے مطابق

روپے $1 = 16.70$ ریال تھا۔ ان کو گراف کی مدد سے ظاہر کیجیے۔ جبکہ x کو ریال سمجھا جائے اور پاکستانی روپے کو

y تو مساوات $y = 16.70x$ کا کنورشن گراف بنائیے۔

3- مندرجہ ذیل مساواتوں کے لائن گراف بنائیے۔

- (a) $x - 3y + 2 = 0$ (b) $3x - 2y - 1 = 0$ (c) $2y - x + 2 = 0$
 (d) $y - 2x = 0$ (e) $3y - 1 = 0$ (f) $y + 3x = 0$
 (g) $2x + 6 = 0$

4- مندرجہ ذیل مساواتوں کے گراف کی تشکیل کیجیے۔

- (i) کلومیٹر 1 = 1.6 میل (ii) 0.4 ہیکٹر = 1 ایکڑ
 (iii) $F = \frac{9}{5}C + 32$ (iv) 1 روپیہ = $\frac{1}{86}$ \$

8.3 دی ہوئی دو متغیراتی مساواتوں کو گراف کی مدد سے باہم حل کرنا

(Graphical Solution of Linear Equations in Two Variables)

ہم یہاں دو لینیئر مساواتوں کو گراف کی مدد سے باہم حل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔
 دو مساواتیں فرضی درج کیں۔

$$2x - y = 3, \quad \dots\dots (i)$$

$$x + 3y = 3. \quad \dots\dots (ii)$$

ان دونوں مساواتوں میں x اور y کی ان قیمتوں کے نقاط کو جدول میں ترتیب دیا۔
 مساواتوں کی قیمتوں کے جدول:


$$y = 2x - 3$$

$$y = -\frac{1}{3}x + 1$$

x	... 0	1.5 ...
y	... -3	0 ...

x	... 0	3 ...
y	... 1	0 ...

الگ الگ جدول کے نقاط کو ظاہر کر کے اور ان کو ملا کر گراف تیار کر لیے جیسے نیچے ظاہر کیے گئے ہیں۔



جہاں دونوں گراف لائن l اور l' باہم ملتی ہیں وہی نقطہ ان کا واحد حل ہے۔

پس نقطہ $R(1.7, 0.4)$ کے محددات، $x = 1.7$ اور $y = 0.4$ حل کو ظاہر کرتے ہیں۔

مندرجہ ذیل دو مساواتوں کو گراف کی مدد سے حل کیجیے۔

$$x + 2y = 3, \quad \dots\dots(i)$$

$$x - y = 2. \quad \dots\dots(ii)$$

دونوں مساواتوں (i) اور (ii) کے گراف مستوی پر ظاہر کیجیے۔ ان کے ان نقاط کی مدد سے جو x -محور اور y -محور کے ساتھ مشترک ہیں۔

دونوں مساواتوں (i) اور (ii) کے الگ الگ دونوں محوروں کے مشترک نقاط کے جدول تیار کیے:

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$y = x - 2$$

x	... 0	3 ...
y	... 1.5	0 ...

x	... 0	2 ...
y	... -2	0 ...

مساوات (i) کے نقاط $P(0, 1.5)$ اور $Q(3, 0)$ کو مستوی پر ظاہر کیا اور ان کو ملانے سے اس کا

گراف لائن حاصل کیا


$$l : x + 2y = 3$$

اسی طرح مساوات (ii) کا گراف لائن l' حاصل کیا۔

$$l' : x - y = 2$$

جو نقاط $P'(0, -2)$ اور $Q'(2, 0)$ کو مستوی پر ظاہر کرنے اور ان کو باہم ملانے سے حاصل کیا۔

جیسا کہ نیچے شکل میں ظاہر کیے گئے ہیں:



گراف لائن l اور l' کا مشترک نقطہ $S(2.3, 0.3)$ ہی مطلوبہ حل ہے۔

8.3 مشق

مندرجہ ذیل مساواتوں کے جوڑوں کو گراف کی مدد سے باہم حل کیجیے۔

1. $x + y = 0$ ، $2x - y + 3 = 0$

2. $x - y + 1 = 0$ ، $x - 2y = -1$

3. $2x + y = 0$ ، $x + 2y = 2$

4. $x + y - 1 = 0$ ، $x - y + 1 = 0$

5. $2x + y - 1 = 0$ ، $x = -y$

اعادہ مشق 8

1- دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) اگر $(x - 1, y + 1) = (0, 0)$ ہو تو (x, y) برابر ہے:

- (a) (1, -1) (b) (-1, 1) (c) (1, 1) (d) (-1, -1)

(ii) اگر $(x, 0) = (0, y)$ ہو تو (x, y) برابر ہے:

- (a) (0, 1) (b) (1, 0) (c) (0, 0) (d) (1, 1)

(iii) نقطہ $(2, -3)$ مستوی کے ربع میں ہے:

- (a) I (b) II (c) III (d) IV

(iv) نقطہ $(-3, -3)$ مستوی کے ربع میں ہے:

- (a) I (b) II (c) III (d) IV

(v) اگر $y = 2x + 1$ ، $x = 2$ ہو تو y برابر ہے:

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

(vi) کون سا نقطہ مساوات $y = 2x$ کے گراف پر واقع ہے؟

- (a) (1, 2) (b) (2, 1) (c) (2, 2) (d) (0, 1)

2- مندرجہ ذیل جملوں میں سے کون سے درست اور کون سے غلط ہیں؟

(i) نقطہ $O(0, 0)$ مستوی کے ربع II میں ہے؟

.....

(ii) نقطہ $P(2, 0)$ $-x$ محور پر ہے؟

.....

(iii) گراف لائن $x = -2$ راسی لائن ہے؟

.....

(iv) $3 - y = 0$ ایک افقی لائن ہے؟

.....

(v) نقطہ $Q(-1, 2)$ مستوی کے ربع III میں ہے؟

.....

(vi) نقطہ $R(-1, -2)$ مستوی کے ربع IV میں ہے؟

.....

(vii) لائن $y = x$ ایسی لائن ہے جس پر مبدا (origin) واقع ہے؟

.....

..... (viii) نقطہ $P(1, 1)$ لائن $x + y = 0$ پر واقع ہے؟

..... (ix) نقطہ $S(1, -3)$ مستوی کے ربع III میں واقع ہے؟

..... (x) نقطہ $R(0, 1)$ محور پر واقع ہے؟

3- مندرجہ ذیل نقاط کو گراف پیپر پر ظاہر کیجیے۔

$(-3, -3), (-6, 4), (4, -5), (5, 3)$

4- مندرجہ ذیل مساواتوں کے گراف تشکیل دیجیے۔

(i) $x = -6$

(ii) $y = 7$

(iii) $x = \frac{5}{2}$

(iv) $y = -\frac{9}{2}$

(v) $y = 4x$

(vi) $y = -2x + 1$

5- دی ہوئی مساواتوں کے گراف تشکیل دیجیے۔

(i) $y = 0.62x$

(ii) $y = 2.5x$

6- نیچے دی ہوئی مساواتوں کو گراف کی مدد سے باہم حل کیجیے۔

(i) $x + y = \frac{1}{2}$

$x - y = 1$

(ii) $2x - 3y = -6$

$x = 3y$

(iii) $\frac{1}{2}(x - y) = -1$

$\frac{1}{3}(x + y) = 2$

خلاصہ

- ☆ ایک مترتب جوڑا دو ارکان کا ایسا جوڑا ہے جس میں ارکان کو ایک خاص ترتیب میں درج کیا جائے۔
- ☆ مستوی جوڑا دو سیدھے خطوط سے بنتی ہے جب وہ ایک دوسرے پر عمود ہوں کارٹیس مستوی کہلاتی ہے۔ باہم عمودی خطوط کے جوڑے کو آرڈینیٹ خطوط (coordinate axes) کہتے ہیں۔
- ☆ مستوی کے باہم عمودی خطوط کے مشترک نقطے کو مبدا (origin) کہتے ہیں۔
- ☆ مترتب جوڑوں کے سیٹ اور کارٹیس مستوی کے نقاط میں (1-1) کی مطابقت ہوتی ہے۔
- ☆ کارٹیس مستوی چار ربعوں (quadrants) میں تقسیم کی جاتی ہے۔
- ☆ نقطہ (x, y) کے x - کو آرڈینیٹ (coordinate) کو اَبسیسا (abscissa) اور y - کو آرڈینیٹ کو آرڈینیٹ (ordinate) کہا جاتا ہے۔
- ☆ ایسے نقاط کا سیٹ جو ایک خط یا لائن پر ہوں کو لینیئر (collinear) نقاط کہلاتے ہیں۔

کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا تعارف

(INTRODUCTION TO COORDINATE GEOMETRY)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

9.1 تعارف (Introduction)

9.2 قطعہ خط کی لمبائی کا فارمولا (The Distance Formula)

9.3 ہم خط نقاط (Collinear Points)

9.4 درمیانی نقطہ فارمولا (Mid-Point Formula)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

یونٹ کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب ہر طالب علم درج ذیل تصورات کو ہو بہو بیان کرنے پر علمی دسترس حاصل کرے:

☆ کوآرڈینیٹ (coordinate) جیومیٹری کی تعریف کر سکے۔

☆ لمبائی کے فارمولا کا ثبوت دے سکے اور اس کی مدد سے کارتیسی مستوی کے دو نقاط کے درمیان فاصلہ کی لمبائی معلوم کر سکے۔

☆ لمبائی کے فارمولا کی مدد سے دو نقاط کے درمیان لمبائی کو ماپ سکے۔

☆ ہم خط نقاط کی تعریف کر سکے اور ہم خط اور غیر ہم خط نقاط میں فرق پہچان کر سکے۔

☆ لمبائی کے فارمولا سے دیے ہوئے تین یا تین سے زیادہ نقاط کو ہم خط ظاہر کر سکے۔

☆ فارمولا کی مدد سے ثابت کر سکے کہ تین غیر ہم خط نقاط مستوی میں ایک مثلث بناتے ہیں جن کے

• تینوں اضلاع کی لمبائیاں یکساں ہوں یعنی مثلث متساوی الاضلاع (An Equilateral Triangle)

• دو اضلاع کی لمبائیاں یکساں ہوں یعنی مثلث متساوی الساقین (An Isosceles Triangle)

• ایک زاویہ 90° کا ہو یعنی قائمہ زاویہ مثلث (A Right Angled Triangle)

• تینوں اضلاع کی لمبائیاں مختلف ہوں یعنی مختلف الاضلاع مثلث (A Scalene Triangle)

☆ فارمولا کی مدد سے ثابت کر سکے کہ چار غیر ہم خط نقاط سے چار اضلاع کی اشکال

● ایک مربع (A Square)

● ایک مستطیل (A Rectangle)

● ایک متوازی الاضلاع (A Parallelogram)

بنائی جاسکتی ہیں۔

☆ فارمولا کی پہچان کریں جو دو مختلف نقاط کے درمیانی نقطہ کو ظاہر کر سکے۔

☆ فارمولا کی مدد سے جیومیٹری کے نتائج کو حاصل کرنا یا تصدیق کرنا سمجھ سکے۔

9.1 فاصلہ کا فارمولا (Distance Formula)


9.1.1 کوآرڈینیٹ جیومیٹری (Coordinate Geometry)

ایک مستوی میں جیومیٹری کی اشکال کے مطالعہ کو مستوی یا پلین جیومیٹری کہتے ہیں۔ اسی طرح کوآرڈینیٹ جیومیٹری، جیومیٹری کی اشکال کے کارٹیسی مستوی میں مطالعہ کرنے کا نام ہے۔

ہم نے یونٹ (8) میں سیکھا ہے کہ دو باہم عمودی خطوط جو مبدا پر ملتے ہیں، مستوی کو چار ربعوں (quadrants) میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ سیٹ $R \times R$ کے مرتب جوڑوں اور مستوی کے تمام نقاط کے درمیان (1-1) کی مطابقت ہے۔

9.1.2 مستوی کے دو نقاط کے درمیان فاصلہ کے فارمولا کا حصول

(Finding Distance Between two Points)



اگر $P(x_1, y_1)$ اور $Q(x_2, y_2)$ کوآرڈینیٹ

(coordinate) مستوی یا پلین میں دو نقاط ہوں اور حقیقی

نمبر d کو قطعہ خط PQ کی لمبائی مان لیا جائے یعنی، $|PQ| = d$

تو قطعہ خط LM خط x - ایکسز اور LP خط y - ایکسز کے

متوازی ہوں اور دونوں نقاط M اور L خط x - ایکسز پر

ہوں تو نقاط $L(x_1, 0)$ اور $M(x_2, 0)$ بمعہ محدودات

ہوں گے۔ سامنے شکل کے حوالہ سے قطعہ خط PN خط x - ایکسز

کے متوازی ہوگا۔

قائمہ زاویہ مثلث PNQ میں

$$|\overline{NQ}| = |y_2 - y_1|$$

$$|\overline{PN}| = |x_2 - x_1|$$

اور

فیثاغورث قانون کی مدد سے چونکہ $\angle PNQ = 90^\circ$ اس لیے

$$(\overline{PQ})^2 = (\overline{PN})^2 + (\overline{QN})^2$$

$$\Rightarrow d^2 = |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2$$

$$\Rightarrow d = \pm \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2}$$

پس نیچے درج مساوات فاصلہ فارمولا کہلاتا ہے۔

$$d = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2} \text{ (ہمیشہ) } d > 0 \text{ جبکہ: فارمولا:}$$

9.1.3 فاصلہ فارمولا کا استعمال (Use of Distance Formula)

فاصلہ فارمولا کے استعمال کو مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح کیا جاتا ہے۔

مثال 1 فاصلہ فارمولا کی مدد سے درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں

(i) P(1, 2) ، Q(0, 3)

(ii) S(-1, 3) ، R(3, -2)

(iii) U(0, 2) ، V(-3, 0)

(iv) P'(1, 1) ، Q'(2, 2)

حل

(i) $|\overline{PQ}| = \sqrt{(0-1)^2 + (3-2)^2}$

$$= \sqrt{(-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

(ii) $|\overline{SR}| = \sqrt{(3-(-1))^2 + (-2-3)^2}$

$$= \sqrt{(3+1)^2 + (-5)^2} = \sqrt{16+25} = \sqrt{41}$$

(iii) $|\overline{UV}| = \sqrt{(-3-0)^2 + (0-2)^2}$

$$= \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$$

(iv) $|\overline{P'Q'}| = \sqrt{(2-1)^2 + (2-1)^2}$

$$= \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

مشق 9.1

1- درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔

- (a) $A(9, 2), B(7, 2)$ (b) $A(2, -6), B(3, -6)$
 (c) $A(-8, 1), B(6, 1)$ (d) $A(-4, \sqrt{2}), B(-4, -3)$
 (e) $A(3, -11), B(3, -4)$ (f) $A(0, 0), B(0, -5)$

2- اگر P ایک ایسا نقطہ ہے جو خط x -ایکسز پر واقع ہے اور اس کا x -محدد a ہے۔ Q ایک نقطہ ہے جو y -ایکسز پر واقع ہے اور اس کا y -محدد b ہے۔ جیسے نیچے درج ہے۔ نقاط P اور Q کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔


- (i) $a = 9, b = 7$ (ii) $a = 2, b = 3$ (iii) $a = -8, b = 6$
 (iv) $a = -2, b = -3$ (v) $a = \sqrt{2}, b = 1$ (vi) $a = -9, b = -4$

9.2 ہم خط یا ہم لائن نقاط (Collinear Points)

9.2.1 مستوی میں ہم خط یا غیر ہم خط نقاط (Collinear or Non-collinear Points in the Plane)

دو یا دو سے زیادہ نقاط جو ایک ہی خط پر واقع ہوں ہم خط (collinear) کہلاتے ہیں۔ (بحوالہ اس خط کے) جو نقاط ہم خط نہ ہوں یا ایک سے زیادہ خطوط پر واقع ہوں غیر ہم خط (non-collinear) کہلاتے ہیں۔

اگر PQ ایک خط ہو تو تمام نقاط جو خط m پر واقع ہوں ہم خط ہیں۔ نیچے دی ہوئی شکل میں نقاط P اور Q ہم خط ہیں۔ بحوالہ خط m اور نقاط P اور R ہم خط نہیں (بحوالہ خط m)۔



9.2.2 فاصلہ فارمولا کی مدد سے تین یا تین سے زیادہ مستوی کے نقاط کو ہم خط یا غیر ہم خط ثابت کرنا

تین دیے ہوئے نقاط P، Q اور R جو مستوی میں ہیں۔ ہم خط ہوں گے اگر $|PQ| + |QR| = |PR|$

ہو ورنہ غیر ہم خط ہوں گے۔

مثال: فاصلہ فارمولا سے ظاہر کیجیے کہ نقاط

(i) $P(-2, -1), Q(0, 3), R(1, 5)$ ہم خط ہیں۔

(ii) نقاط P, Q, R اور $S(1, -1)$ غیر ہم خط ہیں۔

حل:

(i) فاصلہ فارمولا کے استعمال سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ

$$|PQ| = \sqrt{(0+2)^2 + (3+1)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$|QR| = \sqrt{(1-0)^2 + (5-3)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

اور

$$|PR| = \sqrt{(1+2)^2 + (5+1)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$|PQ| + |QR| = 2\sqrt{5} + \sqrt{5} = 3\sqrt{5} = |PR|$$

چونکہ

اس لیے

نقاط P، Q اور R ہم خط ہیں۔

$$|PS| = \sqrt{(-2-1)^2 + (-1+1)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 0} = 3 \quad (ii)$$

$$|QS| = \sqrt{(1-0)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$$

چونکہ

$$|PQ| + |QS| \neq |PS|$$

اس لیے نقاط P، Q اور S ہم خط نہیں ہیں۔


پس نقاط P، Q، R اور S بھی ہم خط نہیں ہیں۔

یاد رہے کہ یونٹ (8) کے مطالعہ سے آپ مثلث یا کون کی شکل سے واقف ہیں کہ

مستوی میں مثلث ایک ایسی بند شکل ہے جو تین غیر ہم خط نقاط کو ملانے سے بنتی ہے۔ مثلث ABC کے تینوں

غیر ہم خط نقاط A، B اور C مثلث کے کونے (vertices) اور قطعہ خط AB، BC اور CA مثلث ABC کے

اضلاع کہلائیں گے۔



9.2.3 فاصلہ فارمولا (Distance Formula) کے استعمال سے مثلث کی مختلف اقسام کی تشکیل

جیومیٹری میں مثلث کے تصور کی توسیع کی خاطر ہم نیچے مثلث کے اضلاع کی لمبائی کے اعتبار سے اس کی مختلف

اقسام سے روشناس کراتے ہیں:

(ii) متساوی الساقین مثلث

(i) متساوی الاضلاع مثلث

(iv) مختلف الاضلاع مثلث

(iii) قائمہ زاویہ مثلث

ہم اوپر مذکورہ مثلثان (i) تا (iv) کے بارے میں بالترتیب بحث کرتے ہیں۔

(i) متساوی الاضلاع مثلث (Equilateral Triangle)

اگر دی ہوئی مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائی برابر ہو تو مثلث متساوی الاضلاع مثلث کہلاتی ہے۔

مثال: مثلث OPQ ایک متساوی الاضلاع مثلث ہے کیونکہ اس کے تینوں کونوں کے نقاط $O(0,0)$ ، $P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ اور

$Q\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\right)$ ہم خط نہیں۔ جبکہ

$$|\overline{OP}| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} |\overline{OQ}| &= \sqrt{\left(0 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{3}{8}} = \sqrt{\frac{4}{8}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$


$$|\overline{PQ}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - 0\right)^2} \quad \text{اور}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1-2}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{3}{8}} = \sqrt{\frac{4}{8}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|\overline{OP}| = |\overline{OQ}| = |\overline{PQ}| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{پس}$$

جو ایک حقیقی نمبر ہے اور نقاط $O(0,0)$ ، $P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ اور $Q\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\right)$ ہم خط نہیں اس لیے


مثلث OPQ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔



(ii) متساوی الساقین مثلث (Isosceles Triangle)

ایک متساوی الساقین مثلث ایسی مثلث ہے جس کے دو اضلاع کی لمبائی برابر ہے۔ جبکہ تیسرے ضلع کی لمبائی مختلف ہے۔

مثال مثلث PQR ایک متساوی الساقین ہے جس کے کونوں کے نقاط $P(-1, 0)$ ، $Q(1, 0)$ اور $R(0, 1)$ ہم خط نہیں۔ جیسا کہ نیچے شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔



فاصلہ فارمولا کی مدد سے

$$\begin{aligned} |PQ| &= \sqrt{(1 - (-1))^2 + (0 - 0)^2} \\ &= \sqrt{(1+1)^2 + 0} = \sqrt{4} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |QR| &= \sqrt{(0 - 1)^2 + (1 - 0)^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$|PR| = \sqrt{(0 - (-1))^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

چونکہ

$$|PQ| + |QR| > |PR| \quad \text{اور} \quad |PQ| = 2 \neq \sqrt{2} \quad \text{اور} \quad |QR| = |PR| = \sqrt{2}$$

اس لیے غیر ہم خط نقاط P، Q اور R ایک متساوی الساقین مثلث PQR بناتے ہیں۔

(iii) قائمہ زاویہ مثلث (Right Angled Triangle)

ایک مثلث جس کے اندرونی زاویوں میں سے ایک زاویہ 90° کا ہو قائمہ زاویہ مثلث کہلاتی ہے۔

مثال اگر $O(0, 0)$ ، $P(-3, 0)$ اور $Q(0, 2)$ تین نقاط غیر ہم خط ہوں تو ثابت کیجیے کہ

مثلث OPQ ایک قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

چونکہ

$$|OQ| = \sqrt{(0-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{2^2} = 2$$

$$|OP| = \sqrt{(-3)^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|PQ| = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$$

$$\begin{aligned} |OQ|^2 + |OP|^2 &= (2)^2 + (3)^2 \\ &= 13 = |PQ|^2 \end{aligned}$$

$$|OQ|^2 + |OP|^2 = |PQ|^2 \quad \text{اور}$$

$$90^\circ = \angle POQ \quad \text{اس لیے}$$



پس نقاط $O(0, 0)$ ، $P(-3, 0)$ اور $Q(0, 2)$ مثلث OPQ بناتے ہیں جو قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

Visual Proof of Pythagoras' Theorem

In right angle triangle ABC,
 $|AB|^2 = |BC|^2 + |CA|^2$



Pythagoras' Birth c. 580 BC - 572 BC Death c. 500 BC - 490 BC



(iv) مختلف الاضلاع مثلث (Scalene Triangle)

ایک مثلث مختلف الاضلاع مثلث کہلاتی ہے اگر اس کے تینوں اضلاع کی لمبائی ایک دوسرے سے مختلف ہو۔

مثال
حل


تصدیق کیجیے کہ نقاط $P(1, 2)$ ، $Q(-2, 1)$ اور $R(2, 1)$ مستوی میں مختلف اضلاع مثلث بناتے ہیں۔

چونکہ

$$\begin{aligned} |\overline{PQ}| &= \sqrt{(-2-1)^2 + (1-2)^2} \\ &= \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\overline{QR}| &= \sqrt{(2+2)^2 + (1-1)^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 0^2} = \sqrt{4^2} = 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\overline{PR}| &= \sqrt{(2-1)^2 + (1-2)^2} \\ &= \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \end{aligned}$$






اس لیے $|\overline{QR}| = 4$ ، $|\overline{PQ}| = \sqrt{10}$ اور $|\overline{PR}| = \sqrt{2}$ اور نقاط P ، Q ، R غیر ہم خط ہیں۔ کیونکہ

$$|\overline{PQ}| + |\overline{QR}| > |\overline{PR}|$$

پس مثلث PQR ایک مختلف اضلاع مثلث ہے۔

9.2.4 فاصلہ فارمولا کی مدد سے ظاہر کرنا کہ چار غیر ہم خط نقاط ایک مربع، ایک مستطیل اور ایک متوازی الاضلاع کی تشکیل کرتے ہیں۔

پہلے ہم ان تینوں اشکال کی پہچان کرتے ہیں۔



(a) فاصلہ فارمولا کی مدد سے دیے ہوئے چار غیر ہم خط نقاط سے ایک مربع کی تشکیل
مستوی میں مربع ایک ایسی بند شکل ہے جو چار غیر ہم خط نقاط سے بنتی ہے اس کے چاروں اضلاع کی لمبائی
برابر اور ہر زاویہ 90° کا ہوتا ہے۔

مثال اگر $A(2, 2)$ ، $B(2, -2)$ ، $C(-2, -2)$ اور $D(-2, 2)$ چار نقاط غیر ہم خط ہوں تو تصدیق کیجیے کہ یہ نقاط
مربع ABCD بناتے ہیں۔


حل فاصلہ فارمولا کی مدد سے

$$\begin{aligned} |\overline{AB}| &= \sqrt{(2-2)^2 + (-2-2)^2} \\ &= \sqrt{0^2 + (-4)^2} = \sqrt{16} = 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\overline{BC}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (-2+2)^2} \\ &= \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = \sqrt{16} = 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\overline{CD}| &= \sqrt{(-2-(-2))^2 + (2-(-2))^2} \\ &= \sqrt{(-2+2)^2 + (2+2)^2} = \sqrt{0+16} = \sqrt{16} = 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\overline{DA}| &= \sqrt{(2+2)^2 + (2-2)^2} \quad \text{اور} \\ &= \sqrt{(+4)^2 + 0} = \sqrt{16} = 4 \end{aligned}$$



$$|\overline{AB}| = |\overline{BC}| = |\overline{CD}| = |\overline{DA}| = 4$$

پس

یعنی شکل کے چاروں اضلاع لمبائی میں برابر ہیں۔

$$\begin{aligned} |\overline{AC}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} \quad \text{مزید} \\ &= \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$|\overline{AB}|^2 + |\overline{BC}|^2 = (4)^2 + (4)^2 = 32,$$

$$|\overline{AC}|^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32$$

$$|\overline{AB}|^2 + |\overline{BC}|^2 = |\overline{AC}|^2,$$

$$\angle ABC = 90^\circ$$

$$\angle ADC = \angle DCB = \angle DAB = 90^\circ$$

پس دیے ہوئے چار نقاط A، B، C اور D غیر ہم خط ہیں جو مربع شکل ABCD کی تشکیل کرتے ہیں۔

(b) فاصلہ فارمولا کی مدد سے ثابت کیجیے کہ چار غیر ہم خط نقاط مستطیل بناتے ہیں

مستوی میں ایک ایسی بند شکل جو چار غیر ہم خط نقاط سے بنتی ہے مستطیل کہلاتی ہے اگر اس کے

(i) آمنے سامنے کے اضلاع لمبائی میں برابر ہوں۔

(ii) ہر کونے پر زاویہ 90° کا ہو۔

مثال
حل
ظاہر کیجیے کہ نقاط A(-2, 0)، B(-2, 3)، C(2, 3) اور D(2, 0) ایک مستطیل بناتے ہیں۔


دونوں نقطوں کے درمیان فاصلہ معلوم کرنے کا فارمولا استعمال کرنے سے

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(-2+2)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{0+9} = \sqrt{9} = 3$$

$$|\overline{DC}| = \sqrt{(2-2)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{0+9} = \sqrt{9} = 3$$

$$|\overline{AD}| = \sqrt{(2+2)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{16+0} = 4$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(2+2)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16+0} = \sqrt{16} = 4$$



چونکہ $|\overline{AD}| = |\overline{BC}| = 4$ اور $|\overline{AB}| = |\overline{DC}| = 3$

اس طرح مستطیل کے بالمتقابل اضلاع برابر ہوئے اور مزید

$$|\overline{AC}| = \sqrt{(2+2)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

$$|\overline{AC}|^2 = (5)^2 = 25 \quad \text{اور} \quad |\overline{AD}|^2 + |\overline{DC}|^2 = (4)^2 + (3)^2 = 25 \quad \text{اس لیے}$$

$$\angle ADC = 90^\circ \quad \text{اس لیے} \quad |\overline{AD}|^2 + |\overline{DC}|^2 = |\overline{AC}|^2 \quad \text{چونکہ}$$

$$\angle ABC = \angle BCD = \angle DAB = 90^\circ \quad \text{اسی طرح}$$

نتیجتاً، نقاط A، B، C اور D ایک مستطیل بناتے ہیں۔

(c) دو نقاط کے درمیان فاصلہ فارمولہ کی مدد سے دیے ہوئے غیر ہم خط چار نقاط سے متوازی الاضلاع کی شکل بنانا

تعریف: مستوی میں چار غیر ہم خط نقاط سے بنائی ہوئی بند شکل متوازی الاضلاع کہلاتی ہے اگر


(i) شکل کے بالمقابل اضلاع کی لمبائی برابر ہو۔

(ii) شکل کے بالمقابل اضلاع باہم متوازی ہوں۔

مثال

ظاہر کیجیے کہ نقاط A(-2, 1)، B(2, 1)، C(3, 3) اور D(-1, 3) ایک متوازی الاضلاع بناتے ہیں۔

حل



فاصلہ فارمولہ کی مدد سے اضلاع کی لمبائی چونکہ

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(2+2)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{4^2 + 0} = \sqrt{16} = 4$$

$$|\overline{CD}| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{4^2 + 0} = \sqrt{16} = 4$$

$$|\overline{AD}| = \sqrt{(-1+2)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(3-2)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \quad \text{اور}$$


$$|\overline{AD}| = |\overline{BC}| = \sqrt{5} \quad \text{اور} \quad |\overline{AB}| = |\overline{CD}| = 4 \quad \text{چونکہ}$$

مشق 9.2

- 1- تحقیق کیجیے کہ کیا نقاط $(5, -2)$ ، $(5, 4)$ اور $(-4, 1)$ ایک متساوی الاضلاع مثلث کے کونے ہیں یا متساوی الساقین مثلث کے؟
- 2- بتائیے کیا نقاط $(-1, 1)$ ، $(5, 4)$ ، $(2, -2)$ اور $(-4, 1)$ ایک مربع شکل بناتے ہیں یا نہیں؟
- 3- فیصلہ کیجیے کہ کیا نقاط $(1, 3)$ ، $(4, 2)$ اور $(-2, 6)$ ایک قائمہ زاویہ مثلث بناتے ہیں یا نہیں؟
- 4- فاصلہ فارمولا کی مدد سے معلوم کیجیے کہ نقاط $(1, 1)$ ، $(-2, -8)$ اور $(4, 10)$ ہم خط ہیں یا نہیں۔
- 5- حقیقی نمبر k کی قیمت معلوم کیجیے، جبکہ نقطہ $(2, k)$ نقاط $(3, 7)$ اور $(9, 1)$ سے یکساں فاصلہ پر ہے۔
- 6- فاصلہ فارمولا کی مدد سے ظاہر کیجیے کہ نقاط $A(0, 7)$ ، $B(3, -5)$ ، $C(-2, 15)$ ہم خط ہیں۔
- 7- تصدیق کیجیے کہ نقاط $O(0, 0)$ ، $A(\sqrt{3}, 1)$ ، $B(\sqrt{3}, -1)$ ایک متساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں یا نہیں۔
- 8- تصدیق کیجیے کہ نقاط $A(-6, -5)$ ، $B(5, -5)$ ، $C(5, -8)$ اور $D(-6, -8)$ ایک مستطیل بناتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مستطیل کے وتروں کی لمبائی جانئے۔ کیا یہ برابر ہیں؟
- 9- تصدیق کیجیے کہ نقاط $M(-1, 4)$ ، $N(-5, 3)$ ، $P(1, -3)$ اور $Q(5, -2)$ ایک متوازی الاضلاع کے کونے ہیں۔
- 10- ایک دائرہ کے قطر کی لمبائی بتائیے جس کا مرکزی نقطہ $C(-3, 6)$ ہے اور نقطہ $P(1, 3)$ دائرہ پر واقع ہے۔

9.3 درمیانی نقطہ فارمولہ (Mid-Point Formula)

9.3.1 درمیانی نقطہ کے تصور کی پہچان (Recognition of the Mid-Point)



اگر دو نقاط $P(-2, 0)$ اور $Q(2, 0)$ دیے گئے ہوں

جو x -محور (x -axis) پر واقع ہیں تو مبدا $O(0, 0)$

ان کا درمیانی نقطہ ہے۔ چونکہ

سامنے دی ہوئی شکل میں $|\overline{OP}| = 2 = |\overline{OQ}|$

اور نقاط P اور Q ہم خط ہیں۔

اسی طرح مبدا $O(0, 0)$ نقاط $P_1(0, 3)$


اور $Q_1(0, -3)$ کا درمیانی نقطہ ہے چونکہ $|\overline{OP}_1| = 3 = |\overline{OQ}_1|$

اور نقاط P_1 اور Q_1 ایک خط y -ایکسر پر واقع ہیں۔

9.3.2 مستوی میں کسی بھی دو نقاط کے درمیانی نقطہ کی پہچان

اگر مستوی میں کوئی سے بھی دو نقاط $P_1(x_1, y_1)$ اور $P_2(x_2, y_2)$ موجود ہوں اور نقطہ $R(x, y)$ دیے

ہوئے نقاط P_1 اور P_2 کا درمیانی نقطہ ہو تو R قطعہ خط P_1P_2 پر واقع ہوگا۔ جیسا کہ نیچے شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔



اگر قطعہ خط MN جو خط x -ایکسر کے متوازی ہے اور نقطہ $R(x, y)$ قطعہ خط MN پر M اور N کا درمیانی نقطہ ہے:

$$x_2 - x = x - x_1$$

تو

$$\Rightarrow 2x = x_1 + x_2 \Rightarrow x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

اسی طرح

پس R نقاط M اور N کا درمیانی نقطہ ہے۔ اس لیے

$$R(x, y) = R\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

جو نقاط $P_1(x_1, y_1)$ اور $P_2(x_2, y_2)$ کا بھی درمیانی نقطہ ہے۔
نتیجتاً ہم معلوم کرتے ہیں کہ

$$R(x, y) = R\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

مطلوبہ نقطہ ہے۔

9.3.3 درمیانی نقطہ فارمولہ کی تصدیق (Verification of Mid-Point Formula)

فاصلہ فارمولہ کی مدد سے چونکہ

$$\begin{aligned} |\overline{P_1R}| &= \sqrt{\left(\frac{x_1 + x_2}{2} - x_1\right)^2 + \left(\frac{y_1 + y_2}{2} - y_1\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_2 - y_1}{2}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \frac{1}{2} |\overline{P_1P_2}| \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} |\overline{P_2R}| &= \sqrt{\left(\frac{x_1 + x_2}{2} - x_2\right)^2 + \left(\frac{y_1 + y_2}{2} - y_2\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{x_1 + x_2 - 2x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_1 + y_2 - 2y_2}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_1 - y_2}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_2 - y_1}{2}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \frac{1}{2} |\overline{P_1P_2}| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |\overline{P_2R}| = |\overline{P_1R}| = \frac{1}{2} |\overline{P_1P_2}| \quad \text{پس}$$

مطلوبہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ نقطہ $R\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ قطعہ خط P_1P_2 کا درمیانی نقطہ ہے۔

چونکہ $|\overline{P_1R}| + |\overline{P_2R}| = |\overline{P_1P_2}|$ اس لیے نقاط P_1, P_2 اور R قطعہ خط P_1P_2 پر واقع ہیں۔

اگر مستوی میں کوئی سے بھی دو نقاط $P(x_1, y_1)$ اور $Q(x_2, y_2)$ ہوں تو ان کا

درمیانی نقطہ $R(x, y)$ قطعہ خط PQ پر واقع ہوگا۔ اور

$$R(x, y) = R\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

مثال 1 دو نقاط $A(2, 5)$ اور $B(-1, 1)$ کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے جو قطعہ خط AB پر واقع ہو۔

حل اگر $R(x, y)$ دیے ہوئے نقاط A اور B کا مطلوبہ درمیانی نقطہ ہو تو

$$x = \frac{2 - 1}{2} = \frac{1}{2} \quad , \quad y = \frac{5 + 1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

پس $R = R(x, y) = R\left(\frac{1}{2}, 3\right)$ مطلوبہ نقطہ ہے۔

مثال 2 مستوی میں دو نقاط $P(2, 3)$ اور $Q(x, y)$ کا درمیانی نقطہ $R(1, -1)$ ہو تو x اور y کی قیمت معلوم کیجیے۔

حل چونکہ $R(1, -1)$ نقاط $P(2, 3)$ اور $Q(x, y)$ کا درمیانی نقطہ ہے۔ اس لیے

$$1 = \frac{x + 2}{2} \quad , \quad -1 = \frac{y + 3}{2}$$

$$\Rightarrow 2 = x + 2 \quad \left| \quad \Rightarrow -2 = y + 3 \right.$$

$$\Rightarrow x = 0 \quad \left| \quad \Rightarrow y = -5 \right.$$

پس $x = 0$ اور $y = -5$ مطلوبہ قیمتیں ہیں۔

مثال 3 نیچے دکھائی گئی مثلث ABC میں نقاط M_1, M_2, M_3 اور قطعہ خط AB, BC, CA کے بالترتیب درمیانی نقاط

ہوں تو نقاط M_1, M_2, M_3 کے کوآرڈینیٹ معلوم کیجیے۔ نیز مثلث $M_1 M_2 M_3$ کی قسم بھی واضح کیجیے۔

حل چونکہ قطعہ خط AB کا درمیانی نقطہ M_1 ہے۔ اس لیے

$$M_1 = M_1\left(\frac{-3 + 5}{2}, \frac{2 + 8}{2}\right) = M_1(1, 5)$$


چونکہ قطعہ خط BC کا درمیانی نقطہ M_2 ہے۔ اس لیے

$$M_2 = M_2\left(\frac{5 + 5}{2}, \frac{8 + 2}{2}\right) = M_2(5, 5)$$

چونکہ قطعہ خط AC کا درمیانی نقطہ M_3 ہے۔ اس لیے

$$M_3 = M_3\left(\frac{5 - 3}{2}, \frac{2 + 2}{2}\right) = M_3(1, 2)$$

چیلنج! کیا $\triangle M_1 M_2 M_3$ قائمہ زاویہ مثلث بھی ہے؟



مثلت $M_1M_2M_3$ کے اضلاع کی لمبائیاں:

$$|\overline{M_1M_2}| = \sqrt{(5-1)^2 + (5-5)^2} = \sqrt{4^2 + 0} = 4 \quad \dots\dots (i)$$

$$\begin{aligned} |\overline{M_2M_3}| &= \sqrt{(1-5)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} \\ &= \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5 \quad \dots\dots (ii) \end{aligned}$$


$$|\overline{M_1M_3}| = \sqrt{(1-1)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{0^2 + (-3)^2} = 3 \quad \dots\dots (iii)$$

چونکہ مثلث $M_1M_2M_3$ کے اضلاع کی لمبائیاں 4، 5 اور 3 ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے مثلث $M_1M_2M_3$ ایک مختلف الاضلاع مثلث ہے۔

مثال 4 اگر مستوی میں دیے ہوئے تین نقاط $O(0, 0)$ ، $A(3, 0)$ اور $B(3, 5)$ کی مناسبت سے M_1 قطعہ خط AB

کا درمیانی نقطہ اور M_2 قطعہ خط OB کا درمیانی نقطہ ہو تو

ثابت کیجیے کہ



$$|\overline{M_1M_2}| = \frac{1}{2} |\overline{OA}|$$

قطعہ خط AB کا درمیانی نقطہ M_1 ہے۔ حل

اس لیے درمیانی نقطہ فارمولا کی مدد سے

$$M_1 = M_1 \left(\frac{3+3}{2}, \frac{5}{2} \right) = \left(3, \frac{5}{2} \right)$$

چونکہ قطعہ خط OB کا درمیانی نقطہ M_2 ہے اس لیے

$$M_2 = M_2 \left(\frac{3+0}{2}, \frac{5+0}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$$

چونکہ

$$|\overline{OA}| = \sqrt{(3-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{3^2} = 3$$

پس

$$|\overline{M_1M_2}| = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - 3 \right)^2 + \left(\frac{5}{2} - \frac{5}{2} \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{-3}{2} \right)^2 + 0}$$

$$= \sqrt{\frac{9}{4} + 0} = \frac{3}{2} = \frac{1}{2} |\overline{OA}|$$

اگر دو نقاط $P(x_1, y_1)$ اور $Q(x_2, y_2)$ کا درمیانی نقطہ $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ ہو تو

$$|PM| = |MQ| \text{ یعنی } P \text{ اور } Q \text{ سے یکساں فاصلے پر ہے۔} \quad (i)$$

(ii) M دونوں نقاط کے ملانے والے قطعہ خط PQ پر واقع ہے۔

(iii) ہر نقطہ R جو مستوی میں نقاط P اور Q سے یکساں فاصلے پر ہو ضروری نہیں کہ وہ ان کا درمیانی نقطہ بھی ہو۔

جیسا کہ نقطہ $R(0, 1)$ نقاط $P(-3, 0)$ اور $Q(3, 0)$ سے یکساں فاصلہ پر ہے۔ لیکن $R(0, 1)$ نقاط P اور Q کا درمیانی نقطہ نہیں۔ مثلاً

$$|RQ| = \sqrt{(0-3)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (1)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$$

$$|RP| = \sqrt{(0+3)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

اور نقاط P اور Q کا درمیانی نقطہ $R(0, 1)$ نہیں بلکہ $R(0, 0)$ درمیانی نقطہ ہے اور $(0, 1) \neq (0, 0)$

(iv) یاد رہے کہ دو نقاط کا درمیانی نقطہ صرف ایک ہی نقطہ ہو سکتا ہے۔

مشق 9.3

1- مندرجہ ذیل نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (a) $A(9, 2), B(7, 2)$ | (b) $A(2, -6), B(3, -6)$ |
| (c) $A(-8, 1), B(6, 1)$ | (d) $A(-4, 9), B(-4, -3)$ |
| (e) $A(3, -11), B(3, -4)$ | (f) $A(0, 0), B(0, -5)$ |

2- قطعہ خط PQ کا کونا نقطہ $P(-3, 6)$ پر ہے اور اس کا درمیانی نقطہ $(5, 8)$ ہے۔ نقطہ Q کے کوآرڈینیٹس معلوم کریں۔

3- ثابت کیجیے کہ ایک قائمہ زاویہ مثلث کے وتر کا درمیانی نقطہ مثلث کے تینوں نقاط $P(-2, 5), Q(1, 3)$ اور

$R(-1, 0)$ سے یکساں فاصلہ پر ہے۔

4- مستوی میں مثلث کے تینوں کونوں کے نقاط $O(0, 0), A(3, 0), B(3, 5)$ ہیں۔ اضلاع OB اور AB

کے درمیانی نقاط M_1 اور M_2 ہیں۔ $|M_1M_2|$ معلوم کیجیے۔

5- ایک متوازی الاضلاع $ABCD$ جس میں نقاط $A(1, 2), B(4, 2), C(-1, -3), D(-4, -3)$ ہوں

تو ثابت کیجیے کہ $ABCD$ کے وتر ایک دوسرے کو باہم دو برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

(اشارہ: متوازی الاضلاع کے وتر ایک ہی نقطہ پر ملتے ہیں)

6- ایک مثلث PQR کے نقاط $P(4, 6)$ ، $Q(-2, -4)$ اور $R(-8, 2)$ ہوں تو ثابت کیجیے کہ اضلاع PR اور QR کے درمیانی نقاط کو ملانے والے قطعہ خط کی لمبائی $\frac{1}{2}|\overline{PQ}|$ کی لمبائی کے برابر ہے۔

اعادہ مشق 9

1- دیئے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) نقاط $(0, 0)$ اور $(1, 1)$ کے درمیان فاصلہ ہے۔

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) $\sqrt{2}$

(ii) نقاط $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ کا درمیانی فاصلہ ہے۔

(a) 0 (b) 1 (c) $\sqrt{2}$ (d) 2

(iii) نقاط $(0, 0)$ اور $(2, 2)$ کا درمیانی نقطہ ہے۔

(a) $(1, 1)$ (b) $(1, 0)$ (c) $(0, 1)$ (d) $(-1, -1)$

(iv) نقاط $(-2, 2)$ اور $(2, -2)$ کا درمیانی نقطہ ہے۔

(a) $(2, 2)$ (b) $(-2, -2)$ (c) $(0, 0)$ (d) $(1, 1)$

(v) ایک مثلث جس کے تینوں اضلاع کی لمبائی برابر ہو وہ کہلاتی ہے۔

(a) متساوی الساقین (b) مختلف الاضلاع

(c) مساوی الاضلاع (d) ان میں سے نہیں

(vi) ایک ایسی مثلث جس کے تمام اضلاع کی لمبائی برابر ہو وہ کہلاتی ہے۔

(a) متساوی الساقین (b) مختلف الاضلاع

(c) مساوی الاضلاع (d) ان میں سے نہیں

2- مندرجہ ذیل جملوں میں سے کون سے درست اور کون سے غلط ہیں؟

(i) ایک خط کے دو سرے ہوتے ہیں۔

(ii) ایک قطعہ خط کا ایک سرا ہوتا ہے۔

(iii) ایک مثلث تین ہم خط نقاط سے بنتی ہے۔

(iv) ایک مثلث کے ہر ضلع پر دو ہم خط راسی نقاط ہوتے ہیں۔

(v) ایک مستطیل کے ہر ضلع کے دو کونے ہم خط ہوتے ہیں۔

(vi) تمام نقاط جو x -محور پر ہوتے ہیں ہم خط ہوتے ہیں۔

(vii) مبداء ہی ایک ایسا نقطہ ہے جو x -محور اور y -محور دونوں کا ہم خط نقطہ ہے۔

3- مندرجہ ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔

(i) (6, 3), (3, -3) (ii) (7, 5), (1, -1)

(iii) (0, 0), (-4, -3)

4- مندرجہ ذیل نقاط کے جوڑوں کا درمیانی نقطہ بتائیے۔

(i) (6, 6), (4, -2) (ii) (-5, -7), (-7, -5)

(iii) (8, 0), (0, -12)

5- مندرجہ ذیل کی تعریف کیجیے۔

(i) کوآرڈینیٹ جیومیٹری (ii) ہم لائن نقاط (iii) غیر ہم لائن نقاط

(iv) متساوی الاضلاع مثلث (v) مختلف الاضلاع مثلث (vi) متساوی الساقین مثلث

(vii) قائمہ زاویہ مثلث (viii) مربع

خلاصہ

☆ اگر $P(x_1, y_1)$ اور $Q(x_2, y_2)$ دو نقاط ہوں اور حقیقی نمبر d ان کے درمیان فاصلہ کو ظاہر کرتا ہو

$$d = \sqrt{|x_1 - x_2|^2 + |y_1 - y_2|^2} \quad \text{تو}$$

☆ غیر ہم خط نقاط کا تصور تین اور چار ضلعی اشکال کو جیومیٹری میں زیر بحث لانے کی وجہ بنتا ہے۔

☆ مستوی میں تین نقاط P ، Q اور R ہم خط ہوں گے اگر $|PQ| + |QR| = |PR|$

☆ تین نقاط P ، Q اور R مثلث کی تشکیل کرتے ہیں اگر وہ غیر ہم خط ہوں۔

$$|PQ| + |QR| > |PR| \quad \text{یا}$$

☆ اگر $|PQ| + |QR| < |PR|$ تو نقاط P ، Q اور R سے یکساں مثلث نہیں بنائی جاسکتی۔

☆ مثلثوں کی مختلف اقسام، متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، قائمہ زاویہ اور مختلف الاضلاع مثلثان اس یونٹ میں

زیر بحث لائی گئی ہیں۔

☆ اسی طرح چار ضلعی اشکال مربع، مستطیل اور متوازی الاضلاع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

متماثل مثلثان

(CONGRUENT TRIANGLES)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

10.1 متماثل مثلثان (Congruent Triangles)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ ثابت کر سکیں کہ دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور دوسرا دوسری مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔

☆ ثابت کر سکیں کہ اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں۔

☆ ثابت کر سکیں کہ دو مثلثوں کی مطابقت میں اگر ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسری مثلث کے متناظرہ تین اضلاع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔ (ض-ض-ض \equiv ض-ض-ض)

☆ ثابت کر سکیں کہ اگر دو قائمہ زاویہ مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کا وتر اور ایک ضلع دوسری مثلث کے وتر اور متناظرہ ضلع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔ (وتر-ضلع \equiv وتر-ضلع)


10.1 متماثل مثلثان

تعارف

اس یونٹ سے متعلق مسلوں کو ثابت کرنے سے پیشتر ہم دو مثلثوں کے درمیان (1-1) مطابقت اور ان کی مماثلت

کی وضاحت کریں گے۔ (1-1) مطابقت کے لیے نشان \longleftrightarrow استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ض-ض-ض موضوع

(S.A.S. Postulate) بیان کریں گے۔



دی گئی دو مثلثان مثلاً $\triangle ABC$ اور $\triangle DEF$ میں جو چھ ممکنہ (1-1) مطابقتیں قائم کی جاسکتی ہیں ان میں سے ایک مطابقت کی وضاحت درج ذیل ہے۔

$\triangle ABC \longleftrightarrow \triangle DEF$ کا مطلب یہ ہے کہ

$\angle A \longleftrightarrow \angle D$ ($\angle A$ اور $\angle D$ باہم مطابق زاویے ہیں)

$\angle B \longleftrightarrow \angle E$ ($\angle B$ اور $\angle E$ باہم مطابق زاویے ہیں)

$\angle C \longleftrightarrow \angle F$ ($\angle C$ اور $\angle F$ باہم مطابق زاویے ہیں)

$\overline{AB} \longleftrightarrow \overline{DE}$ (\overline{AB} اور \overline{DE} باہم مطابق اضلاع ہیں)

$\overline{BC} \longleftrightarrow \overline{EF}$ (\overline{BC} اور \overline{EF} باہم مطابق اضلاع ہیں)

$\overline{CA} \longleftrightarrow \overline{FD}$ (\overline{CA} اور \overline{FD} باہم مطابق اضلاع ہیں)

مثلثوں کی مماثلت (Congruency of Triangles)

دو مثلثیں متماثل (علامت \cong) کہلاتی ہیں اگر ان کے درمیان کم از کم ایک (1-1) مطابقت ایسی قائم کی جا


سکے جس میں باہم مطابقت رکھنے والے اضلاع اور زاویے متماثل ہوں۔ یعنی

اگر مطابقت $\triangle ABC \longleftrightarrow \triangle DEF$ میں

(تینوں متناظرہ اضلاع) $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$, $\overline{CA} \cong \overline{FD}$

(تینوں متناظرہ زاویے) $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$, $\angle C \cong \angle F$ اور

تو $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



(i) یہ مثلثیں مذکورہ بالا (1-1) مطابقت کے انتخاب کے لحاظ سے متماثل ہیں۔

(ii) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

(iii) $\triangle ABC \cong \triangle DEF \Leftrightarrow \triangle DEF \cong \triangle ABC$



(iv) اگر $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ اور $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ تو $\triangle DEF \cong \triangle PQR$

نوٹ

ض۔ ز۔ ض کا موضوع (S.A.S Postulate)

دو مثلثوں کی دی ہوئی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ دوسری مثلث کے متناظرہ دو اضلاع اور ان کے درمیانی زاویہ کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔

مثال کے طور پر دی گئی شکل میں $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta DEF$ میں





$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{AB} \cong \overline{DE} \\ \angle A \cong \angle D \\ \overline{AC} \cong \overline{DF} \end{array} \right. \text{ اگر}$$

تو (S.A.S. Postulate) $\Delta ABC \cong \Delta DEF$

مسئلہ 10.1.1

دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور کوئی دو زاویے دوسری مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔ (ز۔ ض۔ ز \cong ز۔ ض۔ ز)



معلوم $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta DEF$ میں

$$\angle B \cong \angle E, \quad \overline{BC} \cong \overline{EF}, \quad \angle C \cong \angle F$$

مطلوب $\Delta ABC \cong \Delta DEF$

عمل فرض کیجیے $\overline{AB} \not\cong \overline{DE}$

$\overline{AB} \cong \overline{ME}$ پر ایک نقطہ M اس طرح لیں کہ

نقاط M اور F کو ملائیں۔



دلائل	بیانات
	میں $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle MEF$
عمل	$\overline{AB} \cong \overline{ME}$ (i)
معلوم	$\overline{BC} \cong \overline{EF}$ (ii)
معلوم	$\angle B \cong \angle E$ (iii)
ض۔ز۔ض موضوعہ	$\therefore \triangle ABC \cong \triangle MEF$
متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے	$\angle C \cong \angle MFE$ پس
معلوم	$\angle C \cong \angle DFE$ لیکن
دونوں میں سے ہر ایک $\angle C$ کے متماثل ہے (ثابت شدہ)	$\therefore \angle DFE \cong \angle MFE$
	لیکن یہ مجال ہے اور صرف اس وقت ممکن ہے جب D اور
	M منطبق ہوں یعنی $D \equiv M$ اور $\overline{ME} \cong \overline{DE}$
$\overline{AB} \cong \overline{ME}$ (عمل) اور $\overline{ME} \cong \overline{DE}$ (ثابت شدہ)	$\overline{AB} \cong \overline{DE}$ (iv) پس
	لہذا (ii)، (iii) اور (iv) کی رو سے
ض۔ز۔ض موضوعہ	$\triangle ABC \cong \triangle DEF$

نتیجہ صریح

دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور کوئی دوسرا زاویہ دوسری مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔ (ض۔ز۔ض \cong ض۔ز۔ز)

معلوم مطابقت $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$ میں

$$\overline{BC} \cong \overline{EF}, \angle A \cong \angle D, \angle B \cong \angle E$$



$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$


مطلوب

ثبوت

دلائل	بیانات
<p>معلوم</p> <p>معلوم</p> <p>$\angle B \cong \angle E$, $\angle A \cong \angle D$ (معلوم)</p> <p>ز-ض-ز \cong ز-ض-ز</p>	<p>میں $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$</p> <p>$\angle B \cong \angle E$</p> <p>$\overline{BC} \cong \overline{EF}$</p> <p>لیکن مثلث کے تینوں اندرونی زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ 180° ہوتا ہے۔</p> <p>$\therefore \angle C \cong \angle F$</p> <p>$\triangle ABC \cong \triangle DEF$</p> <p>لہذا</p>

مثال

اگر $\triangle ABC$ اور $\triangle DCB$ مشترک قاعدہ \overline{BC} کے لحاظ سے ایک دوسری کی مخالف اطراف میں اس طرح واقع ہوں کہ $\overline{AL} \perp \overline{BC}$, $\overline{DM} \perp \overline{BC}$ اور $\overline{AL} \cong \overline{DM}$ تو ثابت کیجیے کہ \overline{BC} تنصیف کرتا ہے \overline{AD} کی۔



معلوم $\triangle ABC$ اور $\triangle DCB$ مشترک قاعدہ \overline{BC} کے لحاظ سے ایک دوسری کی مخالف اطراف میں اس طرح واقع ہیں کہ

$$\overline{AL} \cong \overline{DM}, \overline{DM} \perp \overline{BC}, \overline{AL} \perp \overline{BC}$$

\overline{BC} نقطہ N پر \overline{AD} کو قطع کرتا ہے۔


$$\overline{AN} \cong \overline{DN}$$

مطلوب

ثبوت

دلائل	بیانات
<p>معلوم</p> <p>ہر ایک زاویہ قائمہ ہے۔</p> <p>راہی زاویے</p> <p>ض-ز-ز \cong ض-ز-ز</p> <p>مثلثوں کے متناظرہ اضلاع</p>	<p>میں $\triangle ALN \leftrightarrow \triangle DMN$</p> <p>$\overline{AL} \cong \overline{DM}$</p> <p>$\angle ALN \cong \angle DMN$</p> <p>$\angle ANL \cong \angle DNM$</p> <p>$\therefore \triangle ALN \cong \triangle DMN$</p> <p>$\overline{AN} \cong \overline{DN}$</p> <p>لہذا</p>

مشق 10.1



دی گئی شکل میں -1

($\angle 1 \cong \angle 2$) $\angle A \cong \angle C$ اور $\overline{AB} \cong \overline{CB}$ -

ثابت کریں کہ $\triangle ABD \cong \triangle CBE$

2- کسی زاویہ کی ناصف شعاع پر واقع ایک

نقطہ سے زاویہ کے بازوؤں پر عمود کھینچے

گئے ہیں۔ ثابت کریں کہ یہ عمود لمبائی میں


برابر ہیں۔

3- $\triangle ABC$ میں $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف نقطہ I پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ثابت کریں کہ نقطہ I

مثلث ABC کے تینوں اضلاع سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔

مسئلہ 10.1.2

اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں۔



معلوم $\triangle ABC$ میں $\angle B \cong \angle C$


مطلوب $\overline{AB} \cong \overline{AC}$

عمل $\angle A$ کا ناصف کھینچنا، جس نے \overline{BC} کو نقطہ D پر قطع کیا۔

ثبوت

بیانات	دلائل
$\triangle ABD \leftrightarrow \triangle ACD$ میں	
$\overline{AD} \cong \overline{AD}$	مشترک
$\angle B \cong \angle C$	معلوم
$\angle BAD \cong \angle CAD$	عمل
$\triangle ABD \cong \triangle ACD$	ض-ز-ز \cong ض-ز-ز
$\overline{AB} \cong \overline{AC}$	متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع
لہذا	
پس	

مثال 1 اگر کسی قائمہ الزاویہ مثلث کا ایک زاویہ 30° ہو تو وتر اس زاویہ کے مخالف ضلع کی لمبائی سے دوگنا ہوتا ہے۔



معلوم ΔABC میں $m\angle B = 90^\circ$ اور $m\angle C = 30^\circ$

$$m\overline{AC} = 2m\overline{AB}$$

نقطہ B پر $\angle CBD$ برابر 30° بنائیں۔

فرض کریں \overline{BD} ضلع AC کو نقطہ D پر قطع کرتا ہے۔


مطلوب

عمل

ثبوت

بیانات	دلائل
ΔABD میں	
$m\angle A = 60^\circ$	$m\angle C = 30^\circ$ اور $m\angle ABC = 90^\circ$
$m\angle ABD = m\angle ABC - m\angle CBD$	$m\angle CBD = 30^\circ$ (عمل)، $m\angle ABC = 90^\circ$ (معلوم)
$= 60^\circ$	
$\therefore \angle ADB = 60^\circ$	ΔABD کے تینوں زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ $= 180^\circ$
اس لیے ΔABD مساوی الاضلاع ہے۔	مثلث کا ہر ایک زاویہ $= 60^\circ$
یعنی $\overline{AB} \cong \overline{BD} \cong \overline{AD}$	مساوی الاضلاع مثلث کے اضلاع
میں ΔBCD $\overline{BD} \cong \overline{CD}$	$\angle C = \angle CBD$ (ہر ایک زاویہ $= 30^\circ$)
لہذا $m\overline{AC} = m\overline{AD} + m\overline{CD}$	
$= m\overline{AB} + m\overline{AB}$	$m\overline{AD} \cong m\overline{AB}$ اور $m\overline{CD} \cong m\overline{BD} \cong m\overline{AB}$
$= 2(m\overline{AB})$	

مثال 2 اگر کسی مثلث میں ایک زاویہ کا ناصف مخالف ضلع کی تنصیف کرے تو وہ مساوی الساقین مثلث ہوگی۔



معلوم ΔABC میں $\angle A$ کا ناصف مخالف ضلع \overline{BC} کی نقطہ D پر

$$\overline{BD} \cong \overline{CD}$$

تنصیف کرتا ہے اور

مطلوب $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ یعنی ΔABC مساوی الساقین ہے۔

عمل \overline{AD} کو D سے پرے E تک اتنا بڑھائیں کہ $\overline{ED} \cong \overline{AD}$

نقطہ C کو نقطہ E سے ملائیں۔



دلائل	بیانات
	$\triangle ADB \leftrightarrow \triangle EDC$
عمل	$\overline{AD} \cong \overline{ED}$
رأسی زاویے	$\angle ADB \cong \angle EDC$
معلوم	$\overline{BD} \cong \overline{CD}$
ض۔ض۔ض موضوعہ	$\therefore \triangle ADB \cong \triangle EDC$
متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع	$\therefore \overline{AB} \cong \overline{EC}$ I
متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے	$\angle BAD \cong \angle E$ اور
معلوم (\overline{AD} زاویہ A کا ناصف ہے)	$\angle BAD \cong \angle CAD$ لیکن
ہر ایک زاویہ $\angle BAD$ کے متماثل ہے۔	$\angle E \cong \angle CAD$
	$\triangle ACE$ میں
$\angle E \cong \angle CAD$ (ثابت شدہ)	$\overline{AC} \cong \overline{EC}$ II
(I) اور (II) کی روسے	$\overline{AB} \cong \overline{AC}$ لہذا

مشق 10.2

- 1- ثابت کریں کہ متماثل الاضلاع مثلث کے کوئی بھی دو وسطیے متماثل ہوتے ہیں۔
- 2- ثابت کریں کہ ایک نقطہ جو کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔

مسئلہ 10.1.3

اگر دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسری مثلث کے متناظرہ اضلاع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں (ض۔ض۔ض \equiv ض۔ض۔ض)



معلوم $\overline{CA} \cong \overline{FD}$ اور $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ ، $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ میں $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$

مطلوب $\triangle ABC \cong \triangle DEF$


عمل فرض کیا کہ $\triangle DEF$ میں ضلع \overline{EF} باقی دونوں اضلاع میں سے کسی سے چھوٹا نہیں ہے۔ \overline{EF} پر $\triangle DEF$ کے ساتھ $\triangle MEF$ اس طرح بنائی کہ $\angle B \cong \angle FEM$ اور $\overline{ME} \cong \overline{AB}$ نقطہ D کو نقطہ M سے ملایا۔ مندرجہ بالا اشکال کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1$ ، $\angle 2$ ، $\angle 3$ اور $\angle 4$ رکھے۔

ثبوت

دلائل	بیانات
	میں $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle MEF$
معلوم	$\overline{BC} \cong \overline{EF}$
عمل	$\angle B \cong \angle FEM$
عمل	$\overline{AB} \cong \overline{ME}$
ض۔ ز۔ ض کا موضوعہ	$\therefore \triangle ABC \cong \triangle MEF$
متماثل متماثلوں کے متناظرہ اضلاع	$\overline{CA} \cong \overline{FM}$ (i)
معلوم	$\overline{CA} \cong \overline{FD}$ (ii)
(i) اور (ii) کی رو سے	$\therefore \overline{FM} \cong \overline{FD}$
	میں $\triangle FDM$
(ثابت شدہ) $\overline{FM} \cong \overline{FD}$	$\angle 2 \cong \angle 4$ (iii)
	اسی طرح $\angle 1 \cong \angle 3$ (iv)
نتیجہ (iii) اور (iv) سے	$\therefore m\angle 2 + m\angle 1 = m\angle 4 + m\angle 3$
	$\therefore m\angle EDF = m\angle EMF$
	اب $\triangle DEF \leftrightarrow \triangle MEF$ میں
ثابت شدہ	$\overline{FD} \cong \overline{FM}$
ثابت شدہ	$\angle EDF \cong \angle EMF$ اور
ہر ایک متماثل ہے \overline{AB} ہے	$\overline{DE} \cong \overline{ME}$
ض۔ ز۔ ض کا موضوعہ	$\therefore \triangle DEF \cong \triangle MEF$ پس
ثابت شدہ	$\triangle ABC \cong \triangle MEF$ اور
ہر ایک متماثل ہے $\triangle MEF$ (ثابت شدہ)	$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ لہذا

اگر دو مساوی الساقین مثلثیں مشترک قاعدہ کے ایک ہی طرف تشکیل دی گئی ہوں تو ان کے راسوں میں سے

گزرنے والا خط ان کے مشترک قاعدہ کا عمودی ناصف ہوگا۔



معلوم $\triangle ABC$ اور $\triangle DBC$ مشترک قاعدہ \overline{BC} کے

ایک ہی طرف اس طرح تشکیل دی گئی ہیں کہ

$$\overline{AB} \cong \overline{AC}, \overline{DB} \cong \overline{DC}$$

اور قطعہ خط AD کو نقطہ D سے پرے بڑھانے پر

\overline{BC} کو پر ملتا ہے۔

$$\overline{AE} \perp \overline{BC} \text{ اور } \overline{BE} \cong \overline{CE}$$


مطلوب

ثبوت

بیانات	دلائل
$\triangle ADB \leftrightarrow \triangle ADC$ میں	
$\overline{AB} \cong \overline{AC}$	معلوم
$\overline{DB} \cong \overline{DC}$	معلوم
$\overline{AD} \cong \overline{AD}$	مشترک
$\therefore \triangle ADB \cong \triangle ADC$	ض-ض-ض \cong ض-ض-ض
$\therefore \angle 1 \cong \angle 2$	متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے
$\triangle ABE \leftrightarrow \triangle ACE$ میں	
$\overline{AB} \cong \overline{AC}$	معلوم
$\angle 1 \cong \angle 2$	ثابت شدہ
$\overline{AE} \cong \overline{AE}$	مشترک
$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACE$	ض-ز-ض موضوعہ
$\therefore \overline{BE} \cong \overline{CE}$	متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع
$\angle 3 \cong \angle 4$	متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے
$\therefore m\angle 3 + m\angle 4 = 180^\circ$	سپلیمنٹری زاویوں کا موضوعہ
$\therefore m\angle 3 = m\angle 4 = 90^\circ$	II اور I کی رو سے
$\overline{AE} \perp \overline{BC}$	لہذا

صریح نتیجہ تساوی الاضلاع مثلث مساوی الزاویہ بھی ہوتی ہے۔

مشق 10.3




شکل (i)

1- شکل (i) میں
 $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$

ثابت کیجیے کہ $\angle A \cong \angle C$

اور $\angle ABC \cong \angle ADC$



شکل (ii)

2- شکل (ii) میں
 $\overline{LN} \cong \overline{MP}$, $\overline{MN} \cong \overline{LP}$



ثابت کیجیے کہ $\angle N \cong \angle P$ اور

$\angle NML \cong \angle PLM$

3- ثابت کیجیے کہ مساوی الساقین مثلث کے قاعدہ کی تنصیف کرنے والا وسطانیہ راسی زاویہ کا نصف اور قاعدہ پر عمود ہوتا ہے۔

مسئلہ 10.1.4

اگر دو قائمہ زاویہ مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کا وتر اور ایک ضلع دوسری مثلث کے وتر اور متناظرہ ضلع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی (وتر-ضلع \cong وتر-ضلع)




معلوم $\triangle ABC \longleftrightarrow \triangle DEF$ میں

$\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{CA} \cong \overline{FD}$, $\angle B \cong \angle E$ (قائمہ زاویے)

مطلوب $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

عمل \overline{FE} کو نقطہ M تک اس طرح بڑھایا کہ $\overline{EM} \cong \overline{BC}$ ، نقطہ D کو نقطہ M سے ملایا۔

بیانات	دلائل
$m\angle DEF + m\angle DEM = 180^\circ \dots (i)$ $m\angle DEF = 90^\circ \dots (ii)$ $\therefore m\angle DEM = 90^\circ$ $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta DEM$ میں $\overline{BC} \cong \overline{EM}$ $\angle ABC \cong \angle DEM$ $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ $\therefore \Delta ABC \cong \Delta DEM$ $\angle C \cong \angle M$ $\overline{CA} \cong \overline{MD}$ $\overline{CA} \cong \overline{FD}$ $\therefore \overline{MD} \cong \overline{FD}$ ΔDMF میں $\angle F \cong \angle M$ $\angle C \cong \angle M$ $\therefore \angle C \cong \angle F$ $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta DEF$ میں $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ $\angle ABC \cong \angle DEF$ $\angle C \cong \angle F$ $\therefore \Delta ABC \cong \Delta DEF$	<p>سپلیمنٹری زاویے معلوم</p> <p>نتائج (i) اور (ii) سے</p> <p>عمل</p> <p>ہر ایک قائمہ ہے</p> <p>معلوم</p> <p>ض۔ض۔ض کا موضوعہ</p> <p>متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے</p> <p>متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع</p> <p>معلوم</p> <p>ہر ایک متماثل ہے \overline{CA} کے</p> <p>(ثابت شدہ) $\overline{FD} \cong \overline{MD}$</p> <p>ثابت شدہ</p> <p>ہر ایک متماثل ہے $\angle M$ کے</p> <p>معلوم</p> <p>معلوم</p> <p>ثابت شدہ</p> <p>ض۔ض۔ض \cong ض۔ض۔ض</p>




مثال اگر کسی مثلث کے دو راسوں سے مخالف اضلاع پر گرائے گئے عمود متماثل ہوں تو وہ مثلث متماثل الساقین ہوگی۔


معلوم ΔABC میں
 $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ اور $\overline{CE} \perp \overline{AB}$ اس طرح کہ $\overline{BD} \cong \overline{CE}$
 مطلوب $\overline{AB} \cong \overline{AC}$

دلائل	بیانات
معلوم (ہر ایک زاویہ = 90°) مشترک وتر معلوم وتر-ضلع \equiv وتر-ضلع متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے	$\Delta ABCD \leftrightarrow \Delta CBE$ میں $\angle BDC \cong \angle BEC$ $\overline{BC} \cong \overline{BC}$ $\overline{BD} \cong \overline{CE}$ $\therefore \Delta ABCD \cong \Delta CBE$ $\therefore \angle BCD \cong \angle CBE$ $\angle BCA \cong \angle CBA$ لہذا $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ پس
ΔABC میں $\angle BCA \cong \angle CBA$ (ثابت شدہ)	


مشق 10.4



شکل (i)



شکل (ii)



شکل (iii)

1- دی گئی شکل (i) کی ΔPAB میں

$\overline{PA} \cong \overline{PB}$ اور $\overline{PQ} \perp \overline{AB}$ ہو تو

ثابت کریں کہ $\overline{AQ} \cong \overline{BQ}$ اور

$\angle APQ \cong \angle BPQ$

2- دی گئی شکل (ii) میں

$\overline{BC} \cong \overline{AD}$ اور $m\angle C = m\angle D = 90^\circ$

ثابت کریں کہ $\overline{AC} \cong \overline{BD}$ اور

$\angle BAC \cong \angle ABD$

3- دی گئی شکل (iii) میں

$\overline{AD} \cong \overline{BC}$ اور $m\angle B = m\angle D = 90^\circ$

ثابت کریں کہ ABCD ایک مستطیل ہے۔

اعادہ مشق 10

1- مندرجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔

- (i) ایک شعاع کے 'دو' سرے ہوتے ہیں۔


 (ii) کسی مثلث میں صرف ایک ہی قائمہ زاویہ ہو سکتا ہے۔

 (iii) اگر تین نقاط ایک ہی خط پر واقع ہوں تو وہ ہم خط نقاط کہلاتے ہیں۔

 (iv) دو متوازی خطوط ایک نقطہ پر قطع کرتے ہیں۔

 (v) دو خطوط صرف ایک ہی نقطہ پر قطع کر سکتے ہیں۔



 (vi) ایک متماثل الاضلاع مثلث کے زاویے غیر متماثل ہوتے ہیں۔




2- اگر $\triangle ABC \cong \triangle LMN$ ہو تو

- $m\angle M \cong$ _____ (i)
 $m\angle N \cong$ _____ (ii)
 $m\angle A \cong$ _____ (iii)


3- اگر $\triangle ABC \cong \triangle LMN$ تو نامعلوم x کی مقدار معلوم کریں



4- دی گئی متماثل مثلثوں سے نامعلوم m اور x کی مقدار معلوم کریں۔



5- اگر $\Delta PQR \cong \Delta ABC$ تو نامعلوم x, y, z اور z کی مقدار معلوم کریں۔



خلاصہ

اس یونٹ میں ہم نے درج ذیل مسئلے بیان اور ثابت کیے۔

- ☆ دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور دوسرے مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔
- ☆ اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں۔
- ☆ دو مثلثوں کی مطابقت میں اگر ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسری مثلث کے متناظرہ تین اضلاع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں (ض-ض-ض \equiv ض-ض-ض)۔
- ☆ اگر دو قائمہ زاویہ مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کا وتر اور ایک ضلع دوسری مثلث کے وتر اور متناظرہ ضلع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔ (وتر-ضلع \equiv وتر-ضلع)۔
- ☆ علاوہ ازیں دو مثلثیں متماثل (\equiv) کہلاتی ہیں اگر ان کے درمیان کم از کم ایک (1-1) مطابقت ایسی قائم کی جا سکے جس میں باہم مطابقت رکھنے والے اضلاع اور زاویے متماثل ہوں۔

متوازی الاضلاع اور تکوینی اشکال (PARALLELOGRAMS AND TRIANGLES)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

(Parallelograms) متوازی الاضلاع اشکال (i) 11.1

(Triangles) مثلثیں (ii)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر حاصل نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ ثابت کر سکیں کہ ایک متوازی الاضلاع میں

(i) مخالف اضلاع متماثل ہوتے ہیں

(ii) مخالف زاویے متماثل ہوتے ہیں

(iii) دونوں وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں

☆ ثابت کر سکیں کہ اگر کسی چوکور کے دو مخالف اضلاع متماثل اور متوازی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔

☆ ثابت کر سکیں کہ مثلث کے دو اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے ضلع کے متوازی اور لمبائی میں اس سے نصف ہوتا ہے۔

☆ ثابت کر سکیں کہ مثلث کے تینوں وسطانیے ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں اور یہ نقطہ ہر ایک وسطانیے کا نقطہ مثلث ہوتا ہے۔


☆ اگر تین یا تین سے زیادہ متوازی خطوط ایک خط قاطع پر متماثل قطعات بنائیں تو وہ کسی دوسرے خط قاطع پر بھی متماثل قطعات بنائیں گے۔

تعارف

اس یونٹ کے مسئلے ثابت کرنے سے پیشتر طلباء کے لیے کارآمد ہوگا کہ وہ کثیر الاضلاع اشکال سے متعلق اصطلاحات مثلاً متوازی الاضلاع، مستطیل، مربع، معین، ذوزنقہ، وغیرہ اور بالخصوص مثلثوں اور ان کی مماثلت کے بارے میں اپنی معلومات کو دہرائیں۔

مسئلہ 11.1.1

ایک متوازی الاضلاع میں



- (i) مخالف اضلاع باہم متماثل ہوتے ہیں
- (ii) مخالف زاویے باہم متماثل ہوتے ہیں
- (iii) دونوں وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں

معلوم متوازی الاضلاع ABCD میں

$\overline{BC} \parallel \overline{AD}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ اور وتر \overline{AC} اور \overline{BD} باہم نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔

$$\overline{AD} \cong \overline{BC}, \overline{AB} \cong \overline{DC} \quad (i)$$

$$\angle BAD \cong \angle BCD, \angle ABC \cong \angle ADC \quad (ii)$$

$$\overline{OB} \cong \overline{OD}, \overline{OA} \cong \overline{OC} \quad (iii)$$

عمل شکل کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$ رکھے۔

ثبوت

بیانات	دلائل
$\Delta ABD \leftrightarrow \Delta CDB$ میں (i)	
$\angle 4 \cong \angle 1$	متبادلہ زاویے
$\overline{BD} \cong \overline{BD}$	مشترک
$\angle 2 \cong \angle 3$	متبادلہ زاویے


ز-ض-ز \cong ز-ض-ز	$\therefore \Delta ABD \cong \Delta CDB$
متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع	اس لیے $\overline{AB} \cong \overline{DC}, \overline{AD} \cong \overline{BC}$
متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے	اور $\angle A \cong \angle C$
	اب (ii)
ثابت شدہ	$\angle 1 \cong \angle 4 \dots\dots (a)$
ثابت شدہ	$\angle 2 \cong \angle 3 \dots\dots (b)$
نتیجہ (a) اور (b) سے	$\therefore m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 4 + m\angle 3$
	یا $m\angle ADC = m\angle ABC$
	یا $\angle ADC \cong \angle ABC$
(i) میں ثابت شدہ	اور $\angle BAD \cong \angle BCD$
	میں $\Delta BOC \leftrightarrow \Delta DOA$ (iii)
ثابت شدہ	$\overline{BC} \cong \overline{AD}$
اسی زاویے	$\angle 5 \cong \angle 6$
ثابت شدہ	$\angle 3 \cong \angle 2$
ز-ض-ز \cong ز-ض-ز	$\therefore \Delta BOC \cong \Delta DOA$
متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع	لہذا $\overline{OC} \cong \overline{OA}, \overline{OB} \cong \overline{OD}$

نتیجہ صریح: متوازی الاضلاع کا ہر ایک وتر اسے دو متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

مثال ثابت کریں کہ متوازی الاضلاع کے کسی ایک ضلع کے ساتھ بننے والے زاویوں کے ناصف باہم عمود ہوتے ہیں

معلوم متوازی الاضلاع ABCD میں $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ اور $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

$\angle A$ اور $\angle B$ کے ناصف ایک دوسرے کو نقطہ E پر ملتے ہیں۔



مطلوب $m\angle E = 90^\circ$

عمل شکل کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1$ اور $\angle 2$ رکھیں۔


بیانات	دلائل
$m\angle 1 + m\angle 2$	
$= \frac{1}{2} (m\angle BAD + m\angle ABC)$	معلوم $m\angle 2 = \frac{1}{2} m\angle ABC$ اور $m\angle 1 = \frac{1}{2} m\angle BAD$
$= \frac{1}{2} (180^\circ)$	$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ (معلوم) اور ان کے خط قاطع AB کے ایک ہی طرف کے اندرونہ زاویے سپلیمنٹری ہوتے ہیں۔
$= 90^\circ$	
$m\angle E = 90^\circ$	$90^\circ = \angle 2 + \angle 1$ (ثابت شدہ)
لہذا $\triangle ABE$ میں	

مشق 11.1

- 1- اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 130° کا ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقداریں معلوم کیجیے۔
- 2- اگر ایک متوازی الاضلاع کے ایک ضلع کو بڑھانے سے بننے والا ایک بیرونی زاویہ 40° کا ہو تو اس کے اندرونی زاویوں کی مقداریں معلوم کیجیے۔

مسئلہ 11.1.2

اگر کسی چوکور کے دو مخالف اضلاع متماثل اور متوازی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔



معلوم چوکور ABCD میں $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ اور $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

مطلوب ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔

عمل نقطہ B کو D سے ملایا اور شکل کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1, \angle 2, \angle 3,$ اور $\angle 4$ رکھے۔

بیانات	دلائل
$\Delta ABD \leftrightarrow \Delta CDB$ میں	
$\overline{AB} \cong \overline{DC}$	معلوم
$\angle 2 \cong \angle 1$	متبادلہ زاویے
$\overline{BD} \cong \overline{BD}$	مشترک
$\therefore \Delta ABD \cong \Delta CDB$	ض۔ ز۔ ض کا موضوعہ
$\angle 4 \cong \angle 3$ (i) اب	متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے
$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ (ii) اس لیے	(i) کی رو سے
$\overline{AD} = \overline{BC}$ (iii)	متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع
$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ (iv) اور	معلوم
ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔ پس	(ii) - (iv) کی رو سے

مشق 11.2

1- ثابت کیجیے کہ چوکور متوازی الاضلاع ہوگی اگر اس کے

(a) مخالف زاویے متماثل ہوں

(b) وتر باہم تنصیف کریں


2- اگر کسی چوکور کے مخالف اضلاع باہم متماثل ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔

مسئلہ 11.3

مثلث کے دو اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے ضلع کے متوازی اور لمبائی میں اس سے نصف

ہوتا ہے۔

معلوم



ΔABC میں \overline{AB} کا وسطی نقطہ L

ہے اور \overline{AC} کا وسطی نقطہ M ہے۔

$$m\overline{LM} = \frac{1}{2} m\overline{BC} \quad \text{اور} \quad \overline{LM} \parallel \overline{BC} \quad \text{مطلوب عمل}$$

نقطہ M اور L کو ملایا اور \overline{ML} کو N تک اس طرح بڑھایا کہ $\overline{ML} \equiv \overline{LN}$


N کو B سے ملایا اور شکل میں زاویوں کے نام $\angle 1$ ، $\angle 2$ اور $\angle 3$ رکھے۔

ثبوت

دلائل	بیانات
	$\Delta BNL \leftrightarrow \Delta ALM$ میں
معلوم	$\overline{BL} \equiv \overline{AL}$
رہی زاویے	$\angle 1 \equiv \angle 2$
عمل	$\overline{NL} \equiv \overline{ML}$
ض۔ ض۔ کا موضوعہ	$\therefore \Delta BNL \equiv \Delta ALM$
متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے	$\therefore \angle A \equiv \angle 3$ (i)
متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع	$\overline{NB} \equiv \overline{AM}$ (ii)
(i) کی رو سے	$\overline{NB} \parallel \overline{AM}$ لیکن
M، AC پر واقع ہے	$\Rightarrow \overline{NB} \parallel \overline{MC}$ (iii)
معلوم	$\overline{MC} \equiv \overline{AM}$ (iv)
نتیجہ (ii) اور (iv) سے	$\overline{NB} \equiv \overline{MC}$ (v)
نتیجہ (iii) اور (v) سے	لہذا BCMN ایک متوازی الاضلاع ہے۔
متوازی الاضلاع BCMN کے مخالف اضلاع	اس لیے $\overline{BC} \parallel \overline{LM}$ یا $\overline{BC} \parallel \overline{NL}$
متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع	$\overline{BC} \equiv \overline{NM}$ (vi)
عمل	$m\overline{LM} = \frac{1}{2} m\overline{NM}$ (vii) لیکن
نتیجہ (vi) اور (vii) سے	$m\overline{LM} = \frac{1}{2} m\overline{BC}$ پس

نوٹ \overline{ML} کو نقطہ N تک بڑھانے کی بجائے ہم \overline{LM} کو نقطہ M سے آگے بڑھا کر اس پر بھی نقطہ N لے سکتے ہیں۔

مثال ثابت کیجیے کہ کسی چوکور کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ترتیب وار ملانے والے قطعات خط متوازی الاضلاع بناتے ہیں۔



معلوم چوکور ABCD میں نقاط P، Q، R اور S بالترتیب

اضلاع \overline{AB} ، \overline{BC} ، \overline{CD} اور \overline{DA} کے وسطی نقاط

ہیں۔ نقاط P کو Q سے، Q کو R سے، R کو S سے اور S کو P سے ملایا گیا ہے۔

مطلوب PQRS ایک متوازی الاضلاع ہے۔

نقطہ A کو نقطہ C سے ملائیں

عمل

ثبوت

بیانات	دلائل
<p>میں $\triangle DAC$</p> <p>$\overline{SR} \parallel \overline{AC}$</p> <p>$m\overline{SR} = \frac{1}{2} m\overline{AC}$</p>	<p>S وسطی نقطہ ہے \overline{DA} کا اور</p> <p>R وسطی نقطہ ہے \overline{CD} کا</p>
<p>میں $\triangle BAC$</p> <p>$\overline{PQ} \parallel \overline{AC}$</p> <p>$m\overline{PQ} = \frac{1}{2} m\overline{AC}$</p> <p>$\therefore \overline{SR} \parallel \overline{PQ}$</p> <p>$m\overline{SR} = m\overline{PQ}$</p> <p>لہذا PQRS ایک متوازی الاضلاع ہے۔</p>	<p>P وسطی نقطہ ہے \overline{AB} کا اور</p> <p>Q وسطی نقطہ ہے \overline{BC} کا</p> <p>ہر ایک \overline{AC} کے متوازی ہے۔</p> <p>ہر ایک $m\overline{AC}$ کا نصف ہے۔</p> <p>$m\overline{SR} = m\overline{PQ}$ ، $\overline{SR} \parallel \overline{PQ}$ (ثابت شدہ)</p>

مشق 11.3

1- ثابت کیجیے کہ کسی چوکور کے مخالف اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے قطعات خط باہم تنصیف کرتے ہیں۔


2- ثابت کیجیے کہ مستطیل کے مخالف اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے قطعات خط ایک دوسرے کی قائمہ زاویہ پر

تنصیف کرتے ہیں۔ (اشارہ: مستطیل کے وتر متماثل ہوتے ہیں)

3- ثابت کیجیے کہ مثلث کے کسی ضلع کے وسطی نقطہ میں سے دوسرے ضلع کے متوازی قطعہ خط تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔

مسئلہ 11.1.4

مثلث کے تینوں وسطیہ ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں اور یہ نقطہ ہر ایک وسطیہ کا نقطہ تثلیث ہوتا ہے۔



معلوم $\triangle ABC$

مطلوب $\triangle ABC$ کے وسطیہ ہم نقطہ ہیں اور یہ مشترک نقطہ ہر ایک وسطیہ کی تثلیث کرتا ہے۔

عمل $\triangle ABC$ کے دو وسطیہ \overline{BE} اور \overline{CF} کھینچے جو ایک دوسرے کو G پر قطع کرتے ہیں۔

$\overline{AG} \cong \overline{GH}$ کو G سے ملا کر نقطہ H تک بڑھایا اس طرح کہ

H کو نقاط B اور C سے ملایا۔ \overline{AH} اور \overline{BC} کا نقطہ تقاطع D ہے۔

ثبوت

بیانات	دلائل
$\triangle ACH$ میں	
$\overline{GE} \parallel \overline{HC}$	G اور E بالترتیب \overline{AH} اور \overline{AC} کے وسطی نقاط ہیں۔
..... (i)	یا $\overline{BE} \parallel \overline{HC}$ پر واقع ہے۔
اسی طرح	
$\overline{CF} \parallel \overline{HB}$	نتیجہ (i) سے
..... (ii)	نتیجہ (i) اور (ii) سے
لہذا $BHCG$ ایک متوازی الاضلاع ہے۔	متوازی الاضلاع $BHCG$ کے وتر \overline{BC} اور \overline{GH} ایک
اور (iii)	دوسرے کو نقطہ D پر قطع کرتے ہیں۔

(یا D ضلع BC کا وسطی نقطہ ہے) $\therefore \overline{BD} \cong \overline{CD}$

یعنی \overline{AD} مثلث ABC کا وسطانیہ ہے۔

وسطانیہ \overline{AD} ، \overline{BE} اور \overline{CF} نقطہ G میں سے گزرتے ہیں۔ \overline{BE} اور \overline{CF} کا نقطہ تقاطع G ہے اور \overline{AD} بھی اس میں سے گزرتا ہے۔

اب

$$\overline{GH} \cong \overline{AG} \quad \dots\dots (iv)$$

$$\therefore m\overline{GD} = \frac{1}{2} m\overline{AG}$$

اور

(v) \overline{AD} کا نقطہ تثلیث G ہے۔

اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے کہ

\overline{BE} اور \overline{CF} کا نقطہ تثلیث بھی G ہے۔


مشق 11.4

- 1- ایک مثلث کے وسطانیہ جس نقطہ پر ہم نقطہ ہیں اس کا مثلث کے راسوں سے فاصلہ بالترتیب 1.4cm ، 1.2cm اور 1.6 cm ہے۔ وسطانیوں کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔
- 2- ثابت کیجیے کہ ایک مثلث کے وسطانیہ اور اس کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے سے بننے والی مثلث کے وسطانیہ ایک ہی نقطہ پر ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

مسئلہ 11.1.5

اگر تین یا تین سے زیادہ متوازی خطوط ایک خط قاطع پر متماثل قطعات بنائیں تو وہ کسی دوسرے خط قاطع

پر بھی متماثل قطعات بنائیں گے۔



معلوم $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD} \parallel \overleftrightarrow{EF}$

\overleftrightarrow{LX} ان کو بالترتیب M، N اور P پر اس طرح قاطع

کرتا ہے کہ $\overline{MN} \cong \overline{NP}$

\overleftrightarrow{QY} ان کو بالترتیب S، R اور T پر قطع کرتا ہے۔

$$\overline{RS} \cong \overline{ST}$$

مطلوب

عمل

R میں سے $\overline{RU} \parallel \overline{LX}$ کھینچا جو \overline{CD} کو نقطہ U پر ملا۔

S میں سے $\overline{SV} \parallel \overline{LX}$ کھینچا جو \overline{EF} کو نقطہ V پر ملا۔

شکل کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1$ ، $\angle 2$ ، $\angle 3$ اور $\angle 4$ رکھے۔

ثبوت


بیانات	دلائل
MNUR ایک متوازی الاضلاع ہے۔	$\overline{RU} \parallel \overline{LX}$ (عمل) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ (معلوم)
$\therefore \overline{MN} \cong \overline{RU}$ (i)	متوازی الاضلاع MNUR کے مخالف اضلاع
$\overline{NP} \cong \overline{SV}$ (ii)	نتیجہ (i) سے
$\overline{MN} \cong \overline{NP}$ (iii)	معلوم
$\therefore \overline{RU} \cong \overline{SV}$	نتیجہ (i)، (ii) اور (iii) سے
$\therefore \overline{RU} \parallel \overline{SV}$	ہر ایک \overleftrightarrow{LX} کے متوازی ہے (عمل)
$\angle 1 \cong \angle 2$	متناظرہ زاویے
$\angle 3 \cong \angle 4$	متناظرہ زاویے
پس	
میں $\Delta RUS \leftrightarrow \Delta SVT$	
$\overline{RU} \cong \overline{SV}$	ثابت شدہ
$\angle 1 \cong \angle 2$	ثابت شدہ
$\angle 3 \cong \angle 4$	ثابت شدہ
$\therefore \Delta RUS \cong \Delta SVT$	ض۔ض۔ض = ض۔ض۔ض
$\overline{RS} \cong \overline{ST}$	متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع
لہذا	

نوٹ

یہ مسئلہ ایک قطع خط کو متماثل (برابر) حصوں میں تقسیم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ علاوہ ازیں کسی قطعہ خط کو دیے گئے متناسب لمبائیوں والے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

نتائج صریح

(i) اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ میں سے کسی دوسرے ضلع کے متوازی خط کھینچا جائے تو وہ تیسرے ضلع کی تنصیف کرے گا۔



معلوم ΔABC میں \overline{AB} کا وسطی نقطہ D ہے (یعنی $AD = DB$)

اور $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ہے جو AC کو نقطہ E قطع کرتا ہے۔

مطلوب $\overline{AE} \cong \overline{EC}$

عمل نقطہ A میں سے گزرتا ہوا \overleftrightarrow{LM} متوازی \overline{BC} کھینچیں۔


ثبوت

بیانات	دلائل
\overleftrightarrow{LM} , \overline{DE} , \overline{BC} خط قاطع \overline{AC} پر متماثل قطعات بناتے ہیں۔	\overleftrightarrow{LM} , \overline{DE} , \overline{BC} تینوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں (معلوم، عمل) اور قاطع \overline{AB} پر متماثل قطعات $\overline{AD} \cong \overline{DB}$ بناتے ہیں۔
یعنی $\overline{AE} \cong \overline{EC}$	

(ii) ذوزنقہ کے ایک غیر متوازی ضلع کے وسطی نقطہ میں سے متوازی اضلاع کے متوازی خط، دوسرے غیر متوازی ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔

(iii) اگر کسی مثلث کے ضلع کو چند متماثل حصوں میں تقسیم کر کے تقسیم کردہ نقاط میں سے کسی دوسرے ضلع کے متوازی خطوط کھینچے جائیں تو وہ تیسرے ضلع پر متماثل قطعات بنائیں گے۔


مشق 11.5



1- سامنے دی گئی شکل میں $\overleftrightarrow{AX} \parallel \overleftrightarrow{BY} \parallel \overleftrightarrow{CZ} \parallel \overleftrightarrow{DU} \parallel \overleftrightarrow{EV}$

اور $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD} \cong \overline{DE}$

اگر $m\overline{MN} = 1 \text{ cm}$ ہو تو \overline{LN} اور \overline{LQ} کی لمبائی معلوم کریں۔



2- ایک قطعہ خط 5.5 cm لمبائے کر اس کو 5 متماثل حصوں میں تقسیم کیجیے۔

(اشارہ: ایک حادہ زاویہ BAX بنائیں۔ \overline{AX} پر

$\overline{AP} \cong \overline{PQ} \cong \overline{QR} \cong \overline{RS} \cong \overline{ST}$ لے کر T کو B سے ملائیں۔

نقاط P, Q, R, S میں سے \overline{TB} کے متوازی خطوط کھینچیں)

اعادہ مشق 11

1- خالی جگہ پر کریں۔

(i) متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع ہوتے ہیں۔


(ii) متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ہوتے ہیں۔

(iii) متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کو ایک نقطہ پر کرتے ہیں۔

(iv) مثلث کے وسطانیے ہوتے ہیں۔

(v) متوازی الاضلاع کا کوئی ایک وتر اسے دو مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

2- سامنے دی گئی متوازی الاضلاع ABCD میں




(i) $m\overline{AB} \dots\dots\dots m\overline{DC}$


(ii) $m\overline{BC} \dots\dots\dots m\overline{AD}$

(iii) $m\angle 1 \cong \dots\dots\dots$


(iv) $m\angle 2 \cong \dots\dots\dots$



3- سامنے دی گئی شکل میں نامعلوم x° ، y° ، m° اور n° کی مقدار معلوم کریں۔



4- سامنے دی گئی شکل میں اگر متوازی الاضلاع ہو تو x اور m کی مقدار معلوم کریں۔



5- سامنے دی گئی شکل میں LMNP ایک متوازی الاضلاع ہے۔ m اور n کی قیمت معلوم کریں۔

6- مندرجہ بالا سوال نمبر 5 میں متوازی الاضلاع کے دو مخالف زاویوں کا مجموعہ 110° ہے۔ زاویوں میں سے ہر ایک کی مقدار معلوم کریں۔

خلاصہ

اس یونٹ میں ہم مندرجہ ذیل مسئلے زیر بحث لائے اور انہیں کچھ سوالات حل کرنے میں استعمال کیا۔ ان کے علاوہ کچھ اضافی سوالات بھی طلباء کی عملی مہارت بڑھانے کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔

☆ ایک متوازی الاضلاع میں

(i) مخالف اضلاع متماثل ہوتے ہیں

(ii) مخالف زاویے متماثل ہوتے ہیں

(iii) دونوں وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔

☆ اگر کسی چوکور کے دو مخالف اضلاع متماثل اور متوازی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔

☆ مثلث کے دو اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے ضلع کے متوازی اور لمبائی میں اس سے نصف ہوتا ہے۔

☆ مثلث کے تینوں وسطیہ ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں اور یہ نقطہ ہر ایک وسطیہ کا نقطہ تثلیث ہوتا ہے۔

☆ اگر تین یا تین سے زیادہ متوازی خطوط ایک خط قاطع پر متماثل قطعات بنائیں تو وہ کسی دوسرے خط قاطع پر بھی متماثل قطعات بنائیں گے۔

خط اور زاویہ کے ناصف

(LINE BISECTORS AND ANGLE BISECTORS)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

12.1(i) قطعہ خط کا ناصف (Bisector of a Line Segment)

(ii) زاویہ کا ناصف (Bisector of an Angle)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ☆ ثابت کر سکیں کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔
- ☆ ثابت کر سکیں کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔
- ☆ ثابت کر سکیں کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔
- ☆ ثابت کر سکیں کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔
- ☆ ثابت کر سکیں کہ اگر کسی زاویے کے اندرون میں ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔
- ☆ ثابت کر سکیں کہ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

تعارف

اس پونٹ میں ہم کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف اور کسی زاویہ کے ناصف کے بارے میں مسئلے اور ان کے عکس ثابت کریں گے۔ لیکن بہتر ہوگا کہ ایسا کرنے سے پیشتر مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کو دہرائیں۔

قطعہ خط کا عمودی ناصف


ایک خط l کسی قطعہ خط کا عمودی ناصف کہلاتا ہے اگر l قطعہ خط پر عمود بھی ہو اور قطعہ خط کے وسطی نقطہ میں سے بھی گزرے۔

زاویہ کا ناصف

اگر $\angle ABC$ کے اندر کوئی نقطہ P اس طرح واقع ہو کہ $m\angle ABP = m\angle PBC$ تو \overline{BP} کو $\angle ABC$ کا ناصف کہتے ہیں۔ (یعنی \overline{BP} زاویہ ABC کی تنصیف کرتی ہے)

مسئلہ 12.1.1

اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔



معلوم ایک خط LM قطعہ خط AB کو نقطہ C پر اس طرح قطع کرتا ہے کہ

$$\overleftrightarrow{LM} \perp \overline{AB} \text{ اور } \overline{AC} \cong \overline{BC}$$

مطلوب $\overline{PA} \cong \overline{PB}$


عمل \overleftrightarrow{LM} پر ایک نقطہ P لیں۔ P کو نقاط A اور B سے ملائیں۔

ثبوت

بیانات	دلائل
$\Delta ACP \leftrightarrow \Delta BCP$ میں	
$\overline{AC} \cong \overline{BC}$	معلوم
$\angle ACP \cong \angle BCP$	$\overline{PC} \perp \overline{AB}$ (معلوم) یعنی C پر ہر ایک زاویہ $= 90^\circ$
$\overline{PC} \cong \overline{PC}$	مشترک
$\therefore \Delta ACP \cong \Delta BCP$	ض۔ ض۔ ض کا موضوع
$\overline{PA} \cong \overline{PB}$	متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع
پس	

مسئلہ 12.1.2 (مسئلہ 12.1.1 کا عکس)

اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔



معلوم \overline{AB} ایک قطعہ خط ہے۔ ایک نقطہ P ایسا ہے کہ $\overline{PA} \cong \overline{PB}$

مطلوب نقطہ P، \overline{AB} کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔

عمل نقطہ P کو \overline{AB} کے وسطی نقطہ C سے ملائیں۔

ثبوت

دلائل	بیانات
	$\triangle ACP \leftrightarrow \triangle BCP$ میں
معلوم	$\overline{PA} \cong \overline{PB}$
مشترک	$\overline{PC} \cong \overline{PC}$
عمل	$\overline{AC} \cong \overline{BC}$
ض-ض-ض \cong ض-ض-ض	$\therefore \triangle ACP \cong \triangle BCP$
متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے	$\therefore \angle ACP \cong \angle BCP \dots\dots (i)$
سپلیمنٹری زاویے	لیکن $m\angle ACP + m\angle BCP = 180^\circ \dots\dots (ii)$
نتائج (i) اور (ii) کی رو سے	اس لیے $m\angle ACP = m\angle BCP = 90^\circ$
$m\angle ACP = 90^\circ$ (ثابت شدہ)	$\therefore \overline{PC} \perp \overline{AB} \dots\dots (iii)$
عمل	$\overline{CA} \cong \overline{CB} \dots\dots (iv)$
نتائج (iii) اور (iv) کی رو سے	پس \overline{PC} عمودی ناصف ہے \overline{AB} کا
	یعنی نقطہ P، \overline{AB} کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔

مشق 12.1


1- ثابت کیجیے کہ کسی دائرہ کا مرکز اس کے ہر ایک قطر کے عمودی ناصف پر ہوتا ہے۔

2- تین غیر ہم خط نقاط میں سے گزرنے والے دائرہ کا مرکز کہاں ہوگا اور کیوں؟

تین دیہات P، Q اور R ایک سیدھ میں نہیں ہیں۔ ان کے باشندوں نے ایک ایسے مقام پر چلڈرن پارک بنانے کا پروگرام بنایا جس کا فاصلہ ان تینوں دیہاتوں سے یکساں ہو۔ چلڈرن پارک کے مقام کو متعین کر کے ثابت کریں کہ یہ مقام تینوں دیہاتوں سے مساوی الفاصلہ ہے۔

مسئلہ 12.1.3

کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔



معلوم ABC ایک مثلث ہے۔

مطلوب \overline{AB} ، \overline{BC} اور \overline{CA} کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں۔

عمل \overline{AB} اور \overline{BC} کے عمودی ناصف کھینچیں جو ایک

دوسرے کو نقطہ O پر ملتے ہیں۔ نقطہ O کو A، B،

اور C سے ملائیں۔

ثبوت


بیانات	دلائل
(i) $\overline{OA} \cong \overline{OB}$	ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔
(ii) $\overline{OB} \cong \overline{OC}$	نتیجہ (i) کی رو سے
(iii) $\overline{OA} \cong \overline{OC}$	نتیجہ (i) اور (ii) کی رو سے
(iv) ... نقطہ O، \overline{CA} کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔	نتیجہ (iii) سے نقطہ O نقاط A اور C سے مساوی الفاصلہ ہے۔
(v) لیکن نقطہ O، \overline{AB} اور \overline{BC} کے عمودی ناصفوں پر واقع ہے	عمل
لہذا ΔABC کے تینوں اضلاع \overline{AB} ، \overline{BC} اور \overline{CA} کے عمودی ناصف نقطہ O میں سے گزرتے ہیں۔	نتیجہ (iv) اور (v) کی رو سے

مشاہدہ کریں کہ

- (a) حادہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے اندر قطع کرتے ہیں۔
- (b) قائمہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو وتر پر قطع کرتے ہیں۔
- (c) منفرجہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے باہر قطع کرتے ہیں۔

مسئلہ 12.1.4

کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔



معلوم $\angle AOB$ کی ناصف \vec{OM} پر کوئی نقطہ P واقع ہے۔

مطلوب $m\overline{PQ} = m\overline{PR}$ یعنی نقطہ P ، \vec{OA} اور \vec{OB} سے ہم فاصلہ ہے۔

عمل P سے \vec{OA} اور \vec{OB} پر $\overline{PR} \perp \vec{OA}$ اور $\overline{PQ} \perp \vec{OB}$ کھینچیں۔


ثبوت

بیانات	دلائل
$\Delta POQ \leftrightarrow \Delta POR$ میں $\overline{OP} \cong \overline{OP}$ $\angle PQO \cong \angle PRO$ $\angle POQ \cong \angle POR$ $\therefore \Delta POQ \cong \Delta POR$ $\overline{PQ} \cong \overline{PR}$ پس	مشترک عمل معلوم ض-ز-ز \cong ض-ز-ز متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع

مسئلہ 12.1.5 (عکس مسئلہ 12.1.4)

اگر کسی زاویے کے اندرون میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے

ناصف پر واقع ہوتا ہے۔



معلوم $\angle AOB$ کے اندرون میں ایک نقطہ P اس طرح لیں کہ

$\overline{PQ} \cong \overline{PR}$ جبکہ $\overline{PQ} \perp \vec{OB}$ اور $\overline{PR} \perp \vec{OA}$ ہے۔

مطلوب نقطہ P ، $\angle AOB$ کے ناصف پر واقع ہے۔

عمل نقطہ P کو نقطہ O سے ملائیں۔

بیانات	دلائل
$\Delta POQ \leftrightarrow \Delta POR$ میں $\angle PQO \cong \angle PRO$ $\overline{PO} \cong \overline{PO}$ $\overline{PQ} \cong \overline{PR}$ $\therefore \Delta POQ \cong \Delta POR$ اس لیے $\angle POQ \cong \angle POR$ لہذا پس نقطہ 'P' $\angle AOB$ کے ناصف پر واقع ہے۔	معلوم (قائمہ زاویے) مشترک معلوم وتر-ضلع \cong وتر-ضلع متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے

مشق 12.2

- 1- ایک چوکور ABCD میں $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ اور $\overline{AD} \cong \overline{CD}$ کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو نقطہ N پر ملتے ہیں۔ ثابت کریں کہ \overline{BN} ناصف ہے $\angle ABC$ کا۔
- 2- چوکور ABCP کے $\angle A$ ، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف نقطہ O پر ملتے ہیں۔ ثابت کریں کہ $\angle P$ کا ناصف بھی نقطہ O میں سے گزرے گا۔
- 3- ثابت کریں کہ مساوی الساقین مثلث کے متماثل اضلاع کے عمودی ناصف اس کے ارتفاع کو ایک ہی نقطہ پر قطع کرتے ہیں۔
- 4- ثابت کریں کہ مثلث کے تینوں ارتفاع ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

مسئلہ 12.1.6

کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔


معلوم ΔABC

مطلوب $\angle A$ ، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف ہم نقطہ ہوں گے۔

عمل $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف کھینچیں جو ایک دوسرے کو نقطہ I

پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ I سے

$\overline{IF} \perp \overline{AB}$ ، $\overline{ID} \perp \overline{BC}$ اور $\overline{IE} \perp \overline{CA}$ کھینچیں۔



بیانات	دلائل
$\overline{ID} \cong \overline{IF}$	عمل (کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ
$\overline{ID} \cong \overline{IE}$	اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے)۔
$\therefore \overline{IE} \cong \overline{IF}$	ہر ایک \overline{ID} کے متماثل ہے (ثابت شدہ)
لہذا نقطہ I واقع ہے $\angle A$ کے ناصف پر	
..... (i)	
لیکن نقطہ I، $\angle ABC$ اور $\angle BCA$ کے	عمل
ناصفوں پر بھی واقع ہے۔	
..... (ii)	
پس $\angle A$ ، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف I پر ہم نقطہ ہیں۔	نتیجہ (i) اور (ii) کی رو سے

نوٹ عملی جیومیٹری میں کسی دی گئی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف کھینچ کر ہم تصدیق کریں گے کہ یہ ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

مشق 12.3

1- ثابت کریں کہ مساوی الساقین مثلث کے قاعدہ پر زاویوں کے ناصف اس مثلث کے ارتفاع پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

2- ثابت کریں کہ مثلث کے دو بیرونی اور تیسرے اندرونی زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

اعادہ مشق 12

1- مندرجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔

(i) لفظ تنصیف سے مراد دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔

(ii) کسی قطعہ خط کی عمودی تنصیف سے مراد یہ ہے کہ اس قطعہ خط پر ایسا عمود کھینچنا جو اس کے وسطی نقطہ میں

سے گزرے۔


(iii) کوئی نقطہ جو ایک قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو وہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ نہیں ہوتا۔

(iv) کوئی نقطہ ایک قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوتا ہے۔

(v) کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ نہیں ہوتے۔

(vi) کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

(vii) ایک زاویہ کے اندرون میں کوئی نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔



2- اگر \vec{CD} قطعہ خط AB کا عمودی ناصف ہو تو


(i) $m\overline{OA} = \dots\dots$

(ii) $m\overline{AQ} = \dots\dots$

3- مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں۔


(i) قطعہ خط کا ناصف

(ii) زاویہ کا ناصف



4- دی گئی مساوی الاضلاع مثلث ABC میں \overline{AD}

زاویہ A کا ناصف ہے۔ نامعلوم x° ، y° اور z° کی قیمت معلوم کریں۔




5- دی گئی متماثل مثلثان LMO اور LNO میں

نامعلوم x اور m کی مقدار معلوم کریں۔

6- سامنے کی شکل میں \overline{CD} قطعہ خط AB کا

عمودی ناصف ہے۔



(i) اگر $m\overline{AB} = 6 \text{ cm}$ ہو تو $m\overline{AL}$ اور $m\overline{LB}$ معلوم کریں۔

(ii) اگر $m\overline{BD} = 4 \text{ cm}$ ہو تو $m\overline{AD}$ معلوم کریں۔

خلاصہ

اس یونٹ میں ہم نے درج ذیل مسئلے بیان اور ثابت کرنا سیکھے۔

☆ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔

☆ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔

☆ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

☆ کسی زاویہ کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔

☆ اگر کسی زاویے کے اندرون میں ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف

پر واقع ہوتا ہے۔

☆ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

• کسی قطعہ خط کی عمودی تنصیف سے مراد یہ ہے کہ اس قطعہ خط پر ایسا عمود کھینچنا جو اس کے وسطی نقطہ میں سے

گزرے۔

• کسی زاویہ کی تنصیف سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی شعاع کھینچیں جو دیے گئے زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم

کرنے۔

مثلث کے اضلاع اور زاویے

(SIDES AND ANGLES OF A TRIANGLE)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

13.1(i) مثلث کے اضلاع (Sides of a Triangle)

(ii) مثلث کے زاویے (Angles of a Triangle)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ ثابت کر سکیں کہ اگر کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار (چھوٹے ضلع کے سامنے والے زاویے کی مقدار سے) زیادہ ہوگی۔

☆ ثابت کر سکیں کہ اگر کسی مثلث کے دو زاویے مقدار میں برابر نہ ہوں تو مقدار میں بڑے زاویے کے سامنے والا ضلع چھوٹے زاویے کے سامنے والے ضلع سے زیادہ لمبا ہوگا۔


☆ ثابت کر سکیں کہ کسی بھی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔

☆ ثابت کر سکیں کہ کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ، نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے چھوٹا ہوگا۔

تعارف

آپ کو یاد ہو گا کہ اگر کسی مثلث کے دو ضلعے متماثل ہوں تو ان کے بالمقابل زاویے بھی متماثل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے بالمقابل ضلعے بھی متماثل ہوتے ہیں۔ لیکن اس یونٹ میں کسی مثلث کے اضلاع اور زاویوں کے درمیان نابرابری سے متعلق کچھ دلچسپ مسئلے بیان اور ثابت کر کے اضافی معلومات کا مطالعہ کریں گے۔

اگر کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار (چھوٹے ضلع کے سامنے والے زاویے کی مقدار سے) زیادہ ہوگی۔



معلوم $\triangle ABC$ میں

$$m\overline{AC} > m\overline{AB}$$

$$m\angle ABC > m\angle ACB$$

مطلوب


عمل \overline{AC} پر نقطہ D پر اس طرح لیا کہ $\overline{AD} \cong \overline{AB}$ اور نقطہ B کو D سے ملایا۔

اس طرح $\triangle ADB$ مساوی الساقین مثلث حاصل ہوئی۔ شکل کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1$ اور $\angle 2$ رکھے۔

ثبوت

بیانات	دلائل
$\triangle ABD$ میں	
$m\angle 1 = m\angle 2$ (i)	متماثل اضلاع کے سامنے والے زاویے (عمل)
$\triangle BCD$ میں	
$m\angle 2 > m\angle ACB$ (ii)	مثلث کا بیرونی زاویہ سامنے والے غیر متصل اندرونی زاویے سے بڑا ہوتا ہے۔
$\therefore m\angle 1 > m\angle ACB$ (iii)	(i) اور (ii) کی رو سے
لیکن $m\angle ABC = m\angle 1 + m\angle DBC$	زاویوں کی جمع کا موضوعہ
$\therefore m\angle ABC > m\angle 1$ (iv)	
$\therefore m\angle ABC > m\angle 1 > m\angle ACB$	(iii) اور (iv) کی رو سے
$m\angle ABC > m\angle ACB$ لہذا	اعداد کی نابرابری کی خاصیت متعدیت

مثال 1 ثابت کریں کہ کسی مختلف الاضلاع مثلث میں سب سے بڑی لمبائی والے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار 60° سے زیادہ ہوگی۔ (یعنی قائمہ زاویہ کے دو تہائی سے زیادہ ہوگی)



معلوم $\triangle ABC$ میں

$$AC > AB > BC$$


مطلوب $m\angle B > 60^\circ$

ثبوت

بیانات	دلائل
$\triangle ABC$ میں	
$m\angle B > m\angle C$	$m\overline{AC} > m\overline{AB}$ (معلوم)
$m\angle B > m\angle A$	$m\overline{AC} > m\overline{BC}$ (معلوم)
لیکن $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$	$\angle A$ ، $\angle B$ اور $\angle C$ مثلث ABC کے اندرونی زاویے ہیں
$\therefore m\angle B + m\angle B + m\angle B > 180^\circ$	$m\angle B > m\angle C$ اور $m\angle B > m\angle A$ (ثابت شدہ)
لہذا $m\angle B > 60^\circ$	$\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$

مثال 2 ایک چوکور ABCD میں \overline{AB} لمبائی میں سب سے بڑا اور \overline{CD} سب سے چھوٹا ضلع ہے۔

ثابت کریں کہ $m\angle BCD > m\angle BAD$



معلوم چوکور ABCD میں ضلع \overline{AB} لمبائی کے لحاظ سے دیگر اضلاع میں

سب سے بڑا اور ضلع \overline{CD} سب سے چھوٹا ہے۔

مطلوب $m\angle BCD > m\angle BAD$


عمل نقطہ A کو نقطہ C سے ملائیں اور شکل کے مطابق

زاویوں کے نام $\angle 1$ ، $\angle 2$ ، $\angle 3$ اور $\angle 4$ رکھیں۔

بیانات	دلائل
ΔABC میں I $m\angle 4 > m\angle 2$	(معلوم) $m\overline{AB} > m\overline{BC}$
ΔACD میں II $m\angle 3 > m\angle 1$	(معلوم) $m\overline{AD} > m\overline{CD}$
$\therefore m\angle 4 + m\angle 3 > m\angle 2 + m\angle 1$	I اور II کی رو سے
$m\angle BCD > m\angle BAD$ لہذا	$m\angle 4 + m\angle 3 = m\angle BCD$ $m\angle 2 + m\angle 1 = m\angle BAD$

مسئلہ 13.1.2 (عکس مسئلہ 13.1.1)

اگر کسی مثلث کے دو زاویے مقدار میں برابر نہ ہوں، تو مقدار میں بڑے زاویے کے سامنے والا ضلع چھوٹے زاویے کے سامنے والے ضلع سے زیادہ لمبا ہوگا۔



معلوم مثلث ABC میں $m\angle A > m\angle B$

مطلوب $m\overline{BC} > m\overline{AC}$

ثبوت

بیانات	دلائل
اگر $m\overline{BC} \neq m\overline{AC}$ ہو تو (i) $m\overline{BC} = m\overline{AC}$ (ii) $m\overline{BC} < m\overline{AC}$ یا (i) کی صورت میں اگر $m\overline{BC} = m\overline{AC}$ ہو تو $m\angle A = m\angle B$ جو کہ ممکن نہیں۔	حقیقی اعداد کی ثلاثی خاصیت متماثل اضلاع کے سامنے والے زاویے متماثل ہوتے ہیں معلوم کے خلاف

(ii) کی صورت میں اگر $m\overline{BC} < m\overline{AC}$ ہو تو

$$m\angle A < m\angle B$$

یہ صورت بھی ممکن نہیں ہے۔

$$\therefore m\overline{BC} \neq m\overline{AC}$$

$$m\overline{BC} < m\overline{AC}$$

اور

$$m\overline{BC} > m\overline{AC}$$

پس


بڑے ضلع کے سامنے والا زاویہ مقدار میں چھوٹے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار سے بڑا ہوتا ہے معلوم کے خلاف

حقیقی اعداد کی خاصیت ثلاثی

نتائج صریح

(i) کسی قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر کی لمبائی باقی ہر دو اضلاع کی لمبائیوں سے بڑی ہوتی ہے۔

(ii) کسی منفرجہ الزاویہ مثلث میں منفرجہ زاویے کے سامنے والا ضلع لمبائی میں ہر دیگر دو اضلاع سے لمبائی میں بڑا ہوتا ہے۔



مثال $\triangle ABC$ ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔ اس کے قاعدہ

\overline{BC} کو نقطہ C سے پرے نقطہ D تک بڑھایا گیا ہے۔

D میں سے گزرتا ہوا ایک قطعہ خط اضلاع \overline{AC} اور

\overline{AB} کو بالترتیب نقاط L اور M پر قطع کرتا ہے۔

ثابت کریں کہ $m\overline{AL} > m\overline{AM}$

معلوم $\triangle ABC$ میں $\overline{AB} \cong \overline{AC}$


\overline{BC} پر C سے پرے ایک نقطہ D ہے۔ D میں سے گزرتا ہوا ایک قطعہ خط \overline{AC} کو L پر اور \overline{AB} کو M پر قطع کرتا ہے۔

مطلوب $m\overline{AL} > m\overline{AM}$

بیانات	دلائل
ΔABC میں $\angle B \cong \angle 2$ I	$\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (معلوم)
ΔMBD میں $m\angle 1 > m\angle B$ II	$\angle 1$ بیرونی اور $\angle B$ غیر متصل اندرونی زاویہ ہے۔
$\therefore m\angle 1 > m\angle 2$ III	I اور II کی رو سے
ΔLCD میں $m\angle 2 > m\angle 3$ IV	$\angle 2$ بیرونی زاویہ غیر متصل اندرونی زاویے سے بڑا ہوتا ہے۔
$\therefore m\angle 1 > m\angle 3$ V	نتائج III اور IV کی رو سے
$\angle 3 \cong \angle 4$ VI لیکن	راسی زاویے
$\therefore m\angle 1 > m\angle 4$	نتائج V اور VI کی رو سے
$m\overline{AL} > m\overline{AM}$ لہذا	ΔALM میں $m\angle 1 > m\angle 4$ (ثابت شدہ)

مسئلہ 13.1.3

کسی بھی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔

 ΔABC

معلوم

مطلوب

$$m\overline{AB} + m\overline{AC} > m\overline{BC} \quad (i)$$

$$m\overline{AB} + m\overline{BC} > m\overline{AC} \quad (ii)$$

$$m\overline{BC} + m\overline{CA} > m\overline{AB} \quad (iii)$$

\vec{CA} پر ایک نقطہ D اس طرح لیں کہ $m\overline{AD} \cong m\overline{AB}$

عمل

نقطہ B کو نقطہ D سے ملائیں اور شکل کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1$ ، $\angle 2$ رکھیں۔

دلائل	بیانات
	میں $\triangle ABD$
$m\overline{AD} \cong m\overline{AB}$ (عمل)	$m\angle 1 \cong m\angle 2$ (i)
$m\angle DBC = m\angle 1 + m\angle ABC$	$m\angle DBC > m\angle 1$ (ii)
نتائج (i) اور (ii) کی رو سے	$\therefore m\angle DBC > m\angle 2$ (iii)
	میں $\triangle DBC$
(iii) کی رو سے	$m\overline{CD} > m\overline{BC}$
$m\overline{CD} = m\overline{AD} + m\overline{AC}$	$\therefore m\overline{AD} + m\overline{AC} > m\overline{BC}$
$m\overline{AD} = m\overline{AB}$ (عمل)	$m\overline{AB} + m\overline{AC} > m\overline{BC}$ لہذا
	اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ
	$m\overline{AB} + m\overline{BC} > m\overline{AC}$
	$m\overline{BC} + m\overline{CA} > m\overline{AB}$ اور

مثال 1 مندرجہ ذیل مثلث کے اضلاع کی لمبائیوں کے سیٹ ہیں۔ ان میں کس سیٹ سے مثلث بنائی جاسکتی

ہے؟

2 cm, 3 cm, 5 cm (a)

3 cm, 4 cm, 5 cm (b)

2 cm, 4 cm, 7 cm (c)

حل (a) چونکہ $2 + 3 = 5$

اس لیے اضلاع کی لمبائیوں کے اس سیٹ سے مثلث نہیں بن سکتی۔ یعنی یہ لمبائیاں کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہو سکتیں۔

(b) چونکہ $3 + 4 > 5$ ، $3 + 5 > 4$ ، $4 + 5 > 3$

اس لیے اضلاع کی لمبائیوں کے اس سیٹ سے مثلث بن سکتی ہے

(c) چونکہ $2 + 4 < 7$

اس لیے اضلاع کی لمبائیوں کے اس سیٹ سے مثلث نہیں بن سکتی۔

ثابت کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی تنصیف کرنے والے وسطانیے کی لمبائی کے دوگنا سے بڑا ہوتا ہے۔

معلوم ΔABC میں وسطانیہ \overline{AD} ضلع \overline{BC} کی نقطہ D پر تنصیف کرتا ہے۔

$$m\overline{AB} + m\overline{AC} > 2(m\overline{AD})$$


مطلوب

عمل \overline{AD} پر ایک نقطہ E اس طرح لیں کہ $\overline{DE} \cong \overline{AD}$

نقطہ C کو نقطہ E سے ملائیں۔

شکل کے مطابق زاویوں کے نام $\angle 1$ ، $\angle 2$ رکھیں۔

ثبوت




بیانات	دلائل
$\Delta ABD \leftrightarrow \Delta ECD$ میں	
$\overline{BD} \cong \overline{CD}$	معلوم
$\angle 1 \cong \angle 2$	راسی زاویے
$\overline{AD} \cong \overline{ED}$	عمل
$\therefore \Delta ABD \cong \Delta ECD$	ض-ض موضوعہ
$\therefore \overline{AB} \cong \overline{EC}$ I	متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع
$m\overline{AC} + m\overline{EC} > m\overline{AE}$ II	ACE ایک مثلث ہے
$m\overline{AC} + m\overline{AB} > m\overline{AE}$	I اور II کی رو سے
$m\overline{AC} + m\overline{AB} > 2m\overline{AD}$	$m\overline{AE} = 2m\overline{AD}$ (عمل)
$m\overline{AB} + m\overline{AC} > 2m\overline{AD}$	لہذا
	یا

مثال 3 ثابت کریں کہ مثلث کے کوئی سے دو اضلاع کی لمبائیاں کا فرق تیسرے ضلع کی لمبائی سے چھوٹا ہوتا ہے۔

ΔABC

معلوم
مطلوب



$$m\overline{AC} - m\overline{AB} < m\overline{BC} \quad (i)$$

$$m\overline{BC} - m\overline{AB} < m\overline{AC} \quad (ii)$$

$$m\overline{BC} - m\overline{AC} < m\overline{AB} \quad (iii)$$

ثبوت

دلائل	بیانات
ABC ایک مثلث ہے دونوں اطراف میں سے $m\overline{AB}$ تفریق کرنے سے	$m\overline{AB} + m\overline{BC} > m\overline{AC}$ $(m\overline{AB} + m\overline{BC} - m\overline{AB}) > (m\overline{AC} - m\overline{AB})$ $\therefore m\overline{BC} > m\overline{AC} - m\overline{AB}$
$a > b \Rightarrow b < a$	$\therefore m\overline{AC} - m\overline{AB} < m\overline{BC}$ (i)
(i) میں دیے گئے دلائل کی طرح	اسی طرح $\begin{cases} m\overline{BC} - m\overline{AB} < m\overline{AC} \\ m\overline{BC} - m\overline{AC} < m\overline{AB} \end{cases}$

مشق 13.1

1- مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 10cm اور 15cm ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی لمبائی تیسرے ضلع کی ممکن ہوگی؟

(a) 5 cm (b) 20 cm (c) 25 cm (d) 30 cm


2- نقطہ O مثلث ABC کا ایک اندرونی نقطہ ہے۔ ثابت کریں کہ

$$m\overline{OA} + m\overline{OB} + m\overline{OC} > \frac{1}{2} (m\overline{AB} + m\overline{BC} + m\overline{CA})$$

3- مثلث ΔABC میں اگر $m\angle B = 70^\circ$ ہو اور $m\angle C = 45^\circ$ تو کون سا ضلع لمبائی میں سب سے بڑا

اور کون سا سب سے چھوٹا ہوگا؟

4- ثابت کریں کہ کسی قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر کی لمبائی باقی ہر دو اضلاع کی لمبائیوں سے بڑی ہوتی ہے۔




5- سامنے دی گئی تیکونی شکل میں $AB > AC$

\overline{BD} اور \overline{CD} بالترتیب زاویوں $\angle B$ اور $\angle C$

کے ناصف ہیں۔ ثابت کریں کہ $BD > DC$

مسئلہ 13.1.4

کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے کم ہوگا۔



معلوم ایک خط AB ، ایک نقطہ C (جو کہ \overleftrightarrow{AB} پر واقع

نہیں ہے) اور ایک نقطہ D جو کہ \overleftrightarrow{AB} پر اس طرح

واقع ہے کہ \overline{CD} ، خط \overleftrightarrow{AB} پر عمود ہے۔

مطلوب $m\overline{CD}$ نقطہ C سے \overleftrightarrow{AB} تک سب سے کم فاصلہ

ہے۔

عمل \overleftrightarrow{AB} پر ایک نقطہ E لیا۔ اور E کو ملانے سے ایک $\triangle CDE$ بن گئی۔

عمل


ثبوت

دلائل	بیانات
مثلث کا بیرونی زاویہ ہر غیر متصل اندرونی زاویہ سے بڑا ہوتا ہے۔	$m\angle CDB > m\angle CED$
قائمہ زاویہ کا سپلیمنٹ	$m\angle CDB = m\angle CDE$
نا برابر کی عکسی خاصیت	$\therefore m\angle CDE > m\angle CED$
بڑے زاویہ کے سامنے بڑا ضلع ہوتا ہے۔	یا $m\angle CED < m\angle CDE$
	$\therefore m\overline{CD} < m\overline{CE}$
	لیکن E خط AB کا کوئی نقطہ ہے
	پس $m\overline{CD}$ نقطہ C سے \overleftrightarrow{AB} تک سب سے کم فاصلہ ہے۔

(i) کسی خط اور ایک نقطہ (جو اس خط پر واقع نہ ہو) کے درمیان فاصلہ، نقطہ سے خط تک عمودی قطعہ خط کی لمبائی کے برابر ہوتا ہے۔

(ii) کسی خط اور ایک نقطہ (جو اس خط پر واقع ہو) کے درمیان فاصلہ صفر ہوتا ہے۔

مشق 13.2




1- شکل میں نقطہ P کا خط AB سے کون سا

فاصلہ سب سے کم ہوگا؟

- (a) $m\overline{PL}$ (b) $m\overline{PM}$
(c) $m\overline{PN}$ (d) $m\overline{PO}$

2- شکل میں P کوئی ایک نقطہ خط AB سے باہر واقع ہے۔

فاصلہ $m\overline{PL}$ خط AB سے دیگر تمام فاصلوں سے کم ہوگا
اگر




- (a) $m\angle PLA = 80^\circ$ (b) $m\angle PLB = 100^\circ$
(c) $m\angle PLA = 90^\circ$ (d) $m\angle PLA = 70^\circ$

3- شکل میں \overline{PL} خط AB پر عمود ہے اور

$m\overline{LN} > m\overline{LM}$ ہے۔ ثابت کریں کہ

$m\overline{PN} > m\overline{PM}$ ہوگا۔



اعادہ مشق 13

- 1- مندرجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔
- (i) کسی مثلث میں زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والا زاویہ بڑا ہوتا ہے۔
.....
- (ii) قائمہ الزاویہ مثلث میں بڑے زاویے کی مقدار 60° ہوتی ہے۔
.....
- (iii) قائمہ الزاویہ مساوی الساقین مثلث میں قائمہ زاویہ کے علاوہ ہر ایک دیگر زاویہ 45° ہوتا ہے۔
.....
- (iv) دو متماثل اضلاع والی مثلث کو مساوی الاضلاع مثلث کہتے ہیں۔
.....
- (v) ایک نقطہ سے کسی خط تک فاصلوں میں عمودی فاصلہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔
.....
- (vi) کسی خط پر عمود 90° کا زاویہ بناتا ہے۔
.....
- (vii) خط کا کوئی بیرونی نقطہ اس خط کا ہم خط نقطہ ہوتا ہے۔
.....
- (viii) کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔
.....
- (ix) ایک خط اور ایک ایسا نقطہ جو اس خط پر واقع ہو، کے درمیان فاصلہ صفر ہوتا ہے۔
.....
- (x) 2cm ، 3cm اور 5cm لمبائی والے قطعات خط سے مثلث بن سکتی ہے۔
.....
- 2- کسی خط کے بیرونی نقطہ سے کھینچے گئے قطعات خط میں سے فاصلے میں سب سے چھوٹا قطعہ خط، اس خط کے ساتھ کتنی مقدار کا زاویہ بنائے گا؟
- 3- اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 13cm ، 12cm اور 5cm ہوں تو تصدیق کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا فرق تیسرے ضلع کی لمبائی سے کم ہوتا ہے۔
- 4- اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 10cm ، 6cm اور 8cm ہوں تو تصدیق کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔
- 5- 3cm ، 4cm اور 7cm کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہیں۔ دلیل سے وضاحت کریں۔
- 6- اگر کسی قائمہ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3cm اور 4cm ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟ (اشارہ: وتر معلوم کریں)

خلاصہ

- اس یونٹ میں ہم نے مندرجہ ذیل مسئلے بیان اور ثابت کیے۔
- ☆ اگر کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار (چھوٹے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار سے) زیادہ ہوگی۔
 - ☆ اگر کسی مثلث کے دو زاویے مقدار میں برابر نہ ہوں تو مقدار میں بڑے زاویے کے سامنے والا ضلع چھوٹے زاویے کے سامنے والے ضلع سے زیادہ لمبا ہوگا۔
 - ☆ کسی بھی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔
 - ☆ کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ، نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے چھوٹا ہوگا۔

نسبت اور تناسب (RATIO AND PROPORTION)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

14.1 نسبت اور تناسب (Ratio and Proportion)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل نتائج (Students Learning Outcomes)

- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆ | اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ |
| ☆ | اگر کوئی خط مستقیم مثلث کے کسی ضلع کے متوازی کھینچا جائے تو وہ باقی دونوں ضلعوں کو ایک ہی نسبت میں قطع کرے گا۔ |
| ☆ | اگر ایک قطعہ خط کسی مثلث کے دو اضلاع کو ایک ہی نسبت میں قطع کرے تو وہ تیسرے ضلع کے متوازی ہوگا۔ |
| ☆ | مثلث کے کسی اندرونی زاویے کا ناصف مقابل کے ضلع کو اسی نسبت میں قطع کرتا ہے جو مثلث کے ان دونوں اضلاع کی مقداروں میں ہوتی ہے جو اس زاویہ کی دونوں شعاعوں پر واقع ہوتے ہیں۔ |
| ☆ | دو متشابه مثلثوں کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوتے ہیں۔ |

تعارف


اس یونٹ میں ہم کچھ ایسے مسئلے اور صریح نتائج ثابت کریں گے جن کا تعلق کسی مثلث کے اضلاع کے نسبت اور تناسب اور متشابه مثلثان سے ہوگا۔ اکثر پیشوں میں نسبت تناسب کا علم ایک اہم ضرورت ہے۔ مثلاً غذائی ضروریات کی تقسیم کا اندازہ اور خدمات کا ہنر، صحت بخش دوا کی آمیزش کا عمل، کسی قطعہ زمین کی جغرافیائی حدود کا تعین کرنے کے لیے نقشے تیار کرنا، تعمیراتی کاموں کے علاوہ لاگت پر منافع کا اندازہ لگانا وغیرہ۔

آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے دوہم اکائی مقداروں a اور b کے درمیان نسبت کی تعریف $a : b = \frac{a}{b}$ کے طور پر کی تھی۔ یعنی ایسا عددی تعلق جو بتاتا ہے کہ ایک مقدار دوسری مقدار کا کون سا حصہ یا کتنے گنا ہے۔ مقداریں a اور b نسبت $a : b$ کا پہلا اور دوسرا رکن (elements) کہلاتی ہیں۔ دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں۔
یعنی اگر $a : b = c : d$ تو مقداریں a, b, c اور d تناسب میں ہوں گی۔

متشابه مثلثان

متشابه اشکال بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ بالخصوص متشابه مثلثوں کے روزمرہ زندگی میں کئی عملی استعمال اور فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ فوٹو اگر افرایک ہی نیگیٹو (منفی عکس) کو اجاگر کر کے اس سے مختلف سائز کے فوٹو (مثبت عکس) تیار کر سکتا ہے۔ سائز کے فرق کے باوجود یہ تصاویر ایک دوسری سے ملتی جلتی لگتی ہیں۔ ایک فوٹو دوسری کی محض انلارج (بڑی) کی ہوئی تصویر ہوتی ہے۔ ایسی اشکال کو متشابه کہتے ہیں۔ جیومیٹرک اشکال بھی متشابه ہو سکتی ہیں۔
مثلاً اگر مطابقت میں $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} \text{ اور } \angle A \cong \angle D, \angle B \cong \angle E, \angle C \cong \angle F$$



تو $\triangle ABC$ اور $\triangle DEF$ متشابه مثلثیں کہلاتی ہیں۔ جسے علامتی طور پر $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ لکھا جاتا ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ متشابه مثلثوں کے متناظرہ زاویے متماثل ہوتے ہیں اور ان کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوتے ہیں۔

$\triangle PQR \cong \triangle LMN$ کا مطلب یہ ہے کہ مطابقت $\triangle PQR \leftrightarrow \triangle LMN$ میں



$$\angle P \cong \angle L, \angle Q \cong \angle M, \angle R \cong \angle N \text{ اور } \overline{PQ} \cong \overline{LM}, \overline{QR} \cong \overline{MN}, \overline{RP} \cong \overline{NL}$$

$$\frac{PQ}{LM} = \frac{QR}{MN} = \frac{RP}{NL} = 1$$

اب چونکہ

$$\Delta PQR \sim \Delta LMN$$


اس لیے



یعنی دو متماثل مثلثیں متشابه بھی ہوتی ہیں لیکن دو متشابه مثلثوں کا متماثل ہونا ضروری نہیں کیونکہ ان کے متناظرہ اضلاع کا متماثل ہونا لازم نہیں ہوتا۔

مسئلہ 14.1.1

اگر کوئی خط مستقیم مثلث کے کسی ضلع کے متوازی کھینچا جائے تو وہ باقی دونوں ضلعوں کو ایک ہی نسبت میں قطع کرے گا۔



معلوم ΔABC میں خط l اضلاع \overline{AC} اور \overline{AB} کو بالترتیب نقاط E اور D پر اس طرح قطع کرتا ہے کہ $\overline{ED} \parallel \overline{CB}$

$$m\overline{AD} : m\overline{DB} = m\overline{AE} : m\overline{EC} \quad \text{مطلوب}$$

عمل نقطہ B کو E سے اور نقطہ C کو D سے ملائیں۔

نقطہ D سے $\overline{DM} \perp \overline{AC}$ اور نقطہ E سے $\overline{EL} \perp \overline{AB}$ کھینچیں۔

دلائل	بیانات
<p>ارتفاع \times قاعدہ $\times \frac{1}{2} =$ مثلث کا رقبہ</p> <p>(i) کو (ii) پر تقسیم کرنے سے</p> <p>مثلث جن کے قاعدے اور ارتفاع متماثل ہوں ہم رقبہ ہوتی ہیں۔ $\overline{ED} \parallel \overline{CB}$ معلوم ہے۔ پس ارتفاع متماثل ہیں۔</p> <p>(iii) اور (iv) کی رو سے</p> <p>دونوں اطراف کا معکوس لینے سے</p>	<p>مثلثان BED اور AED میں \overline{EL} ایک مشترک عمود ہے۔</p> <p>$\therefore \Delta BED = \frac{1}{2} \times m\overline{DB} \times m\overline{EL}$ (i)</p> <p>$\Delta AED = \frac{1}{2} \times m\overline{AD} \times m\overline{EL}$ (ii)</p> <p>$\therefore \frac{\Delta BED}{\Delta AED} = \frac{m\overline{DB}}{m\overline{AD}}$ (iii)</p> <p>اسی طرح مثلثان CDE اور ADE میں</p> <p>$\frac{\Delta CDE}{\Delta ADE} = \frac{m\overline{EC}}{m\overline{AE}}$ (iv)</p> <p>لیکن $\Delta BED \equiv \Delta CDE$</p> <p>اس لیے $\frac{m\overline{DB}}{m\overline{AD}} = \frac{m\overline{EC}}{m\overline{AE}}$</p> <p>لہذا $\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EC}}$</p> <p>پس $m\overline{AD} : m\overline{DB} = m\overline{AE} : m\overline{EC}$</p>

مشاہدہ کریں

مذکورہ بالا مسئلہ سے ہم مزید اخذ کر سکتے ہیں کہ

$$\frac{m\overline{BD}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{CE}}{m\overline{AC}} \text{ اور } \frac{m\overline{AD}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{AC}}$$

صریح نتائج


$$\overline{DE} \parallel \overline{BC} \text{ ہو تو } \frac{m\overline{AD}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{AC}} \text{ اگر (a)}$$

$$\overline{DE} \parallel \overline{BC} \text{ ہو تو } \frac{m\overline{AB}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{EC}} \text{ اگر (b)}$$

- (i) دو نقاط ایک خط کا جبکہ تین غیر ہم خط نقاط ایک مستوی کا تعین کرتے ہیں۔
(ii) ایک قطعہ خط کا صرف اور صرف ایک ہی نقطہ نصف ہوتا ہے۔
(iii) اگر دو متقاطع خطوط کے متعلقہ زاویے متماثل ہوں تو وہ خطوط ایک دوسرے پر عمود ہوں گے۔

مسئلہ 14.1.2 (عکس مسئلہ 14.1.1)

اگر ایک قطعہ خط کسی مثلث کے دو اضلاع کو ایک ہی نسبت میں قطع کرے تو وہ تیسرے ضلع کے متوازی ہوگا۔



معلوم ΔABC میں اضلاع \overline{AB} اور \overline{AC} کو

اسی طرح قطع کرتا ہے کہ

$$m\overline{AD} : m\overline{DB} = m\overline{AE} : m\overline{EC}$$

مطلوب $\overline{ED} \parallel \overline{CB}$

عمل اگر $\overline{ED} \not\parallel \overline{CB}$ تو $\overline{BF} \parallel \overline{DE}$ کھینچیں جو کہ \overline{AC}

کو نقطہ C سے پرے بڑھانے پر نقطہ F پر ملتا ہے۔

ثبوت

بیانات	دلائل
مثلث ABF میں	
$\overline{DE} \parallel \overline{BF}$	عمل
$\therefore \frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EF}}$	ایک خط جو کہ مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو وہ باقی دو اضلاع کو ایک ہی نسبت میں قطع کرے گا۔
..... (i)	(مسئلہ 14.1.1)

لیکن

..... (ii)

$$\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EC}}$$

معلوم

(i) اور (ii) کی رو سے

$$\therefore \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EF}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EC}}$$

تحقیقی اعداد کی خصوصیت

$$\text{یا } m\overline{EF} = m\overline{EC}$$


اس طرح نقطہ F نقطہ C پر منطبق ہے۔

لہذا ہمارا مفروضہ غلط ہے

پس $\overline{ED} \parallel \overline{CB}$

مشق 14.1

1- مثلث ABC میں $DE \parallel BC$



(i) اگر $m\overline{BD} = 3 \text{ cm}$ ، $m\overline{AD} = 1.5 \text{ cm}$

تو $m\overline{AE} = 1.3 \text{ cm}$ ہو تو CE کی لمبائی معلوم کریں۔

(ii) اگر $m\overline{AE} = 3.2 \text{ cm}$ ، $m\overline{AD} = 2.4 \text{ cm}$

تو $m\overline{EC} = 4.8 \text{ cm}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

(iii) اگر $\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{3}{5}$ اور $m\overline{AC} = 4.8 \text{ cm}$ ہو تو

\overline{AE} کی لمبائی معلوم کریں۔

(iv) اگر $m\overline{BC} = 5 \text{ cm}$ ، $m\overline{DE} = 2 \text{ cm}$ ، $m\overline{AE} = 3.2 \text{ cm}$ ، $m\overline{AD} = 2.4 \text{ cm}$ ہو تو

\overline{AB} ، \overline{DB} ، \overline{AC} اور \overline{CE} کی لمبائی معلوم کریں۔

(v) اگر $m\overline{BD} = 3x - 1$ ، $m\overline{AE} = 8x - 7$ ، $m\overline{AD} = 4x - 3$

اور $m\overline{CE} = 5x - 3$ ہو تو x کی قیمت معلوم کریں۔


2- ایک مساوی الساقین مثلث ABC میں $\angle A$ راسی زاویہ ہے۔


اگر \overline{DE} مثلث کے اضلاع \overline{AB} اور \overline{AC}

کو دی گئی شکل کے مطابق اس طرح قطع کرے کہ

$$m\overline{AD} : m\overline{DB} = m\overline{AE} : m\overline{EC}$$

تو ثابت کریں کہ $\triangle ADE$ بھی ایک مساوی الساقین مثلث ہوگی۔





3- ایک متماثل اضلاع مثلث ABC کے اضلاع میں نسبت

$$m\overline{AE} : m\overline{AC} = m\overline{AD} : m\overline{AB}$$

کے تمام زاویوں کی مقداریں معلوم کریں اور ان کے نام بھی لکھیں۔

4- ثابت کریں کہ ایسا قطعہ خط جو کسی مثلث کے ایک ضلع کے


وسطی نقطہ سے دوسرے ضلع کے متوازی کھینچا گیا ہو وہ تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔

5- ثابت کریں کہ کسی مثلث کے دو اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے۔

مسئلہ 14.1.3

مثلث کے کسی اندرونی زاویے کا ناصف مقابل کے ضلع کو اسی نسبت میں قطع کرتا ہے جو مثلث کے ان دونوں

اضلاع کی مقداروں میں ہوتی ہے جو اس زاویہ کی دونوں شعاعوں پر واقع ہوتے ہیں۔



معلوم مثلث ABC کے اندرونی زاویہ A کا ناصف ضلع CB کو نقطہ D پر قطع کرتا ہے۔

$$m\overline{BD} : m\overline{DC} = m\overline{AB} : m\overline{AC}$$

مطلوب عمل $\overline{BE} \parallel \overline{DA}$ کھینچیں جو کہ ضلع CA کو بڑھانے پر نقطہ E پر قطع کرتا ہے۔

ثبوت

بیانات	دلائل
چونکہ $\overline{AD} \parallel \overline{EB}$ اور \overline{EC} ان کو قطع کرتا ہے	عمل
$m\angle 1 = m\angle 2$ (i)	\therefore متناظرہ زاویے
مزید $\overline{AD} \parallel \overline{EB}$ اور \overline{AB} ان کو قطع کرتا ہے۔	
$m\angle 3 = m\angle 4$ (ii)	\therefore متبادلہ زاویے

معلوم
(i) اور (ii) کی رو سے
مثلث کے متماثل زاویوں کے سامنے والے اضلاع
متماثل ہوتے ہیں۔

عمل

$$m\overline{EA} = m\overline{AB} \text{ (ثابت شدہ)}$$

$$m\angle 1 = m\angle 3$$

$$\therefore m\angle 2 = m\angle 4$$

$$\therefore \overline{AB} \cong \overline{AE}$$

$$\text{یا } \overline{AE} \cong \overline{AB}$$

اب $\triangle CBE$ میں $\overline{AD} \parallel \overline{EB}$


$$\therefore \frac{m\overline{BD}}{m\overline{DC}} = \frac{m\overline{EA}}{m\overline{AC}}$$

$$\text{یا } \frac{m\overline{BD}}{m\overline{DC}} = \frac{m\overline{AB}}{m\overline{AC}}$$

$$\text{پس } m\overline{BD} : m\overline{DC} = m\overline{AB} : m\overline{AC}$$

مسئلہ 14.1.4

دو متشابه مثلثوں کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوتے ہیں۔



$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

معلوم

$$\angle A \cong \angle D, \angle B \cong \angle E \text{ and } \angle C \cong \angle F \text{ یعنی}$$

$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{DE}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{DF}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{EF}}$$

مطلوب

$$m\overline{AB} > m\overline{DE} \text{ (I) فرض کیا}$$

عمل

$$m\overline{AB} \leq m\overline{DE} \text{ (II)}$$

\overline{AB} پر نقطہ L اس طرح لیں کہ $m\overline{AL} = m\overline{DE}$

\overline{AC} پر نقطہ M اس طرح لیں کہ $m\overline{AM} = m\overline{DF}$ ، قطعہ خط LM کے


ذریعہ نقطہ L کو نقطہ M سے ملائیں۔




دلائل	بیانات
	$\Delta ALM \leftrightarrow \Delta DEF$ (I) میں $\angle A \cong \angle D$ $\overline{AL} \cong \overline{DE}$ $\overline{AM} \cong \overline{DF}$
معلوم عمل عمل	
S.A.S موضوعہ	$\Delta ALM \cong \Delta DEF$ پس
متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے	$\angle L \cong \angle E$ ، $\angle M \cong \angle F$ اور
معلوم	$\angle E \cong \angle B$ اور $\angle F \cong \angle C$ اب
متماثل کی ثلاثی خاصیت	$\therefore \angle L \cong \angle B$ ، $\angle M \cong \angle C$
متماثل مثلثوں کے متماثل زاویے	$\overline{LM} \parallel \overline{BC}$ پس
ΔABC میں $\overline{LM} \parallel \overline{BC}$ (ثابت شدہ)	$\therefore \frac{m\overline{AL}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{AM}}{m\overline{AC}}$
$m\overline{AL} = m\overline{DE}$ اور $m\overline{AM} = m\overline{DF}$ (عمل)	یا $\frac{m\overline{DE}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{DF}}{m\overline{AC}}$ (i)
	اسی طرح اگر اضلاع \overline{BA} اور \overline{BC} پر متماثل قطعہ قطع کریں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ
	$\frac{m\overline{DE}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{EF}}{m\overline{BC}}$ (ii)
(i) اور (ii) کی رو سے	$\frac{m\overline{DE}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{DF}}{m\overline{AC}} = \frac{m\overline{EF}}{m\overline{BC}}$ پس
معکوس لینے سے	یا $\frac{m\overline{AB}}{m\overline{DE}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{DF}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{EF}}$
	(II) اگر $m\overline{AB} < m\overline{DE}$ ہو تو اسی طرح ثابت کر سکتے ہیں اگر مثلث DEF پر متماثل قطعہ لے لیں۔
	اگر $m\overline{AB} = m\overline{DE}$
	تو $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta DEF$

معلوم	$\angle A \cong \angle D$	
معلوم	$\angle B \cong \angle E$	
مفروض	$\overline{AB} \cong \overline{DE}$	اور
A.S.A. \cong A.S.A	$\triangle ABC \cong \triangle DEF$	لہذا
(مثلثوں کا متماثل) $m\overline{AC} \cong m\overline{DF}, m\overline{BC} \cong m\overline{EF}$	$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{DE}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{DF}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{EF}} = 1$	پس
	لہذا تمام صورتوں میں نتیجہ درست ہے۔	

مشق 14.2



- 1- سامنے کی شکل میں $\triangle ABC$ میں $\angle C$ کا نصف \overline{CD} ضلع \overline{AB} کو نقطہ D پر قطع کرے تو $m\overline{BD}$ کی قیمت برابر ہوگی:
- (a) 5 (b) 16 (c) 10 (d) 18



- 2- دی گئی شکل کے مطابق مثلث ABC میں \overline{CD} زاویہ C کا نصف ہے۔
- اگر $m\overline{AC} = 3$ ، $m\overline{CB} = 6$ اور $m\overline{AB} = 7$ ہو تو $m\overline{AD}$ اور $m\overline{DB}$ معلوم کریں۔

- 3- اگر کسی دی گئی دو مثلثوں کی مطابقت میں ایک مثلث کے دو زاویے دوسری مثلث کے متناظرہ زاویوں کے متماثل ہوں تو ثابت کریں کہ مثلثیں متشابه ہوں گی۔

- 4- قطعات خط AB اور CD ایک دوسرے کو نقطہ X پر قطع کرتے ہیں۔ اگر $\frac{m\overline{AX}}{m\overline{XB}} = \frac{m\overline{CX}}{m\overline{XD}}$ ہو تو ثابت کریں کہ $\triangle AXC$ اور $\triangle BXD$ متشابه ہوں گی۔

اعادہ مشق 14

- 1- درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔

(i) متماثل مثلثان ساز اور شکل میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔

(ii) متشابه مثلثان کی شکل ایک جیسی لیکن ان کے ساز مختلف ہوتے ہیں۔


(iii) متماثل کے لیے علامت \cong استعمال ہوتی ہے۔

(iv) متشابه کے لیے علامت \sim استعمال ہوتی ہے۔

- (v) متماثل مثلثیں متشابه ہوتی ہیں۔
 (vi) متشابه مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔
 (vii) کسی قطعہ خط کا صرف ایک ہی نقطہ تہیصیف ہوتا ہے۔
 (viii) دو نقاط میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جاسکتا ہے۔
 (ix) دو نسبتوں کے غیر برابر ہونے کو تناسب کہتے ہیں۔
 (x) نسبت کی کوئی اکائی نہیں ہوتی۔

2- مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں۔

- (i) نسبت (ii) تناسب (iii) متماثل مثلثان (iv) متشابه مثلثان




3- سامنے دی گئی شکل کی مثلث LMN میں $\overline{MN} \parallel \overline{PQ}$ ہے۔

(i) اگر $m\overline{LP} = 2.5 \text{ cm}$ ، $m\overline{LM} = 5 \text{ cm}$ اور

$m\overline{LQ} = 2.3 \text{ cm}$ ہو تو $m\overline{LN}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

(ii) اگر $m\overline{LQ} = 2.5 \text{ cm}$ ، $m\overline{LM} = 6 \text{ cm}$ اور


$m\overline{QN} = 5 \text{ cm}$ ہو تو $m\overline{LP}$ کی لمبائی معلوم کریں۔



4- سامنے کی شکل میں اگر $m\overline{PA} = 8x - 7$ ، $m\overline{PB} = 4x - 3$

اور $m\overline{AQ} = 5x - 3$ اور $m\overline{BR} = 3x - 1$ ہو تو x کی قیمت

معلوم کریں جبکہ $\overline{AB} \parallel \overline{QR}$




5- سامنے کی شکل میں دکھائی گئی ΔLMN میں

\overline{LA} زاویہ L کی ناصف شعاع ہے۔ اگر $m\overline{LN} = 4$

اور $m\overline{LM} = 6$ اور $m\overline{MN} = 8$ ہو تو $m\overline{MA}$

اور $m\overline{AN}$ معلوم کریں۔





6- سامنے کی شکل میں ΔPQR ایک

تساوی الساقین مثلث ہے۔

x اور y کی قیمت معلوم کریں۔

خلاصہ

- اس یونٹ میں ہم نے مندرجہ ذیل مسئلے بیان اور ثابت کیے۔ علاوہ ازیں چند ضروری اصطلاحات کی تعریف کی۔
- ☆ اگر کوئی خط مستقیم مثلث کے کسی ضلع کے متوازی کھینچا جائے تو وہ باقی دونوں ضلعوں کو ایک ہی نسبت میں قطع کرے گا۔
 - ☆ اگر ایک قطعہ خط کسی مثلث کے دو اضلاع کو ایک ہی نسبت میں قطع کرے تو وہ تیسرے ضلع کے متوازی ہوگا۔
 - ☆ مثلث کے کسی اندرونی زاویے کا ناصف مقابل کے ضلع کو اسی نسبت میں قطع کرتا ہے جو مثلث کے ان دونوں اضلاع کی مقداروں میں ہوتی ہے جو اس زاویہ کی دونوں شعاعوں پر واقع ہوتے ہیں۔
 - ☆ اگر دو مثلثان متشابه ہوں تو ان کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوتے ہیں۔
 - ☆ دو ہم اکائی مقداروں a اور b کے درمیان نسبت کی تعریف $a : b = \frac{a}{b}$ کے طور پر کی جبکہ مقداریں a اور b نسبت $a : b$ کا پہلا اور دوسرا رکن (elements) کہلاتی ہیں۔
 - ☆ دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں۔ یعنی اگر $a : b = c : d$ تو مقداریں $a \cdot d$ اور $c \cdot b$ تناسب میں ہوں گی۔
 - ☆ دو مثلثان متشابه کہلاتی ہیں اگر ان کے متناظرہ زاویے متماثل اور ان کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوں۔



مسئلہ فیثاغورث

(PYTHAGORAS' THEOREM)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

15.1 مسئلہ فیثاغورث (Pythagoras' Theorem)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے ہم وسیع تر حاصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اُس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہوں گے کہ:

☆ ثابت کر سکیں کہ قائمہ الزاویہ مثلث کے وتر کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ (مسئلہ فیثاغورث)

☆ ثابت کر سکیں کہ اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کی لمبائی کا مربع دوسرے دو اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہو تو وہ مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہوگی۔ (عکس مسئلہ فیثاغورث)




تعارف

فیثاغورث ایک یونانی فلسفی اور ریاضی دان تھا۔ اس نے قائمہ الزاویہ مثلث کے اضلاع کے درمیان ایک آسان لیکن اہم تعلق دریافت کیا۔ اُس نے اضلاع کے اس تعلق کو ایک فارمولے کی شکل میں وضع کیا جسے اس کے نام کی وجہ سے مسئلہ فیثاغورث کہا جاتا ہے۔ اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے متعدد طریقے ہیں۔ ہم اسے متشابہ مثلثوں کے استعمال سے ثابت کریں گے۔ ہم اس کا عکس مسئلہ بھی بیان اور ثابت کریں گے اور پھر انہیں مختلف مسائل اور سوالات حل کرنے میں لاگو کریں گے۔

15.1.1 مسئلہ فیثاغورث

ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے وتر کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے

برابر ہوتا ہے۔



معلوم

اور $m\overline{AC} = b$ ، $m\overline{BC} = a$ اور $m\angle C = 90^\circ$ میں ایک قائمہ الزاویہ مثلث ہے جس میں

$$m\overline{AB} = c$$


$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{مطلوب}$$

عمل نقطہ C سے ضلع \overline{AB} پر عمود گرائیں۔ فرض کریں $m\overline{CD} = h$ ، $m\overline{AD} = x$ اور $m\overline{BD} = y$

قطعہ خط CD مثلث ABC کو دو مثلثان ADC اور BDC میں تقسیم کرتا ہے۔ جیسا کہ اشکال (ii) a اور (ii) b میں بالترتیب دکھایا گیا ہے۔

ثبوت (متشابه مثلثوں کے استعمال سے)

دلائل	بیانات
بحوالہ اشکال (i) اور (ii) a مشترک یا ذاتی متماثل عمل۔ معلوم، ہر ایک قائمہ زاویہ ہے $\angle C$ اور $\angle B$ زاویہ $\angle A$ کے کھلیمنٹ تینوں زاویے متماثل ہیں	$\Delta ADC \leftrightarrow \Delta ACB$ میں $\angle A \cong \angle A$ $\angle ADC \cong \angle ACB$ $\angle C \cong \angle B$ $\therefore \Delta ADC \sim \Delta ACB$ $\therefore \frac{x}{b} = \frac{b}{c}$
دو متشابه مثلثان کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوتے ہیں	یا $x = \frac{b^2}{c}$ I
بحوالہ اشکال (i) اور (ii) b مشترک یا ذاتی متماثل عمل۔ معلوم، ہر زاویہ قائمہ ہے $\angle C$ اور $\angle A$ زاویہ B کے کھلیمنٹ تینوں زاویے متماثل ہیں	اب $\Delta BDC \leftrightarrow \Delta BCA$ میں $\angle B \cong \angle B$ $\angle BDC \cong \angle BCA$ $\angle C \cong \angle A$ $\therefore \Delta BDC \sim \Delta BCA$ $\therefore \frac{y}{a} = \frac{a}{c}$
مفروض	یا $y = \frac{a^2}{c}$ II
(I) اور (II) کی رو سے	لیکن $y + x = c$
طرفین کو c سے ضرب دینے سے	$\therefore \frac{a^2}{c} + \frac{b^2}{c} = c$
	یا $a^2 + b^2 = c^2$ $c^2 = a^2 + b^2$ پس



صریح نتائج: قائمہ الزاویہ مثلث ABC میں جس کا زاویہ A قائمہ ہے

$$(AB)^2 = (BC)^2 - (CA)^2 \quad (i)$$


$$(AC)^2 = (BC)^2 - (AB)^2 \quad (ii)$$

اضافی نقطہ: ویسے تو مسئلہ فیثاغورث کے متعدد ثبوت ہیں لیکن ہم نے جس طریقہ سے مسئلہ کو ثابت کیا ہے وہ متشابہ مثلثان کے اضلاع کے متناسب ہونے پر مبنی ہے۔ ہم نے آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے مثلثان ADC اور CDB کو علیحدہ دکھایا ہے ورنہ عام طور پر صرف شکل (i) سے ہی مسئلہ فیثاغورث ثابت کیا جاتا ہے۔

مسئلہ 15.1.2 (عکس مسئلہ فیثاغورث 15.1.1)

اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہو

تو وہ مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہوتی ہے۔



معلوم مثلث ABC میں: $m\overline{AC} = b$ اور $m\overline{BC} = a$ ، $m\overline{AB} = c$ اس طرح کہ $a^2 + b^2 = c^2$ مطلوب $m\angle ACB = 90^\circ$ یعنی $\triangle ACB$ ایک قائمہ الزاویہ مثلث ہے۔ عمل \overline{BC} پر \overline{CD} عمود اس طرح گرائیں کہ $\overline{CD} \cong \overline{CA}$ نقطہ B کو نقطہ D سے ملائیں۔

بیانات	دلائل
مثلث DCB ایک قائمہ الزاویہ مثلث ہے۔	عمل
$(m\overline{BD})^2 = a^2 + b^2$	مسئلہ فیثاغورث
$a^2 + b^2 = c^2$	معلوم
$(m\overline{BD})^2 = c^2$	
یا $m\overline{BD} = c$	جزر لینے سے

اب مطابقت $\triangle DCB \leftrightarrow \triangle ACB$ میں

$$\overline{CD} \cong \overline{CA}$$

$$\overline{BC} \cong \overline{BC}$$

$$\overline{BD} \cong \overline{AB}$$

$$\therefore \triangle DCB \cong \triangle ACB$$

$$\therefore \angle DCB \cong \angle ACB$$

$$m\angle DCB = 90^\circ$$

$$\therefore m\angle ACB = 90^\circ$$

لیکن

پس $\triangle ACB$ ایک قائمہ الزاویہ مثلث ہے۔

عمل

مشترک

دونوں c کے برابر ہیں

ض-ض-ض \equiv ض-ض-ض

متماثل مثلثان کے زاویے متماثل ہوتے ہیں

عمل

صریح نتائج: فرض کریں کہ ایک مثلث کے اضلاع a ، b اور c میں سے ضلع c باقی دونوں اضلاع سے لمبائی میں زیادہ ہے۔

☆ اگر $a^2 + b^2 = c^2$ تو مثلث قائمہ الزاویہ ہوگی۔

☆ اگر $a^2 + b^2 > c^2$ تو مثلث حاد الزاویہ ہوگی۔

☆ اگر $a^2 + b^2 < c^2$ تو مثلث منفرجہ الزاویہ ہوگی۔

مشق 15.1

1- مثلثان کے اضلاع کی لمبائیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ تصدیق کریں کہ یہ مثلثان قائمہ الزاویہ ہیں۔

(i) $a = 5 \text{ cm}$ ، $b = 12 \text{ cm}$ ، $c = 13 \text{ cm}$

(ii) $a = 1.5 \text{ cm}$ ، $b = 2 \text{ cm}$ ، $c = 2.5 \text{ cm}$

(iii) $a = 9 \text{ cm}$ ، $b = 12 \text{ cm}$ ، $c = 15 \text{ cm}$

(iv) $a = 16 \text{ cm}$ ، $b = 30 \text{ cm}$ ، $c = 34 \text{ cm}$

2- تصدیق کریں کہ $a^2 + b^2$ ، $a^2 - b^2$ اور $2ab$ ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہوں گی جبکہ a اور b کوئی سے دو حقیقی اعداد ہوں۔


3- ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں بالترتیب 8 ، x اور 17 ہیں۔ x کی کس قیمت کے لیے یہ ضلع قائمہ الزاویہ مثلث کا قاعدہ بن جائے گا؟

4- ایک مساوی الساقین مثلث میں قاعدہ $m\overline{BC} = 28 \text{ cm}$ اور $m\overline{AB} = m\overline{AC} = 50 \text{ cm}$ ہیں۔ اگر

$\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ہو تو (i) \overline{AD} کی لمبائی (ii) $\triangle ABC$ کا رقبہ معلوم کریں۔

5- ایک چوکور ABCD کے وتر \overline{AC} اور \overline{BD} ایک دوسرے پر عمود ہیں۔ ثابت کریں کہ

$$(AB)^2 + (CD)^2 = (AD)^2 + (BC)^2$$




6- (i) سامنے دی گئی شکل میں ایک قائمہ الزاویہ

مثلث ہے جس میں $m\angle ACB = 90^\circ$

اور \overline{CD} عمود ہے \overline{AB} پر۔ اگر $m\overline{BD} = 5$

اور $m\overline{AD} = 7$ ہو تو a, h اور b کی لمبائیاں معلوم کریں۔

(ii) سامنے دی گئی شکل سے x کی لمبائی معلوم کریں۔




7- سامنے دی گئی شکل کے مطابق ایک ہوائی جہاز 300m کی

بلندی پر ہے اس کا ایئر پورٹ سے افقی فاصلہ 500m ہے۔


اس کو ایئر پورٹ پر اترنے کے لیے (تیر کے نشان سے

دکھایا گیا ہے) کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا؟



8- 17 m لمبائی والی سیڑھی ایک عمودی دیوار کے سہارے کھڑی ہے اس کا نچلا پایہ دیوار کی بنیاد سے 8 m کے فاصلے

پر ہے۔ سیڑھی دیوار کی بنیاد سے کتنی اونچائی پر دیوار کے سہارے کھڑی ہوگی؟



9- ایک طالب علم اپنے گھر سے سکول تک کا فاصلہ شکل میں

دکھائے گئے روٹ کے مطابق طے کرتا ہے۔ اس کے گھر





سے سکول تک کا براہ راست فاصلہ $m\overline{AD}$ معلوم کریں۔

اعادہ مشق 15

1- نشان دہی کریں کہ مندرجہ ذیل بیانات میں سے کون سے صحیح اور کون سے غلط ہیں؟

- (i) قائمہ الزاویہ مثلث کے تینوں زاویوں میں سے بڑا زاویہ 90° ہوتا ہے۔
 (ii) قائمہ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویہ 60° کے برابر ہوتا ہے۔
 (iii) قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر قائمہ زاویے کے سامنے والا ضلع ہوتا ہے۔
 (iv) قائمہ الزاویہ مثلث کے اضلاع b اور a میں سے اگر ضلع c باقی دونوں اضلاع کی نسبت زیادہ لمبا ہو تو $c^2 = a^2 + b^2$ ہوگا۔
 (v) اگر قائمہ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3 cm اور 4 cm ہوں تو وتر کی لمبائی 5 cm ہوگی۔
 (vi) اگر قائمہ الزاویہ مساوی الساقین مثلث کا وتر $\sqrt{2}$ cm ہو تو باقی دونوں اضلاع میں سے ہر ایک کی لمبائی 2 cm ہوگی۔

2- مندرجہ ذیل اشکال میں نامعلوم x کی قیمت معلوم کریں۔



خلاصہ

- ☆ اس یونٹ میں ہم نے مسئلہ فیثاغورث اور اس کا عکس بمعہ صریح نتائج بیان کرنا اور ثابت کرنا سیکھے۔
 ☆ ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے وتر کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ (مسئلہ فیثاغورث)
 ☆ اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہو تو وہ مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہوتی ہے۔ (عکس مسئلہ فیثاغورث)
 علاوہ ازیں ان مسئلوں کو عملی افادیت کے کچھ سوالات حل کرنے میں استعمال کیا گیا۔

رقبہ سے متعلق مسئلے

(THEOREMS RELATED WITH AREA)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

16.1 رقبہ سے متعلق مسئلے (Theorems Related with Area)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ ثابت کر سکیں کہ ایک ہی قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

☆ ثابت کر سکیں کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

☆ ثابت کر سکیں کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

☆ ثابت کر سکیں کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

تعارف

اس یونٹ میں ہم کچھ اہم مسئلے اور ان کے نتائج صریح بیان اور ثابت کریں گے جن کا تعلق متوازی الاضلاع اشکال اور مثلثوں کے رقبہ سے ہے۔ پھر ان کو کچھ مناسب سوالات حل کرنے اور مفید نتائج حاصل کرنے میں استعمال کریں گے۔

کچھ بنیادی تصورات
کسی شکل کا رقبہ

کسی بند شکل کی حد بندی کرنے والے قطعات خط جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں وہ شکل کا رقبہ کہلاتا ہے۔ بند علاقے کے رقبہ کو مربع اکائیوں (جیسے m^2 یا مربع میٹر) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک مثبت حقیقی عدد ہوتا ہے۔

مشائی علاقہ

مستوی کے ایسے تمام نقاط کا سیٹ جو کسی مثلث کے اندر ہوں مثلث کا اندرون کہلاتا ہے۔

کسی مثلث اور اس کے اندرون کے یونین (union)

کو مشائی علاقہ کہتے ہیں۔ (یعنی مثلث بنانے

والے تینوں قطعات خط اور مثلث کے اندرون کا یونین)۔ اس کا

مطلب یہ ہوا کہ مشائی علاقہ ہی مثلث کا رقبہ کہلائے گا۔

متماثل رقبوں کا اصول متعارفہ (Congruent Area Axiom)

$$\Delta ABC \equiv \Delta PQR \quad \text{اگر}$$

تو مشائی علاقہ PQR کا رقبہ = مشائی علاقہ ABC کا رقبہ

مستطیلی علاقہ


مستوی کے ایسے تمام نقاط کا سیٹ جو کسی مستطیل کے اندر

واقع ہوں مستطیل کا اندرون کہلاتا ہے۔

کسی مستطیل اور اس کے اندرون کے یونین کو مستطیلی

علاقہ کہتے ہیں۔ مستطیلی علاقہ کو کئی طریقوں سے دو یا دو سے زیادہ

مشائی علاقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔



آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر کسی مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی بالترتیب a اکائیاں اور b اکائیاں ہوں تو

مستطیل کا رقبہ $a \times b$ مربع اکائیاں ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر کسی مربع کے ایک ضلع کی لمبائی ' a ' ہو تو اس کا رقبہ ' a^2 '

مربع اکائیوں کے برابر ہوتا ہے۔

اشکال کا دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہونا


دو متوازی الاضلاع اشکال ABCD اور EFGH اس


وقت متوازی خطوط کے درمیان واقع سمجھی جاتی ہیں جب ان کے

قاعدے \overline{BC} اور \overline{FG} ایک ہی خط BCFG کے ساتھ ہم خط ہوں


اور ان قاعدوں کے متقابلہ اضلاع \overline{AD} اور \overline{EH} بھی متوازی خط

ADEH کے ہم خط ہوں۔





سامنے دی گئی شکل میں دکھائی گئی دو مثلثیں ABC اور DEF دو متوازی خطوط کے درمیان واقع سمجھی جائیں گی جب ان کے قاعدے ہم خط ہوں اور ان کے راسوں کو ملانے والا خط قاعدوں کے متوازی ہو۔




سامنے دی گئی شکل میں دکھائی گئی $\triangle ABC$ متوازی الاضلاع DEF دو متوازی خطوط کے درمیان واقع سمجھی جائیں گی جب ان کے قاعدے ہم خط ہوں اور متوازی الاضلاع کے قاعدے کا بالمقابل ضلع، ضرورت پڑنے پر بڑھانے سے، مثلث کے راس میں سے گزرے۔

تعریف

اگر کسی متوازی الاضلاع کے ایک ضلع کو قاعدہ مان لیا جائے تو قاعدہ اور اس کے متوازی ضلع کے درمیان عمودی فاصلہ کو متوازی الاضلاع کا ارتفاع کہتے ہیں۔

تعریف

اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کو قاعدہ مان لیا جائے تو مخالف راس سے اس قاعدہ تک عمودی فاصلہ مثلث کا ارتفاع کہلاتا ہے۔



”برابر ارتفاع والی مثلثوں اور متوازی الاضلاع اشکال کو دو متوازی خطوط کے درمیان رکھا جاسکتا ہے۔ اور اس کا عکس نتیجہ بھی درست ہے۔“

مثلث ABC اور DEF کو اس طرح لیں کہ ان کے قاعدے \overline{BC} اور \overline{EF} ہم خط ہوں اور ان کے راس A اور D اس خط کے ایک ہی طرف واقع ہوں۔ فرض کریں کہ ان کے ارتفاع \overline{AL} اور \overline{DM} لمبائی میں برابر ہیں۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ کے متوازی ہے۔

ثبوت چونکہ $\overline{AL} \perp \overline{BF}$ اور $\overline{DM} \perp \overline{BF}$

اس لیے $\overline{AL} \parallel \overline{DM}$ (دونوں ایک ہی قطعہ خط BF پر عمود ہیں)۔

علاوہ ازیں $m\overline{AL} = m\overline{DM}$ (معلوم)

لہذا $\overline{AD} \parallel \overline{LM}$ یعنی $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ کے متوازی ہے


اسی طرح متوازی الاضلاع اشکال کے لیے بھی یہ نتیجہ ثابت کر سکتے ہیں۔

کسی متوازی الاضلاع کا وتر اسے دو متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے (ض-ض-ض) لہذا وہ دونوں مثلثیں رقبہ میں برابر ہوں گی۔

مسئلہ 16.1.1

ایک ہی قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ \overline{AB} اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

معلوم دو متوازی الاضلاع اشکال $ABCD$ اور $ABEF$ کا مشترک قاعدہ \overline{AB} ہے اور وہ دو متوازی قطعات خط \overline{AB} اور \overline{DE} کے درمیان واقع ہیں۔



مطلوب متوازی الاضلاع $ABEF$ کا رقبہ = متوازی الاضلاع $ABCD$ کا رقبہ

بیانات	دلائل
متوازی الاضلاع $ABCD$ کا رقبہ = مثلث CBE کا رقبہ + چوکور $ABED$ کا رقبہ (1)	رقبہ کا جمعی اصول متعارفہ
متوازی الاضلاع $ABEF$ کا رقبہ = مثلث DAF کا رقبہ + چوکور $ABED$ کا رقبہ (2)	رقبوں کا جمعی اصول متعارفہ
$\Delta CBE \leftrightarrow \Delta DAF$ میں $m\overline{CB} = m\overline{DA}$ $m\overline{BE} = m\overline{AF}$ $\angle CBE = \angle DAF$ $\therefore \Delta CBE \cong \Delta DAF$ $\therefore \Delta CBE = \Delta DAF$ (3)	متوازی الاضلاع کے بالمقابل اضلاع متوازی الاضلاع کے بالمقابل اضلاع $\overline{BE} \parallel \overline{AF}$, $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ض-ز-ض موضوعہ متماثل رقبوں کا اصول متعارفہ
لہذا متوازی الاضلاع $ABEF$ کا رقبہ = متوازی الاضلاع $ABCD$ کا رقبہ	(1)، (2) اور (3) کی رو سے

بیانات	دلائل
دی گئی متوازی الاضلاع اشکال دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں۔ لہذا ADEH ایک خط مستقیم ہے اور \overline{BC} کے متوازی ہے۔	ان کے ارتفاع برابر ہیں (معلوم)
$\therefore m\overline{BC} = m\overline{FG}$ $= m\overline{EH}$	معلوم
اب \overline{BC} اور \overline{EH} برابر اور متوازی ہیں۔ اس لیے \overline{BE} اور \overline{CH} دونوں برابر اور متوازی ہیں۔ لہذا EBCH ایک متوازی الاضلاع ہے۔	EFGH ایک متوازی الاضلاع ہے۔
اب	کسی چوکور کے دو ضلع متوازی اور برابر ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔
(i) ... متوازی الاضلاع EBCH = متوازی الاضلاع ABCD	ایک ہی قاعدہ \overline{BC} پر دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں۔
(ii) ... متوازی الاضلاع EFGH = متوازی الاضلاع EBCH	ایک ہی قاعدہ \overline{EH} پر دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں۔
لہذا	
متوازی الاضلاع EFGH کا رقبہ = متوازی الاضلاع ABCD کا رقبہ	(i) اور (ii) کی رو سے

مشق 16.1


- 1- ثابت کریں کہ کسی متوازی الاضلاع کے آمنے سامنے کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط اسے دو متماثل متوازی الاضلاع اشکال میں تقسیم کرتا ہے۔
- 2- ایک متوازی الاضلاع ABCD میں $m\overline{AB} = 10$ cm ہے۔ اضلاع \overline{AB} اور \overline{AD} کی مطابقت میں ارتفاع کی لمبائیاں بالترتیب 7 cm اور 8 cm ہیں۔ \overline{AD} کی مقدار معلوم کریں۔
- 3- اگر برابر رقبے والی دو متوازی الاضلاع اشکال کے قاعدے برابر ہوں تو ثابت کریں کہ ان کے ارتفاع برابر ہوں گے۔

ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

معلوم مثلثان ABC اور DBC ایک ہی قاعدہ

BC پر واقع ہیں اور ان کے ارتفاع برابر

ہیں۔



مطلوب $\Delta ABC = \Delta DBC$ کا رقبہ

عمل $\overline{BM} \parallel \overline{CA}$ اور $\overline{CN} \parallel \overline{BD}$ کھینچیں جو


\overline{AD} (دونوں طرف بڑھانے سے) کو نقاط

اور N پر ملتے ہیں۔

ثبوت

بیانات	دلائل
ΔABC اور ΔDBC دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں	ان کے ارتفاع برابر ہیں۔
لہذا $\overline{MADN} \parallel \overline{BC}$	
متوازی الاضلاع BCND کا رقبہ = متوازی الاضلاع BCAM کا رقبہ \therefore	یہ متوازی الاضلاع اشکال ایک ہی قاعدہ BC پر اور دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں۔
(i)	
لیکن	
(متوازی الاضلاع BCAM کا رقبہ) $\Delta ABC = \frac{1}{2}$ کا رقبہ	متوازی الاضلاع کا ہر وتر اسے دو متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔
(ii)	
اور	
(متوازی الاضلاع BCND کا رقبہ) $\Delta DBC = \frac{1}{2}$ کا رقبہ	
(iii)	
لہذا $\Delta ABC = \Delta DBC$ کا رقبہ	(i), (ii), اور (iii) کی رو سے

ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی
 معلوم ΔABC اور ΔDEF برابر قاعدوں \overline{BC} اور \overline{EF} پر واقع ہیں اور ان کے ارتفاع بھی برابر ہیں۔



مطلوب $\Delta ABC = \Delta DEF$ کا رقبہ
 عمل ΔABC اور ΔDEF کو اس طرح رکھیں کہ ان کے قاعدے \overline{BC} اور \overline{EF} خط BCEF کے

کے ہم خط ہوں اور ان کے راس اس خط کے ایک ہی طرف واقع ہوں۔ $\overline{BX} \parallel \overline{CA}$ اور $\overline{FY} \parallel \overline{ED}$
 کھینچیں جو AD کو دونوں طرف بڑھانے سے بالترتیب نقاط X اور Y پر ملیں۔

ثبوت


دلائل	بیانات
ان کے ارتفاع برابر ہیں (معلوم)	ΔABC اور ΔDEF دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں
یہ متوازی الاضلاع اشکال برابر قاعدوں پر اور دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں۔	$\therefore XADY \parallel BCEF$ متوازی الاضلاع EFYD کا رقبہ = متوازی الاضلاع BCAX کا رقبہ (i) لیکن
	(ii) $\Delta ABC = \frac{1}{2}$ (متوازی الاضلاع BCAX کا رقبہ) کا رقبہ اور
	(iii) $\Delta DEF = \frac{1}{2}$ (متوازی الاضلاع EFYD کا رقبہ) کا رقبہ
نتیجہ (i), (ii), اور (iii) کی رو سے	$\therefore \Delta ABC = \Delta DEF$ کا رقبہ

نتیجہ صریح:

- (i) ایسی مثلثیں جن کے قاعدے برابر ہوں اور دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔
 (ii) مشترک راس والی ایسی مثلثیں جن کے قاعدے برابر اور ہم خط ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

مشق 16.2





- 1- ثابت کریں کہ مثلث کا ہر ایک وسطانیہ اسے برابر رقبہ والی دو مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔
- 2- ثابت کریں کہ متوازی الاضلاع کے وتر اسے ایسی چار مثلثوں میں تقسیم کرتے ہیں جو رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔



- 3- ایک دی گئی مثلث کو چھ برابر مثلثی حصوں میں تقسیم کریں۔

اعادہ مشق 16

- 1- مندرجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔
 - (i) کسی بند شکل کی حد بندی کرنے والے قطعات خط جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں وہ شکل کا رقبہ کہلاتا ہے۔
 - (ii) متشابه اشکال رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔
 - (iii) متماثل اشکال رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔
 - (iv) کسی متوازی الاضلاع کا وتر اسے دو غیر متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔
 - (v) کسی مثلث کا ارتفاع، اس کے راس سے متقابلہ ضلع (قاعدہ) تک عمودی فاصلہ ہوتا ہے۔
 - (vi) کسی متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔
- 2- مندرجہ ذیل اشکال کا رقبہ معلوم کریں۔



3- مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں۔

- (i) دی گئی شکل کا رقبہ
(ii) مثلثی رقبہ
(iii) مستطیلی رقبہ
(iv) مثلث کا ارتفاع

خلاصہ

- اس یونٹ میں ہم نے کچھ بنیادی تصورات کا تذکرہ کیا۔ اور درج ذیل مسئلے بمع نتائج صریح بیان اور ثابت کیے۔
- کسی مثلث اور اس کے اندرون کے یونین (Union) کو مثلثی علاقہ کہتے ہیں۔
- مثلث کا رقبہ اس کے مثلثی علاقہ کے رقبہ کو ہی کہتے ہیں۔
- کسی مثلث کا ارتفاع، اس کے راس کے بالمقابل ضلع تک عمودی فاصلہ ہوتا ہے۔
- ☆ ایک ہی قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- ☆ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔
- ☆ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- ☆ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- ☆ کسی بند شکل کی حد بندی کرنے والے قطعات خط جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں وہ شکل کا رقبہ کہلاتا ہے۔

عملی جیومیٹری - مثلثیں

(PRACTICAL GEOMETRY - TRIANGLES)

یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود (Unit Outlines)

17.1 مثلثوں کی بناوٹ / ساخت (Construction of Triangles)

17.2 برابر رقبہ والی اشکال (Figures with Equal Areas)

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع تر ماحصل / نتائج (Students Learning Outcomes)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے نفس مضمون کو سیکھنے کا عمل اس وقت مکمل سمجھا جائے گا جب طلباء درج ذیل تصورات پر عملی دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ

☆ ایک مثلث بنا سکیں جس کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ معلوم ہوں۔

☆ ایک مثلث بنا سکیں جس کا ایک ضلع اور دو زاویے معلوم ہوں۔

☆ ایک مثلث بنا سکیں جس کے دو اضلاع اور ان میں سے ایک ضلع کے متقابلہ زاویہ معلوم ہوں۔

(تینوں ممکن صورتیں)

☆ ایک معلوم مثلث کے زاویوں کے ناصف، عمود، اضلاع کے عمودی ناصف اور وسطیے کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کر سکیں۔

☆ ایک مثلث بنا سکیں جس کا رقبہ ایک معلوم چوکور کے رقبہ کے برابر ہو۔

☆ ایک مستطیل بنا سکیں جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے برابر ہو۔

☆ ایک مربع بنا سکیں جس کا رقبہ ایک معلوم مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو۔

☆ ایک مثلث بنا سکیں جس کے قاعدہ کی مقدار معلوم ہو اور جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے مساوی ہو۔


تعارف

اس یونٹ میں ہم مختلف اشکال مثلاً مثلث، مستطیل، مربع وغیرہ بنانا سیکھیں گے۔ ان بنیادی بناوٹوں کا علم روزمرہ کی زندگی میں بہت مفید ہے بالخصوص ایسے پیشوں میں جن کا تعلق لکڑی کے کام، گرافک ہنر مندی اور دھات کے کاروبار وغیرہ سے ہو۔ جیومیٹری کی اشکال کا باہمی ملاپ فنکارانہ خوب صورتی پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیومیٹرک اشکال عام طور پر بذریعہ پرکار، ڈی (Protractor) یعنی زاویہ پیمائش، سیٹ سکوائر، ڈیوائڈر اور لمبائی کی پیمائش والے پیمانے (ruler) سے بنائی جاتی ہیں۔

مشاہدہ کریں کہ اگر قطعات خط معمول سے زیادہ لمبے یا چھوٹے ہوں تو شکل کی بناوٹ کے لیے مناسب سکیل کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔

17.1 مثلثوں کی بناوٹ / ساخت

(a) ایک مثلث بنائیں جس کے دو اضلاع کی لمبائیاں اور ان کے درمیانی زاویہ کی مقدار معلوم ہوں۔



معلوم فرض کریں ایک مثلث کے دو اضلاع $m\overline{AB} = 4.6 \text{ cm}$ اور $m\overline{AC} = 4 \text{ cm}$ اور ان کا درمیانی زاویہ یعنی $m\angle A = 60^\circ$ دیئے گئے ہیں۔

مطلوب عمل معلوم اضلاع اور ان کے درمیانی زاویہ یعنی $m\angle A = 60^\circ$ کو استعمال کرتے ہوئے $\triangle ABC$ بنانا

(i) $m\overline{AB} = 4.6 \text{ cm}$ لمبا کھینچیں۔


(ii) \overline{AB} کے سرے A پر $m\angle BAC = 60^\circ$ بنائیں۔

(iii) 60° کے اختتامی بازو پر $m\overline{AC} = 4 \text{ cm}$ لمبا قطع کریں۔

(iv) B کو C سے ملائیں۔

(v) لہذا $\triangle ABC$ مطلوبہ مثلث ہے۔

(b) ایک مثلث بنائیں جس کا ایک ضلع اور دو زاویے معلوم ہوں۔



فرض کریں ایک ضلع جس کی لمبائی $m\overline{AB} = 5 \text{ cm}$ اور دو زاویے $m\angle A = 60^\circ$ اور $m\angle B = 60^\circ$ دیے گئے ہیں۔

مطلوب

دی گئی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ΔABC بنانا۔

عمل

(i) قطعہ خط AB کھینچیں جبکہ $m\overline{AB} = 5 \text{ cm}$

(ii) \overline{AB} کے نقطہ A کو اس مان کر $m\angle BAC = 60^\circ$ بنائیں

(iii) \overline{BA} کے نقطہ B پر $m\angle ABC = 60^\circ$ بنائیں۔

(iv) ان دونوں زاویوں کے غیر مشترک بازو نقطہ C پر ملتے ہیں۔


(v) ΔABC مطلوبہ مثلث ہے۔

مشاہدہ کریں

جب کسی مثلث کے دو زاویے معلوم ہوں تو تیسرا زاویہ اس حقیقت سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مثلث کے تینوں اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180° ہوتا ہے۔ اس طرح اگر مثلث کے دو زاویے دیئے گئے ہوں تو تیسرا زاویہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یوں دیئے گئے ضلع کو مثلث کا قاعدہ مان کر ان تینوں زاویوں میں سے کوئی سے دو زاویوں کو قاعدہ کے زاویے لیا جا سکتا ہے۔

(c) مبہم صورت (Ambiguous Case)

ایک مثلث بنائیں جبکہ اس کے دو اضلاع کی مقداریں اور ایک ضلع کے بالمتقابل زاویہ کی مقدار معلوم ہو۔



شکل (a)

شکل (b)

معلوم
مطلوب معلوم اجزاء سے مثلث بنانا۔
دواضلاع کی لمبائیاں c, a اور ان دونوں میں سے ایک ضلع a کے سامنے $m\angle A = \alpha$

عمل (i) کسی مناسب لمبائی کا ایک قطعہ خط AD کھینچیں۔

(ii) نقطہ A کو اس مان کر $m\angle DAB = m\angle A = \alpha$ بنا لیں۔

(iii) $m\overline{AB} = c$ قطع کریں۔

(iv) نقطہ B کو مرکز مان کر a کے برابر رداس کی ایک قوس لگائیں۔ اس طرح تین صورتیں سامنے آتی ہیں۔

صورت I


جب رداس a والی قوس، \overline{AD} کو دو مختلف نقاط C اور C' پر قطع کرتی ہے جیسا کہ شکل (a) میں۔
ب کو C سے اور پھر C' سے ملائیں۔

لہذا دی گئی معلومات سے دو مثلثیں ABC اور ABC' بنیں گی اور یہی مطلوبہ مثلثان ہیں۔

صورت II

جب رداس a والی قوس، \overline{AD} کو ایک ہی نقطہ C پر مس کرتی ہے جیسا کہ شکل (b) میں
نقطہ B کو نقطہ C سے ملائیں۔

لہذا $\triangle ABC$ مطلوبہ مثلث ہے اور C پر قائمہ الزاویہ ہے۔



شکل (c)

جب رداس a والی قوس، AD کو نہ تو قطع کرتی ہے اور نہ ہی مس

کرتی ہے۔ اس صورت میں کوئی مثلث نہیں بنے گی۔ جیسا کہ شکل (c) میں

صورت III

نوٹ: یاد رکھیں کہ ایک مثلث ABC میں $\angle A$ کے سامنے والے ضلع کو a سے، $\angle B$ کے سامنے والے ضلع کو b سے اور $\angle C$ کے سامنے والے ضلع کو c سے ظاہر (denote) کیا جاتا ہے۔

مشق 17.1

1- $\triangle ABC$ بنا لیں جس میں

$m\overline{CA} = 5.2 \text{ cm}$ ، $m\overline{BC} = 4.2 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 3.2 \text{ cm}$ (i)

$m\overline{CA} = 3.6 \text{ cm}$ ، $m\overline{BC} = 3.9 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 4.2 \text{ cm}$ (ii)

$m\angle B = 60^\circ$ ، $m\overline{BC} = 3.7 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 4.8 \text{ cm}$ (iii)

$m\angle A = 45^\circ$ ، $m\overline{AC} = 3.2 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 3 \text{ cm}$ (iv)

$$m\angle C = 70^\circ \quad \cdot \quad m\overline{CA} = 3.5 \text{ cm} \quad \cdot \quad m\overline{BC} = 4.2 \text{ cm} \quad (\text{v})$$

$$m\angle B = 105^\circ \quad \cdot \quad m\angle A = 30^\circ \quad \cdot \quad m\overline{AB} = 2.5 \text{ cm} \quad (\text{vi})$$

$$m\angle B = 45^\circ \quad \cdot \quad m\angle A = 75^\circ \quad \cdot \quad m\overline{AB} = 3.6 \text{ cm} \quad (\text{vii})$$

2- ΔXYZ بنائیں جس میں

$$m\angle X = 90^\circ \quad \text{اور} \quad m\overline{XY} = 6.1 \text{ cm} \quad \cdot \quad m\overline{YZ} = 7.6 \text{ cm} \quad (\text{i})$$

$$m\angle Y = 90^\circ \quad \text{اور} \quad m\overline{YZ} = 2.4 \text{ cm} \quad \cdot \quad m\overline{ZX} = 6.4 \text{ cm} \quad (\text{ii})$$

$$m\angle Z = 90^\circ \quad \text{اور} \quad m\overline{ZX} = 4.5 \text{ cm} \quad \cdot \quad m\overline{XY} = 5.5 \text{ cm} \quad (\text{iii})$$

3- ایک قائمہ الزاویہ مثلث بنائیں جس کے وتر کی لمبائی 5 cm اور ایک ضلع 3.2 cm ہے (اشارہ: نصف دائرہ کے اندر کا زاویہ / محور زاویہ قائمہ ہوتا ہے۔)

4- ایک قائمہ الزاویہ مساوی الساقین مثلث بنائیں جس کے وتر کی لمبائی مندرجہ ذیل ہے۔

$$5.4 \text{ cm} \quad (\text{i}) \quad 6.2 \text{ cm} \quad (\text{ii}) \quad 4.8 \text{ cm} \quad (\text{iii}) \quad 5.2 \text{ cm} \quad (\text{iv})$$

(اشارہ: اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔)
5- (مبہم صورت) ایک مثلث بنائیں جس میں

$$m\angle B = 45^\circ \quad \text{اور} \quad m\overline{AB} = 5.2 \text{ cm} \quad \cdot \quad m\overline{AC} = 4.2 \text{ cm}, \quad (\text{i}) \quad (\text{دو مثلثیں})$$

$$m\angle A = 30^\circ \quad \text{اور} \quad m\overline{AB} = 5 \text{ cm} \quad \cdot \quad m\overline{BC} = 2.5 \text{ cm}, \quad (\text{ii}) \quad (\text{ایک مثلث})$$

$$m\angle B = 60^\circ \quad \text{اور} \quad m\overline{AC} = 3.5 \text{ cm} \quad \cdot \quad m\overline{BC} = 5 \text{ cm}, \quad (\text{iii})$$

تعریفیں

اگر تین یا تین سے زیادہ خطوط ایک ہی نقطہ میں سے گزریں تو ان کو ہم نقطہ خطوط کہتے ہیں۔ یہ نقطہ تینوں خطوط کا مشترک نقطہ ہوتا ہے اور اس نقطہ کی جیومیٹری میں اپنی ہی اہمیت ہے۔ ایسے نقاط کو مخصوص نام دیے گئے ہیں۔

(i) کسی مثلث کے اندرونی زاویوں کے ناصف جس نقطہ پر ملتے ہیں اسے مثلث کا محور / اندرونی مرکز (incentre) کہتے ہیں۔

(ii) کسی مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں اور اس نقطہ کو مثلث کا محاصرہ مرکز (circumcentre) کہتے ہیں۔

(iii) کسی مثلث کے تینوں عمود (ارتفاع) ہم نقطہ ہوتے ہیں اور اس نقطہ کو مثلث کا عمودی مرکز (orthocentre) کہتے ہیں۔

(iv) کسی مثلث کے تینوں وسطیہ ہم نقطہ ہوتے ہیں اور اس نقطہ کو مثلث کا مرکز نما (centroid) کہتے ہیں۔

17.1.1 مثلث کے زاویوں کے ناصف، عمود (ارتفاع) وغیرہ کھینچنا۔

(a) ایک معلوم مثلث کے زاویوں کے ناصف کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔


مثال (i) $\triangle ABC$ بنائیں جس میں

$$m\overline{BC} = 5 \text{ cm}, m\overline{AB} = 4.6 \text{ cm}$$

$$m\overline{CA} = 5.1 \text{ cm} \text{ اور}$$

(ii) اس مثلث کے زاویوں کے ناصف کھینچیں

اور تصدیق کریں کہ یہ ہم نقطہ ہوتے ہیں۔



معلوم

ایک مثلث جس کے اضلاع

$$m\overline{AB} = 4.6 \text{ cm}, m\overline{BC} = 5 \text{ cm}$$

$$\text{اور } m\overline{CA} = 5.1 \text{ cm} \text{ ہیں۔}$$

مطلوب

(i) $\triangle ABC$ بناؤ

(ii) اس مثلث کے زاویوں کے ناصف کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کرنا۔

عمل

(i) \overline{BC} سم لمبا کھینچیں

(ii) نقطہ B کو مرکز مان کر $m\overline{AB} = 4.6 \text{ cm}$ رداس کی ایک قوس لگائیں۔

(iii) نقطہ C کو مرکز مان کر $m\overline{CA} = 5.1 \text{ cm}$ رداس کی ایک اور قوس لگائیں جو پہلی قوس کو نقطہ A پر قطع کرتی ہے۔

(iv) $\triangle ABC$ کو مکمل کرنے کے لیے نقاط B اور C کو نقطہ A سے ملائیں۔

(v) زاویہ B اور زاویہ C کی ناصف شعاعیں کھینچیں جو نقطہ I پر باہم ملتی ہیں۔

(vi) اب تیسرے زاویہ A کی ناصف شعاع کھینچیں۔

(vii) ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ تیسرے زاویہ کی ناصف شعاع بھی نقطہ I تقاطع میں سے گزرتی ہے۔

(viii) پس مثلث ABC کے زاویوں کی ناصف شعاعیں I پر ہم نقطہ ہیں جو کہ مثلث کے اندرونی مرکز ہے۔

یاد رکھیں مثلث کے زاویوں کے ناصف جس نقطہ پر ملتے ہیں اسے مثلث کا اندرونی مرکز (incentre) کہتے ہیں۔

(b) ایک معلوم مثلث کے عمود (ارتفاع) کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔

مثال (i) ایک ΔABC بنائیں جس میں

$$m\angle B = 56^\circ, m\overline{BC} = 5.9 \text{ cm}$$

اور $m\angle C = 44^\circ$ ہوں (protractor) یعنی زاویہ پیمائشی استعمال کریں)


(ii) مثلث کے عمود کھینچیں اور تصدیق کریں کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔

معلوم

ضلع $m\overline{BC} = 5.9 \text{ cm}$ اور زاویے

$$m\angle C = 44^\circ, m\angle B = 56^\circ$$

مطلوب



(i) ΔABC بنانا اور

(ii) اس کے عمود کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ

ہونے کی تصدیق کرنا۔

عمل

(i) $m\overline{BC} = 5.9 \text{ cm}$ لمبا کھینچیں

(ii) زاویہ پیمائشی (protractor) کی مدد سے

$$m\angle BCA = 44^\circ \text{ اور } m\angle CBA = 56^\circ$$

بناتے ہوئے ΔABC کی ساخت مکمل کریں۔

(iii) راس A سے \overline{BC} پر عمود \overline{AP} گرائیں

(iv) راس B سے \overline{CA} پر عمود \overline{BQ} گرائیں۔ یہ دونوں عمود ΔABC کے اندر نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔

(v) اب تیسرے راس C سے \overline{AB} پر عمود \overline{CR} گرائیں۔

(vi) ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ تیسرا عمود بھی پہلے دو عمودوں کے نقطہ تقاطع O میں سے گزرتا ہے۔

(vii) لہذا ΔABC کے تینوں عمود O پر ہم نقطہ ہیں۔

نوٹ: یاد رکھیں کہ مثلث کے تینوں عمود جہاں ہم نقطہ ہوتے ہیں وہ نقطہ عمودی مرکز (orthocentre) کہلاتا ہے۔

(c) ایک معلوم مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔

مثال

(i) ΔABC بنائیں جس میں $m\overline{AB} = 4$ cm ، $m\overline{BC} = 4.8$ cm اور $m\overline{AC} = 3.6$ cm

(ii) اس مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیں اور تصدیق کریں کہ یہ ہم نقطہ ہوتے ہیں۔


معلوم

ΔABC کے تینوں اضلاع دیئے گئے ہیں $m\overline{AB} = 4$ cm ، $m\overline{BC} = 4.8$ cm اور $m\overline{AC} = 3.6$ cm

مطلوب

(i) ΔABC بنانا

(ii) اس مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کرنا۔



عمل

(i) $m\overline{BC} = 4.8$ cm لبا کھینچیں

(ii) B کو مرکز مان کر اور رداس $m\overline{BA} = 4$ cm لے کر ایک قوس لگائیں۔

(iii) C کو مرکز مان کر اور رداس $m\overline{CA} = 3.6$ cm لے کر ایک اور قوس لگائیں جو پہلی قوس کو نقطہ A پر قطع کرتی ہے۔

(iv) ΔABC مکمل کرنے کے لیے B کو A سے اور C کو A سے ملائیں۔

(v) اضلاع \overline{BC} اور \overline{CA} کے عمودی ناصف کھینچیں جو ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔

(vi) اب تیسرے ضلع \overline{AB} کا عمودی ناصف کھینچیں۔

(vii) ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ بھی پہلے دو عمودی ناصفوں کے نقطہ تقاطع O میں سے گزرتا ہے۔

(viii) لہذا ΔABC کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف O پر ہم نقطہ ہیں۔

نوٹ: یاد رکھیں کہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف جہاں ہم نقطہ ہوتے ہیں وہ نقطہ محاصرہ مرکز (circumcentre) کہلاتا ہے۔

(d) ایک دی ہوئی مثلث کے وسطانیے کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔
مثال

(i) ایک ΔABC بنائیں جس میں $m\overline{BC} = 3.5 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 4.8 \text{ cm}$ اور

$$m\overline{AC} = 4 \text{ cm}$$

(ii) اس مثلث کے وسطانیے کھینچیں اور تصدیق کریں کہ وہ مثلث کے اندر واقع ایک نقطہ پر ہم نقطہ ہیں۔

(iii) پیمائش سے ظاہر کریں کہ مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو 2:1 کی نسبت میں قطع کرتے ہیں۔

معلوم


ΔABC کے تینوں اضلاع $m\overline{BC} = 3.5 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 4.8 \text{ cm}$ اور $m\overline{AC} = 4 \text{ cm}$

مطلوب

(i) دی گئی معلومات سے ΔABC بنائیں

(ii) اس مثلث کے وسطانیے کھینچیں اور ان کے مثلث کے اندر ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔

(iii) پیمائش کر کے دیکھیں کہ مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو نسبت 2:1 میں قطع کرتے ہیں۔



عمل

(i) $m\overline{AB} = 4.8 \text{ cm}$ لمبا کھینچیں

(ii) نقطہ A کو مرکز مان کر اور راس $m\overline{AC} = 4 \text{ cm}$ کی ایک قوس لگائیں۔

(iii) نقطہ B کو مرکز مان کر اور رداس $m\overline{BC} = 3.5 \text{ cm}$ لے کر ایک اور قوس لگائیں جو پہلی قوس کو

نقطہ C پر قطع کرتی ہے۔

(iv) A کو C سے اور B کو C سے ملا کر مثلث ABC کی ساخت مکمل کریں۔

(v) ΔABC کے اضلاع \overline{AB} ، \overline{BC} اور \overline{CA} کے عمودی ناصف کھینچیں اور ان اضلاع کے

وسطی نقاط کو بالترتیب P، Q اور R سے ظاہر کریں۔

(vi) نقطہ A کو وسطی نقطہ Q سے ملا کر وسطانیہ AQ بنائیں۔

(vii) نقطہ B کو وسطی نقطہ R سے ملا کر وسطانیہ BR حاصل کریں۔

(viii) وسطانیے AQ اور BR نقطہ G پر قطع کرتے ہیں۔

(ix) اب تیسرا وسطانیہ CP کھینچیں۔

(x) ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ تیسرا وسطانیہ بھی پہلے دو وسطانیوں کے نقطہ تقاطع G میں سے گزرتا ہے۔

(xi) لہذا ΔABC کے تینوں وسطانیے مثلث کے اندر واقع نقطہ G میں سے گزرتے ہیں۔ یعنی وہ G

پر ہم نقطہ ہیں۔

(xii) پیمائش کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو 2:1 کی نسبت میں قطع کرتے

ہیں۔ جیسے $AG:GQ = 2:1$ وغیرہ

نوٹ: یاد رکھیں مثلث کے تینوں وسطانیے ہم نقطہ ہوتے ہیں اور اس نقطہ کو مثلث کا مرکز نما (centroid) کہتے ہیں۔

مشق 17.2

1- مندرجہ ذیل مثلثیں ΔABC بنائیں۔ ان کے زاویوں کے ناصف کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔

(i) $m\overline{CA} = 5.2 \text{ cm}$ اور $m\overline{BC} = 3.1 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 4.5 \text{ cm}$

(ii) $m\overline{CA} = 5.2 \text{ cm}$ اور $m\overline{BC} = 6 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 4.2 \text{ cm}$

(iii) $m\angle B = 75^\circ$ اور $m\overline{BC} = 4.2 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 3.6 \text{ cm}$

2- مندرجہ ذیل مثلثیں PQR بنائیں۔ ان کے عمود (ارتفاع) کھینچیں اور تصدیق کریں کہ وہ ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

(i) $m\overline{PR} = 5.5 \text{ cm}$ اور $m\overline{QR} = 4.5 \text{ cm}$ ، $m\overline{PQ} = 6 \text{ cm}$

(ii) $m\angle R = 45^\circ$ اور $m\overline{QR} = 3.9 \text{ cm}$ ، $m\overline{PQ} = 4.5 \text{ cm}$

(iii) $m\angle P = 105^\circ$ اور $m\angle Q = 30^\circ$ ، $m\overline{RP} = 3.6 \text{ cm}$

3- مندرجہ ذیل مثلثیں ABC بنائیں۔ ان کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیں اور تصدیق کریں کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔ کیا

یہ مثلث کے اندر ہم نقطہ ہیں؟

$$m\angle B = 30^\circ \text{ اور } m\angle A = 45^\circ \text{ ، } m\overline{AB} = 5.3 \text{ cm (i)}$$

$$m\angle B = 60^\circ \text{ اور } m\angle A = 30^\circ \text{ ، } m\overline{BC} = 2.9 \text{ cm (ii)}$$

$$m\angle A = 120^\circ \text{ اور } m\overline{AC} = 3.2 \text{ cm ، } m\overline{AB} = 2.4 \text{ cm (iii)}$$

4- مندرجہ ذیل مثلثیں XYZ بنائیں۔ ان کے وسطانیے کھینچیں اور تصدیق کریں کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔

$$m\angle X = 75^\circ \text{ اور } m\angle Y = 60^\circ \text{ ، } m\overline{YZ} = 4.1 \text{ cm (i)}$$

$$m\overline{ZX} = 5.6 \text{ cm اور } m\overline{YZ} = 3.4 \text{ cm ، } m\overline{XY} = 4.5 \text{ cm (ii)}$$

$$m\angle Y = 45^\circ \text{ اور } m\angle X = 75^\circ \text{ ، } m\overline{ZX} = 4.3 \text{ cm (iii)}$$


17.2 برابر رقبے والی اشکال

(i) ایک مثلث بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم چوکور کے رقبہ کے برابر ہو۔

معلوم ایک چوکور ABCD

مطلوب ایک مثلث بنانا جس کا رقبہ چوکور ABCD کے رقبہ کے برابر ہو۔

عمل



(i) A کو C سے ملائیں

(ii) نقطہ D سے $\overline{DP} \parallel \overline{CA}$

کھینچیں جو ضلع BA کو

(A سے پرے بڑھاتے ہوئے) نقطہ P پر ملے۔

(iii) نقطہ P کو نقطہ C سے ملائیں۔ تب PBC مطلوبہ مثلث ہے۔

مشاہدہ کریں کہ

مثلث APC اور مثلث ADC ایک ہی قاعدہ AC پر متوازی خطوط AC اور PD کے درمیان واقع ہیں

لہذا رقبہ $\Delta APC = \Delta ADC$

$$\Delta APC + \Delta ABC = \Delta ADC + \Delta ABC$$

یا رقبہ چوکور $\Delta PBC = ABCD$

17.3 مستقیم

1- (i) ایک چوکور ABCD بنائیں جس میں $m\overline{AB} = m\overline{AC} = 5.3 \text{ cm}$

$m\overline{AD} = 2.8 \text{ cm}$ اور $m\overline{BC} = m\overline{CD} = 3.8 \text{ cm}$

(ii) ضلع BC پر ایک مثلث بنائیں جس کا رقبہ چوکور ABCD کے رقبہ کے برابر ہو۔

2- ایک مثلث بنائیں جس کا رقبہ چوکور PQRS کے رقبہ کے برابر ہو جبکہ


$m\angle QRS = 60^\circ$ ، $m\overline{SP} = 2.75 \text{ cm}$ ، $m\overline{RS} = 6 \text{ cm}$ ، $m\overline{QR} = 7 \text{ cm}$

[اشارہ $2.75 = \frac{1}{2} \times 5.5$] $m\angle RSP = 90^\circ$

3- ایک مثلث بنائیں جس کا رقبہ چوکور ABCD کے رقبہ کے برابر ہو جبکہ

اور $m\angle BAD = 105^\circ$ ، $m\overline{AC} = 7.2 \text{ cm}$ ، $m\overline{BC} = 4 \text{ cm}$ ، $m\overline{AB} = 6 \text{ cm}$

$m\overline{BD} = 8 \text{ cm}$




4- ایک قائمہ الزاویہ مثلث بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مربع کے رقبہ کے برابر ہو۔

(ii) ایک مستطیل بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے برابر ہو۔

معلوم مثلث ABC

مطلوب ایک مستطیل بنانا جس کا رقبہ معلوم مثلث

ABC کے رقبہ کے برابر ہو۔



عمل

(i) ایک $\triangle ABC$ لیں۔

(ii) ضلع BC کا عمودی ناصف \overrightarrow{DP} کھینچیں۔

(iii) $\triangle ABC$ کے زاویہ A کے راس میں سے

گزرتا ہوا $\overrightarrow{PAQ} \parallel \overline{BC}$ کھینچیں جو

\overrightarrow{DP} کو نقطہ P پر قطع کرتا ہے۔

$$m\overline{PQ} = m\overline{DC} \quad \text{(iv)}$$


(v) نقطہ Q کو نقطہ C سے ملائیں۔

(vi) تہ CDPQ مطلوبہ مستطیل ہے۔

مثال ایک متوازی الاضلاع بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے برابر ہو اور ایک زاویہ دیئے گئے زاویہ کے برابر ہو۔

معلوم ΔABC اور $\angle \alpha$

مطلوب ایک متوازی الاضلاع بنانا جس کا رقبہ ΔABC کے رقبہ کے برابر ہو اور ایک زاویہ $\angle \alpha =$



عمل (i) \overline{BC} کی نقطہ D پر تصیف کریں۔

(ii) \overline{DE} اس طرح کھینچیں کہ

$$\angle CDE = \angle \alpha$$

(iii) $\overline{AEF} \parallel \overline{BC}$ کھینچیں

جو \overline{DE} کو نقطہ E پر قطع کرے۔

(iv) \overline{EF} برابر \overline{DC} قطع کریں۔ نقطہ C کو

نقطہ F سے ملائیں

تہ CDEF مطلوبہ متوازی الاضلاع ہوگی۔

مشق 17.4

1- ایک مثلث بنائیں جس کے اضلاع کی لمبائی 4 cm، 5 cm اور 6 cm ہو اور ایک مستطیل بنائیں جس کا رقبہ

دی گئی مثلث کے رقبہ کے برابر ہو۔ مستطیل کے دونوں وتروں کی پیمائش کریں۔ کیا وہ برابر ہیں؟

2- ایک متساوی الساقین مثلث کو مستطیل میں تبدیل کریں۔

3- ایک ΔABC بنائیں جبکہ $m\overline{AB} = 3$ cm، $m\overline{BC} = 3.8$ cm، $m\overline{AC} = 4.8$ cm ہو۔ ایک

مستطیل بنائیں جس کا رقبہ ΔABC کے رقبہ کے برابر ہو اور اس مستطیل کے اضلاع کی پیمائش کریں۔

(iii) ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ دی گئی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو۔


معلوم ایک مستطیل ABCD

مطلوب ایک مربع بنانا جس کا رقبہ مستطیل ABCD کے رقبہ کے برابر ہو۔

(iv) ایک مثلث بنائیں جس کا قاعدہ معلوم ہو اور جس کا رقبہ معلوم مثلث کے رقبہ کے مساوی ہو۔

معلوم ΔABC

مطلوب ایک مثلث بنانا جس کے قاعدہ کی لمبائی x ہو اور جس کا رقبہ ΔABC کے مساوی ہو۔



عمل (i) دی ہوئی ΔABC بنائیں۔

(ii) $\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$ کھینچیں

(iii) نقطہ B کو مرکز مان کر اور رداس x کے برابر لے کر ایک قوس لگائیں جو \overrightarrow{AD} کو نقطہ M پر قطع کرتی ہے۔

(iv) B کو M سے اور C کو M سے ملائیں۔

(v) پس ΔBCM مطلوبہ مثلث ہے جس کا قاعدہ x کے برابر ہے اور جو رقبہ میں ΔABC کے مساوی ہے۔

مشق 17.5

1- ایک مستطیل بنائیں جس کے متصلا اضلاع بالترتیب 2.5 cm اور 5 cm ہیں۔ ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ دی ہوئی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو۔

2- ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ ایک ایسی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو جس کے متصلا اضلاع بالترتیب 4.5 cm اور 2.2 cm ہیں۔ مربع کے اضلاع کے پیمائش کریں اور اس کا رقبہ معلوم کریں۔ اس رقبہ کا موازنہ مستطیل کے رقبہ سے کریں۔

3- مندرجہ بالا سوال نمبر 2 میں پیمائش سے تصدیق کریں کہ مربع کا احاطہ مستطیل کے احاطہ سے کم ہے۔

4- ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ دو مربعوں کے مجموعی رقبہ کے برابر ہو جبکہ ان دو مربعوں کے اضلاع بالترتیب 3 cm اور 4 cm ہوں۔

5- ایک مثلث بنائیں جس کا قاعدہ 3.5 cm اور دوسرے دو اضلاع بالترتیب 3.4 cm اور 3.8 cm ہیں۔ اس مثلث کو مساوی رقبہ والے مربع میں تبدیل کریں۔

- 6- ایک مثلث بنائیں جس کا قاعدہ 5 cm اور دوسرے اضلاع 5 cm اور 6 cm ہوں۔ ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ دی گئی مثلث کے رقبہ کے برابر ہو۔

اعادہ مشق 17

1- مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو اس طرح پُر کریں کہ بیان درست ہو۔

- (i) قائمہ الزاویہ مثلث میں 90° والے زاویہ کے سامنے والے ضلع کو..... کہتے ہیں۔
(ii) قطعہ خط جو مثلث کے ایک راس کو سامنے والے ضلع کے وسطی نقطہ سے ملاتا ہے..... کہلاتا ہے۔
(iii) ایک مثلث کے راس سے کھینچا ہوا قطعہ خط جو سامنے والے ضلع پر..... ہو اسے مثلث کا ارتفاع کہتے ہیں۔
(iv) ایک مثلث کے تین زاویوں کے ناصف..... ہوتے ہیں۔
(v) مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف جہاں ہم نقطہ ہوتے ہیں وہ نقطہ مثلث کے راسوں سے..... ہوتا ہے۔
(vi) دو یا دو سے زیادہ باہم مطابقت رکھنے والی مثلثیں متشابہ کہلاتی ہیں اگر ان کے متناظرہ (باہم مطابق) زاویے متماثل اور ان کے متناظرہ اضلاع..... ہوں۔
(vii) قائمہ الزاویہ مثلث کے ارتفاع قائمہ زاویہ کے..... پر ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

2- کثیرالانتخابی سوالات۔ (a), (b), (c), (d) میں سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پُر کریں۔

- (i) ایک مثلث جس کے دو اضلاع متماثل ہوں..... کہلاتی ہے۔
(a) مختلف الاضلاع (b) قائمہ الزاویہ
(c) مساوی الاضلاع (d) متساوی الساقین
(ii) ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو..... کہلاتی ہے۔
(a) متوازی الاضلاع (b) مستطیل
(c) ذوزنقہ (trapezium) (d) مربع (rhombus)
(iii) مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف..... ہوتے ہیں۔
(a) متماثل (b) ہم خط
(c) ہم نقطہ (d) متوازی
(iv) متساوی الساقین مثلث کے..... ارتفاع متماثل ہوتے ہیں۔
(a) دو (b) تین
(c) چار (d) کوئی بھی نہیں

- (v) ایک نقطہ جو کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو وہ اس قطعہ خط کے پر واقع ہوتا ہے۔
- (a) ناصف (b) عمودی ناصف
(c) عمود (d) وسطانیہ
- (vi) ایک مثلث کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے سے متماثل مثلث بنائی جاسکتی ہیں۔
- (a) تین (b) چار
(c) پانچ (d) دو
- (vii) متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔
- (a) تنصیف (b) تثلیث
(c) عمودی تنصیف (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (viii) مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو کی نسبت میں قطع کرتے ہیں۔
- (a) 1 : 4 (b) 1 : 3
(c) 1 : 2 (d) 1 : 1
- (ix) متساوی الساقین مثلث کے قاعدے پر ایک زاویہ 30° ہے۔ اس کے راسی زاویے کی مقدار کیا ہے؟
- (a) 30° (b) 60°
(c) 90° (d) 120°
- (x) اگر ایک مثلث کے تینوں عمود متماثل ہیں تو وہ مثلث ہوگی۔
- (a) مساوی الاضلاع (b) قائمہ الزاویہ
(c) متساوی الساقین (d) حادہ الزاویہ
- (xi) اگر ایک مثلث کے دو وسطانیے متماثل ہوں تو وہ مثلث ہوگی۔
- (a) متساوی الساقین (b) مساوی الاضلاع
(c) قائمہ الزاویہ (d) حادہ الزاویہ

مندرجہ ذیل کی تعریف کریں۔ -3

- (i) اندرونی مرکز (incentre) (ii) سرکم سنٹر (circumcentre)
(iii) عمودی مرکز / آرتھوسنٹر (orthocentre) (iv) سنٹر انڈ (centroid)
(iv) ہم نقطہ (point of concurrency)

خلاصہ

اس یونٹ میں ہم نے مندرجہ ذیل اشکال کی بناوٹ (ساخت) اور ان سے متعلقہ تصورات سیکھے۔

- ☆ ایک مثلث بنانا جس کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ معلوم ہوں۔
- ☆ ایک مثلث بنانا جس کا ایک ضلع اور دو زاویے معلوم ہوں۔
- ☆ ایک مثلث بنانا جس کے دو اضلاع اور ان میں سے ایک ضلع کے بالمقابل زاویہ معلوم ہوں۔
- ☆ ایک معلوم مثلث کے زاویوں کے ناصف کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کرنا۔
- ☆ ایک معلوم مثلث کے عمود (ارتفاع) کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کرنا۔
- ☆ ایک معلوم مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کرنا۔
- ☆ ایک معلوم مثلث کے وسطیے کھینچنا اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کرنا۔
- ☆ ایک مثلث بنانا جس کا رقبہ ایک معلوم چوکور کے رقبہ کے برابر ہو۔
- ☆ ایک مستطیل بنانا جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے برابر ہو۔
- ☆ ایک مربع بنانا جس کا رقبہ ایک معلوم مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو۔
- ☆ ایک مثلث بنانا جس کے قاعدہ کی مقدار معلوم ہو اور جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے مساوی ہو۔
- ☆ تین یا تین سے زیادہ خطوط ہم نقطہ کہلاتے ہیں اگر وہ ایک ہی نقطہ میں سے گزریں۔
- کسی مثلث کے اندرونی زاویوں کے ناصف جس نقطہ پر ملتے ہیں اسے مثلث کا محصور / اندرونی مرکز (incentre) کہتے ہیں۔

• ایک مثلث کے محاصرہ مرکز (circumcentre) سے مراد ایک ایسا نقطہ ہے جہاں مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

• مثلث کا وسطانیہ (median) ایک ایسا قطعہ خط ہوتا ہے جو مثلث کے ایک راس کو بالمقابل (سامنے والے) ضلع کے وسطی نقطہ سے ملائے۔

• مثلث کے عمودی مرکز یعنی آرتھوسنٹر (orthocentre) سے مراد ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پر مثلث کے تینوں عمود (ارتفاع) ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

جوابات

1.1 مشق

1. 2-by-2 کا مرتبہ A ، 2-by-2 کا مرتبہ B ، 1-by-2 کا مرتبہ C
3-by-1 کا مرتبہ D ، 3-by-2 کا مرتبہ E ، 1-by-1 کا مرتبہ F
3-by-3 کا مرتبہ G ، 2-by-3 کا مرتبہ H
2. $A = C$, $B = I$, $E = H = J$, $F = G$
3. $a = -4$, $b = -1.5$, $c = 4$ and $d = 3$

1.2 مشق

1. A صفری قالب B قطاری قالب C کالمی قالب
D وحدانی (ضربی ذاتی) قالب E صفری قالب F کالمی قالب
2. (a) (iii) (iv) (viii) (b) (i) (ii) (v) (vi) (vii) (ix)
(c) (vi) (d) (ii) (vii) (e) (iv) (f) (ix)
3. سکیر قالب : A, E وحدانی قالب : C وتری قالب : A, B, C, D, E

$$4. \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$5. A^t = [0 \ 1 \ -2], \quad B^t = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}, \quad C^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$D^t = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad E^t = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad F^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

1.3 مشق

1. A اور E, B اور D, C اور F.

$$2. \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -3 \\ -3 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sqrt{3} & -1 \\ 1 & -\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

3. (i) $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$
 (iv) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ (vi) $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
 (vii) $\begin{bmatrix} -2 & 2 & -4 \end{bmatrix}$ (viii) $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ (ix) $\begin{bmatrix} 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$
 4. (i) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 (iv) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ (vi) $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
 6. (i) $\begin{bmatrix} 3 & -20 \\ 15 & -4 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 2 & 15 \\ -25 & -16 \end{bmatrix}$ 7. $a = \frac{13}{2}, b = \frac{2}{3}$

مشق 1.4

1. ممکن (i), (ii), (iv), (v) 2. (i) $AB = \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix}$
 3. (i) $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} -3 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} -12 \end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix} 24 \end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -12 & -15 \\ 24 & 34 \end{bmatrix}$
 4. (a) $\begin{bmatrix} 13 & -2 \\ 5 & -1 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & 13 \\ 13 & 34 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$
 (d) $\begin{bmatrix} -4 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ (e) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

مشق 1.5

1. (i) -2 (ii) -8 (iii) 0 (iv) 10
 2. (i) تار (ii) غیر تار (iii) غیر تار (iv) تار
 3. (i) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$ (ii) $B^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$
 (iii) ممکن نہیں C^{-1} (iv) $D^{-1} = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$
 5. (i) ضربی معکوس (ii) ضربی معکوس

مشق 1.6







1. (i) $x = 2, y = 0$ (ii) $x = \frac{7}{2}, y = -4$ (iii) $x = \frac{3}{5}, y = \frac{14}{5}$ (iv) $x = -2, y = 0$
 (v) حل ممکن نہیں (vi) $x = 4, y = -7$ (vii) $x = 2, y = 0$ (viii) $x = 4, y = 2$

2. 15, 60 3. 18.5 cm, 15 cm 4. $49^\circ, 49^\circ, 82^\circ$ 5. $26^\circ, 64^\circ$
6. 50 km/h, 56 km/h

اعادہ مشق 1

1. (i) b (ii) c (iii) a (iv) b (v) a (vi) c (vii) a (viii) d
2. (i) صفری (ii) (ضربی ذاتی) و (صدائی) (iii) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (iv) کے برابر نہیں ہے (v) برابر (vi) مربعی
3. $a = -6, b = 3$.
4. (i) $\begin{bmatrix} 19 & -6 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 4 & -17 \\ -7 & -2 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} -36 & 15 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix} -\frac{22}{3} & 12 \\ \frac{16}{3} & 2 \end{bmatrix}$
5. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$.

مشق 2.1

1. (ii), (iv), (v) : ناطق اعداد (i), (iii), (vi) : غیر ناطق اعداد
2. (i) 0.68 (ii) 4.75 (iii) 7.125
(iv) 11.3889 (v) 0.625 (vi) 0.65789
3. (i) غلط (ii) درست (iii) غلط (iv) درست (v) غلط
4. (i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
5. $\frac{47}{72}$ 6. (i) $\frac{5}{9}$ (ii) $\frac{13}{99}$ (iii) $\frac{67}{99}$

2.2 مشق

- (i) خاصیت مبادلہ بالفاظ جمع (ii) خاصیت تلازم بلفاظ ضرب (iii) ضربی ذاتی عنصر
(iv) ثلاثی خاصیت (v) خاصیت مبادلہ بلفاظ ضرب (vi) تفسیحی خاصیت بلفاظ جمع
(vii) جمعی معکوس (viii) ضربی معکوس (ix) ضربی خاصیت
- جمعی ذاتی عنصر ، جمعی معکوس ، خاصیت مبادلہ ، ضربی عمل کی خاصیت تفسیحی بلفاظ تفریق
- (i) جمعی ذاتی عنصر (ii) ضربی عمل کی خاصیت تفسیحی بلفاظ تفریق (iii) جمعی معکوس
(iv) خاصیت بندش بلفاظ ضرب (v) ضربی معکوس

2.3 مشق

- (i) $(-64)^{1/3}$ (ii) $\sqrt[5]{2^3}$ (iii) $-\sqrt[3]{7}$ (iv) $\sqrt[3]{y^{-2}}$
- (i) غلط (ii) درست (iii) غلط (iv) غلط
- (i) -5 (ii) $2\sqrt[4]{2}$ (iii) $\frac{\sqrt[5]{3}}{2}$ (iv) $-\frac{2}{3}$

2.4 مشق

- (i) $\frac{7}{27(\sqrt[3]{3})}$ (ii) $-\frac{16x^2}{y^2}$ (iii) $\frac{x^{18}z^{12}}{y^6}$ (iv) 6
- (i) 2 (ii) 6 (iii) 25 (iv) $\frac{1}{x^3}$

2.5 مشق

- (i) $-i$ (ii) -1 (iii) 1 (iv) 1 (v) $-i$ (vi) $-i$
- (i) $2-3i$ (ii) $3+5i$ (iii) i (iv) $-3-4i$ (v) $-4+i$ (vi) $-i-3$
- (i) $\text{Re}(Z) = 1, \text{Im}(Z) = 1$ (ii) $\text{Re}(Z) = -1, \text{Im}(Z) = 2,$
(iii) $\text{Re}(Z) = 2, \text{Im}(Z) = -3$ (iv) $\text{Re}(Z) = -2, \text{Im}(Z) = -2$
(v) $\text{Re}(Z) = 0, \text{Im}(Z) = -3$ (vi) $\text{Re}(Z) = 2, \text{Im}(Z) = 0$
- $x = 3, y = -3$

2.6 مشق

- (i) غلط (ii) غلط (iii) درست (iv) درست (v) غلط (vi) درست (vii) درست
- (i) $9+i$ (ii) $-11-4i$ (iii) $-1-14i$ (iv) $1+4i$
- (i) $15-23i$ (ii) $2-10i$ (iii) $-4-6\sqrt{5}i$ (iv) $12-5i$
- (i) $-1+i$ (ii) $\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i$ (iii) $2-3i$ (iv) $-\frac{13}{10} - \frac{19}{10}i$
(v) $-1+0.i$ (vi) $\frac{5}{26} - \frac{1}{26}i$

5. (i) (a) i (b) 0 (c) $-2i$ (d) 1 (ii) (a) $2-i$ (b) 4 (c) $2i$ (d) 5
 (iii) (a) $-i$ (b) 0 (c) $2i$ (d) 1 (iv) (a) $-\frac{1}{5} + \frac{11}{10}i$ (b) $-\frac{2}{5}$ (c) $-\frac{11}{5}i$ (d) $\frac{5}{4}$
7. (i) $x = \frac{5}{13}, y = \frac{14}{13}$ (ii) $x = -1, y = 0$ (iii) $x = -\frac{7}{3}, y = -24$

اعاده مشق 2

1. (i) a (ii) c (iii) a (iv) c (v) b (vi) c (vii) c (viii) d
 (ix) b (x) a (xi) a (xii) c (xiii) b (xiv) a (xv) c
2. (i) درست (ii) غلط (iii) درست (iv) غلط (v) درست (vi) غلط (vii) غلط (viii) درست (ix) درست
3. (i) $\frac{3}{x^2y^3}$ (ii) $5x^{5n}y^{4m}$ (iii) xyz^2 (iv) $\frac{4z^2}{5 \times 5^{3/5}x^4y^2}$ 4. $\frac{6}{5}$ 5. $\frac{1}{5}$ 6. 1 7. 1

مشق 3.1

1. (i) 5.7×10^3 (ii) 4.98×10^7 (iii) 9.6×10^7 (iv) 4.169×10^2
 (v) 8.3×10^4 (vi) 6.43×10^{-3} (vii) 7.4×10^{-3} (viii) 6×10^7
 (ix) 3.95×10^{-9} (x) $\frac{2.75 \times 10^5}{2.5 \times 10^{-3}}$
2. (i) 0.0006 (ii) 50,600,000,000 (iii) 0.000009018 (iv) 786,500,000

مشق 3.2

1. (i) 2.3672 (ii) 1.4673 (iii) $\bar{4}.5051$ (iv) $\bar{1}.5059$
2. (i) 0.4926 (ii) 2.4926 (iii) $\bar{3}.4926$ (iv) $\bar{1}.4926$
3. (i) 3649 (ii) 0.5530
4. (i) 4 (ii) 36 (iii) 25 (iv) 1.6021 5. (i) -7 (ii) 6
6. (i) 32 (ii) $\frac{1}{2}$ (iii) 1 (iv) 8 (v) 81

مشق 3.3

1. (i) $\log A + \log B$ (ii) $\log 15.2 - \log 30.5$ (iii) $\log 21 + \log 5 - \log 8$
 (iv) $\frac{1}{3} [\log 7 - \log 15]$ (v) $\frac{1}{3} \log 22 - 3 \log 5$ (vi) $\log 25 + \log 47 - \log 29$
2. $\log \frac{(x+1)^2}{x(x-1)}$
3. (i) $\log 21 \times 5$ (ii) $\log \frac{25}{3^2}$ (iii) $\log \frac{x^2}{y^3}$ (iv) $\log \frac{5 \times 6}{2}$

4. (i) 4 (ii) 2
 5. (i) 1.5050 (ii) 1.3801 (iii) 0.2615 (iv) 0.4259 (v) 1.4771

مشق 3.4

1. (i) 11.15 (ii) 2.302 (iii) 261 (iv) 1.258
 (v) 0.0895 (vi) 0.6229 (vii) 0.9811 (viii) 0.0008778
 2. 329.2 3. 10 پونٹ 4. 707.1 5. 27.50

اعادہ مشق 3

1. (i) c (ii) b (iii) d (iv) a (v) b (vi) a (vii) d (viii) c (ix) b (x) c
 2. (i) 10 (ii) خاصہ (iii) مینٹیا (iv) ضد لوگار تھم (v) ایک (vi) 2
 3. (i) 243 (ii) 4 (iii) 1 (iv) $\frac{1}{16}$
 4. (i) 284.6 (ii) 1.521 (iii) 1.010 (iv) 0.04206
 5. (i) 1.6532 (ii) 0.0279 (iii) $\bar{2}.6811$
 6. (i) 2.942 (ii) 3.213 (iii) 4529

مشق 4.1

1. (i) نہیں (ii) نہیں (iii) ہاں (iv) نہیں
 2. (i) نہیں (ii) ہاں (iii) ہاں (iv) نہیں
 3. (i) $\frac{4y^2z^3}{x}$ (ii) $\frac{4a}{x-1}$ (iii) 1 (iv) $(x-y)^2$ (v) $\frac{x-1}{x-2}$ (vi) $\frac{x-2}{2(x+2)}$
 (vii) $4x(x-1)$ (viii) x^2+3x-4
 4. (a) (i) $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$ (ii) $-\frac{1}{4}$ (b) $-16\frac{5}{8}$
 5. (i) $\frac{19}{2x-3y}$ (ii) $\frac{8x}{1-4x^2}$ (iii) $\frac{x+5}{x^2-36}$ (iv) $\frac{x-y}{x+y}$ (v) $\frac{x^2-15x+6}{2(x-3)(x+3)^2}$ (vi) 0
 6. (i) $(x-7)(5x+2)$ (ii) $\frac{2}{3-x}$ (iii) 1 (iv) $\frac{-(x+5)}{x+1}$ (v) $\frac{x(x-2)}{y(x-1)}$

مشق 4.2

1. (i) $a^2 + b^2 = 68$ (ii) $ab = 2$
 2. -22 3. 46 4. ± 14 5. $xy + yz + zx = 40$ 6. 91
 7. -3421 8. 316 9. 9217 10. 18 11. 364 12. 110
 13. 234
 14. (i) $(x-y)(x^2+xy+y^2-1)$ (ii) $\left(2x - \frac{1}{3y}\right) \left[4x^2 + \frac{2x}{3y} + \frac{1}{9y^2}\right]$
 15. (i) $x^6 + y^6$ (ii) $x^9 - y^9$ (iii) $x^{12} - y^{12}$ (iv) $64x^{12} - 1$

مشق 4.3

- (i) $6\sqrt{5}$ (ii) $27\sqrt{2}$ (iii) $3^3\sqrt{2}$ (iv) $2xyz\sqrt{3xy^2z^3}$
- (i) $\sqrt{3}$ (ii) $\sqrt{3}$ (iii) $3xy^2z^3$ (iv) 4 (v) 21
- (i) $\sqrt{5}$ (ii) $18\sqrt{3}$ (iii) 15 (iv) $6\sqrt{5}$
- (i) 6 (ii) $8+2\sqrt{15}$ (iii) 2 (iv) $5/3$ (v) $x^4 - y^4$

مشق 4.4

- (i) $\sqrt{3}/4$ (ii) $\sqrt{2}$ (iii) $\sqrt{6}/6$ (iv) $-\frac{1}{11}(3-2\sqrt{5})$
(v) $\sqrt{31}+4$ (vi) $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ (vii) $2-\sqrt{3}$ (viii) $4+\sqrt{15}$
- (i) $3-\sqrt{7}$ (ii) $4+\sqrt{5}$ (iii) $2-\sqrt{3}$ (iv) $2-\sqrt{5}$
(v) $5-\sqrt{7}$ (vi) $4+\sqrt{15}$ (vii) $7+\sqrt{6}$ (viii) $9-\sqrt{2}$
- (i) $2+\sqrt{3}$ (ii) $-4-\sqrt{17}$ (iii) 4
- (i) $\sqrt{5}-\sqrt{6}$ (ii) $2\sqrt{5}$ (iii) 0
- (i) $2\sqrt{3}, 12$ (ii) $\frac{14}{3}, \frac{178}{9}, \frac{2366}{27}$ 6. $a=4, b=0$

اعاده مشق 4

- (i) a (ii) d (iii) b (iv) a (v) b (vi) b (vii) d (viii) c
- (i) 4 (ii) $(x-2)(x+2)$ (iii) x^2-1+1/x^2 (iv) $(a+b)^2+(a-b)^2$
(v) $x^2+\frac{1}{x^2}-2$ (vi) 3 (vii) $2+\sqrt{3}$
- (i) 7 (ii) 47 4. (i) 6 (ii) 34 5. 65, 4
- (i) 4 (ii) $2\sqrt{3}$ (iii) 14 (iv) $8\sqrt{3}$
- (i) $2\sqrt{5}$ (ii) 4 (iii) 18 (iv) $8\sqrt{5}$ 8. (i) $\frac{a^2+\sqrt{a^4-4}}{2}$ (ii) $\frac{2\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}$

مشق 5.1

- (i) $2ab(c-2x+d)$ (ii) $3y(3x-4x^2+6y)$
(iii) $-3x(xy+1-3y^2)$ (iv) $5abc(bc^2-2ab^2-4a^2c)$
(v) $x^2y(x-3y)(3x-7y)$ (vi) $2xy^2(x^2+5)(y+4)$
- (i) $(a-b)(5x-3y)$ (ii) $(y-4)(3x+2)$
(iii) $(x-2y)(x^2+3y^2)$ (iv) $(x-z)(xz+y^2)$
- (i) $(12a+1)^2$ (ii) $\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right)^2$

- (iii) $(x + y - 7z)^2$ (iv) $3(2x - 3)^2$
4. (i) $3(x - 5y)(x + 5y)$ (ii) $(x - y)(x + y - 1)$
 (iii) $2a(8m - 11n)(8m + 11n)$ (iv) $3x(1 - 9x)(1 + 9x)$
5. (i) $(x + y + 3)(x - y - 3)$ (ii) $(x - a + 1)(x + a - 1)$
 (iii) $(2x + y + 1)(2x - y - 1)$ (iv) $(x + y - 1)(x - y - 3)$
 (v) $(5x - 1 + 6z)(5x - 1 - 6z)$ (vi) $(x + y - 2z)(x - y - 2z)$

5.2 مشق

1. (i) $\left(x^2 - \frac{1}{x^2} + 1\right)\left(x^2 - \frac{1}{x^2} - 1\right)$ (ii) $3(x^2 + 2xy + 2y^2)(x^2 - 2xy + 2y^2)$
 (iii) $(a^2 + 2b^2 + ab)(a^2 + 2b^2 - ab)$ (iv) $(2x^2 + 6x + 9)(2x^2 - 6x + 9)$
 (v) $(x^2 + 3x + 5)(x^2 - 3x + 5)$ (vi) $(x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x + 4)$
2. (i) $(x + 8)(x + 6)$ (ii) $(x - 12)(x - 9)$
 (iii) $(x - 14)(x + 3)$ (iv) $(x - 11)(x + 12)$
3. (i) $(2x + 5)(2x + 1)$ (ii) $(5x - 3)(6x + 5)$
 (iii) $(8x - 3)(3x - 7)$ (iv) $(5x - 21)(x + 1)$
 (v) $(4x - y)(x - 4y)$ (vi) $(x - 13y)(3x + y)$
 (vii) $(5x - 2y)(x + 7y)$ (viii) $\left(5x - \frac{1}{x} + 2\right)\left(5x - \frac{1}{x} + 2\right)$
4. (i) $(x^2 + 5x + 7)(x^2 + 5x + 3)$ (ii) $(x - 5)(x + 1)(x - 2)^2$
 (iii) $(x^2 + 7x + 15)(x^2 + 7x + 7)$ (iv) $(x - 8)(x + 7)(x - 3)(x + 2)$
 (v) $x^2\left(x + \frac{6}{x} + 8\right)\left(x + \frac{6}{x} + 4\right)$
5. (i) $(x - 4)^3$ (ii) $(2x + 5)^3$ (iii) $(x - 6)^3$ (iv) $(2x - 5y)^3$
6. (i) $(3 + 2x)(9 - 6x + 4x^2)$ (ii) $(5x - 6y)(25x^2 + 30xy + 36y^2)$
 (iii) $(4x + 3y)(16x^2 - 12xy + 9y^2)$ (iv) $(2x + 5y)(4x^2 - 10xy + 25y^2)$

5.3 مشق

1. (i) 4 (ii) $\frac{3}{2}$ (iii) 84 (iv) -12 (v) -42
2. (i) 3, -1 (ii) 6
3. (i) $(x - 2)$ جو ضربی ہے، $(x - 3)$ جو ضربی نہیں ہے
 (ii) $(x - 2), (x + 3)$ جو ضربی ہیں، لیکن $(x - 4)$ جو ضربی نہیں ہے
4. $m = -24$ 5. $k = -1$ 6. $a = -2, b = 2$
7. $l = 2, m = -2$ 8. $l = -1, m = 2$ 9. $a = 2, b = 7$

5.4 مشق

1. $(x - 1)(x + 1)(x - 2)$ 2. $(x - 2)(x - 4)(x + 5)$

3. $(x+1)(x-2)(x-5)$ 4. $(x-1)(x-2)(x+4)$
 5. $(x-1)(x-3)(x+2)$ 6. $(x-2)(x+3)(x+4)$
 7. $(x-2)(x+2)(3x-1)$ 8. $(x-1)(x+1)(2x+1)$

اعادہ مشق 5

1. (i) b (ii) c (iii) d (iv) b (v) c (vi) c (vii) c (viii) a
 2. (i) $(x+2)(x+3)$ (ii) $4(a-2)(a+2)$ (iii) b^2 (iv) $\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right)^2$ (v) $x^3 + y^3$
 (vi) $(x-2)(x+2)(x^2+4)$ (vii) -3
 3. (i) $(x+2y+4)(x-2y+4)$ (ii) $4(x-2y)(x+2y)$ (iii) $(3x+8)(3x+1)$
 (iv) $(1-4z)(1+4z+16z^2)$ (v) $\left(2x - \frac{1}{3y}\right)\left(4x^2 + \frac{2x}{3y} + \frac{1}{9y^2}\right)$
 (vi) $(y+3)(2y-1)$ (vii) $(x-2)(x+2)(x+1)$
 (viii) $(5mn+1)^2$ (ix) $(1-6pq)^2$

مشق 6.1

1. (i) H.C.F. = $13x^5y^3z$ (ii) H.C.F. = $17xyz$
 2. (i) HCF = $x+2$ (ii) HCF = $x-3$ (iii) HCF = $x-1$
 (iv) HCF = $6(x-1)$ (v) HCF = $18x(3x-1)$
 3. (i) $x^2 - 3x + 2$ (ii) $x^2 + x - 3$ (iii) $x^2 + x = x(x+1)$
 4. (i) L.C.M. = $273x^7y^6z^7$ (ii) L.C.M. = $5610x^2y^2z^2$
 5. (i) LCM = $(x-5)(x-20)(x+4)$ (ii) LCM = $(x+2)^2(x-2)(2x-3)$
 (iii) LCM = $6(x+2y)(x^4-y^4)$ (iv) LCM = $12(x-1)(x^4-1)$
 6. $k = 5$ 7. $k = -2, l = 6$
 8. $q(x) = 2(x^4 - 1)$ 9. $10x(x-1)^2(x-2)(x^2-9)$
 10. $k = 8$ 11. $\frac{1}{2} \times 16$

مشق 6.2

1. $\frac{2(x+4)}{x+3}$ 2. $\frac{12x}{x^4-1}$ 3. 0 4. $\frac{3x+10}{x-3}$ 5. $\frac{-1}{2(3-2x)}$
 6. $\frac{4a}{a^2-1}$ 7. 0 8. $\frac{x+2}{x+3}$ 9. $\frac{(x-2)^2}{(x-3)^2}$
 10. $\frac{(x+4)(x^2+2x+4)}{(x-1)^2}$ 11. 1 12. $\frac{y+4}{y-4}$ 13. $\frac{xy}{x^2+y^2}$

مشق 6.3

1. (i) $(2x - 3y)$ (ii) $x - \frac{1}{2x}$ (iii) $\left(\frac{x}{4} - \frac{y}{6}\right)$ (iv) $(5b - a)$
 (v) $\left(\frac{2x^3 - 3y^3}{3x^2 + 4y^2}\right)$ (vi) $\left[x - 2 - \frac{1}{x}\right]$ (vii) $\left[x^2 - 2\frac{1}{x^2}\right]$
 (viii) $(x + 1)(x + 2)(x + 3)$ (ix) $(x + 1)(x + 7)(2x - 3)$
2. (i) $(2x + 3y + 4)$ (ii) $(x^2 - 5x + 6)$ (iii) $(3x^2 - x + 1)$
 (iv) $(4x^2 - 3x + 2)$ (v) $\left(\frac{x}{y} - 5 + \frac{y}{x}\right)$
3. (i) $k = 49$ (ii) $k = 12$ 4. (i) $l = 24, m = 36$ (ii) $l = -60, m = -36$
5. (i) $x - 3$ (ii) $-x + 3$ (iii) $x = 3$

اعادہ مشق 6

1. (i) b (ii) a (iii) c (iv) b (v) a (vi) a (vii) a (viii) b
 (ix) c (x) c (xi) c (xii) a (xiii) a (xiv) d (xv) b (xvi) c (xvii) b
2. $4(x - 2)$ 3. $y + 3$ 4. $3(2x + 5)(3x + 1)(2x - 5)^2$
5. $(x^2 - 2x + 8)(x^4 + 2x^3 - 4x^2 - x + 28)$ 6. (i) $\frac{6}{1 - x^4}$ (ii) $1/a$
7. $\pm \left[\left(x + \frac{1}{x}\right) + 5 \right]$ 8. $\pm \left(\frac{2x}{y} + 5 - \frac{3y}{x} \right)$

مشق 7.1

1. (i) $\left\{-\frac{1}{5}\right\}$ (ii) $\{6\}$ (iii) $\left\{\frac{5}{18}\right\}$ (iv) $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$ (v) $\{-63\}$
 (vi) $\{-12\}$ (vii) $\left\{\frac{5}{4}\right\}$ (viii) حل ممکن نہیں (ix) $\{2\}$ (x) $\{5\}$
2. (i) $\{0\}$ (ii) $\{6\}$ (iii) $\{52\}$ (iv) $\left\{\frac{9}{4}\right\}$
 (v) $\{-5\}$ (vi) $\{10\}$ (vii) ϕ (viii) $\left\{-\frac{19}{7}\right\}$

مشق 7.2

1. (i) درست (ii) غلط (iii) درست (iv) درست (v) غلط
2. (i) $\left\{3, \frac{1}{3}\right\}$ (ii) $\left\{\frac{28}{3}, -\frac{32}{3}\right\}$ (iii) $\{-8, 3\}$ (iv) $\left\{\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right\}$
 (v) $\{2, -6\}$ (vi) ϕ (vii) $\left\{-\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right\}$ (viii) $\left\{1, \frac{17}{5}\right\}$

مشق 7.3

1. (i) $\{x \mid x > 5/2\}$ (ii) $x \geq -0.5$ (iii) $x \leq \frac{44}{3}$ (iv) $x \leq -6.5$
 (v) $x < \frac{8}{3}$ (vi) $x > \frac{3}{13}$ (vii) $x > -\frac{7}{4}$ (viii) $x > \frac{1}{26}$
2. (i) $-3 < x < 1$ (ii) $\frac{2}{3} < x \leq \frac{14}{3}$ (iii) $-22 < x < 26$
 (iv) $1 \leq x \leq 5$ (v) $2 < x \leq 5$ (vi) $-16 < x < 19$
 (vii) $-4 < x \leq 4$ (viii) $-8 < x < 3$


اعاده مشق 7

1. (i) d (ii) c (iii) c (iv) b (v) c (vi) d
 2. (i) درست (ii) درست (iii) غلط (iv) درست (v) درست (vi) درست (vii) غلط (viii) درست (ix) درست
 4. (i) ϕ (ii) $\{3\}$ 5. (i) $\{6\}$ (ii) $\{-12, 0\}$ 6. (i) $x \geq 12$ (ii) $8 > x > -2$


مشق 8.1

1. P in II-Q, Q in III-Q, R in I-Q, S in IV-Q.


2. (i)




(ii)













(iii)



(iv)













3. (i) $-y$ کے متوازی (ii) $-y$ کے متوازی (iii) $-x$ کے متوازی
 (iv) $-y$ کے متوازی نہ $-x$ کے متوازی نہ $-y$ کے متوازی نہ $-x$ کے متوازی نہ
 4. (a) $m = -\frac{2}{3}, c = \frac{1}{3}$ (b) $m = \frac{1}{2}, c = 1$ (c) $m = -3, c = 1$
 (d) $m = 2, c = -7$ (e) $m = 2, c = -3$ (f) $m = 2, c = -3$
 5. (i) نہیں (ii) نہیں (iii) نہیں (iv) ہاں (v) نہیں


8.2 مشق

1. (i) 4 گیلن (ii) 36 لٹر





3 (مربع کے ضلع کی لمبائی) = یونٹ



مشق 8.3

1. (-1, 1) 2. (-1, 0) 3. $(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$ 4. (0, 1) 5. (1, -1)

اعادہ مشق 8

1. (i) a (ii) c (iii) d (iv) c (v) d (vi) a
 2. (i) غلط (ii) درست (iii) درست (iv) درست (v) غلط (vi) غلط (vii) درست (viii) غلط (ix) غلط (x) غلط
 6. (i) $\{(3/4, -1/4)\}$, (ii) $\{(-6, -2)\}$, (iii) $\{(2, 4)\}$

مشق 9.1

1. (a) 2 (b) 1 (c) 14 (d) $3 + \sqrt{2}$ (e) 7 (f) 5
 2. (i) $\sqrt{130}$ (ii) $\sqrt{13}$ (iii) 10 (iv) $\sqrt{13}$ (v) $\sqrt{3}$ (vi) $\sqrt{97}$

9.2 مشق

1. دیے گئے نقاط متساوی الساقین مثلث بناتے ہیں
2. دیے گئے نقاط مربع شکل نہیں بناتے۔
3. مثلث قائمہ زاویہ نہیں ہے
4. دیے گئے نقاط ہم خط ہیں۔
5. $k = 0$
6. نقاط A، B اور C ہم خط ہیں۔
7. مثلث OAB متساوی الاضلاع ہے
8. وتروں کی لمبائی برابر ہے۔
9. $MNPQ$ ایک متوازی الاضلاع ہے۔ $|MN| = |QP|$ اور $|MQ| = |NP|$ اور $\angle NPQ \neq 90^\circ$ ۔
10. قطر کی لمبائی $10 =$

9.3 مشق

1. (a) (8, 2) (b) (2.5, -6) (c) (-1, 1) (d) (-4, 3) (e) (3, -7.5)
(f) (0, -2.5) 2. (13, 10) 4. 3/2

9 اعادہ مشق

1. (i) d (ii) c (iii) a (iv) c (v) c (vi) b
2. (i) غلط (ii) غلط (iii) غلط (iv) درست (v) درست (vi) درست (vii) درست
3. (i) $\sqrt{45}$ (ii) $6\sqrt{2}$ (iii) 5 4. (i) (5, 2) (ii) (-6, -6) (iii) (4, -6)

10 اعادہ مشق

1. (i) غلط (ii) درست (iii) درست (iv) غلط (v) درست (vi) غلط
2. (i) $m\angle B$ (ii) $m\angle C$ (iii) $m\angle L$
3. $x = 60^\circ$ 4. $x = 10^\circ, m = 3$ 5. $x = 3 \text{ cm}, y = 6 \text{ cm}, z = 4 \text{ cm}$

11.1 مشق

1. $130^\circ, 50^\circ, 50^\circ$ 2. $140^\circ, 140^\circ, 40^\circ, 40^\circ$

11.4 مشق

1. 1.8 cm, 2.1 cm, 2.4 cm

11.5 مشق

1. $\overline{LN} = 2 \text{ cm}, \overline{LQ} = 4 \text{ cm}$

11 اعادہ مشق

1. (i) متماثل / متوازی (ii) متماثل / برابر (iii) قطع کرتے ہیں (iv) ہم نقطہ (v) متماثل
2. (i) \cong (ii) \cong (iii) $m\angle 3$ (iv) $m\angle 4$ 3. $n^\circ = y^\circ = 75^\circ, x^\circ = m^\circ = 105^\circ$
4. $x = 5^\circ, m = 23^\circ$ 5. $m = n = 2$ 6. $\angle M = 125^\circ = \angle P$

اعادہ مشق 12

- (i) درست (ii) درست (iii) غلط (iv) درست (v) غلط (vi) درست (vii) غلط (viii) درست
- (i) $m\overline{OB}$ (ii) $m\overline{BQ}$ 4. $x^\circ = y^\circ = 30^\circ, z^\circ = 60^\circ$ 5. $m = 12, x = 6$
- $m\overline{AL} = m\overline{LB} = 3 \text{ cm}, m\overline{AD} = 4 \text{ cm}$

مشق 13.1

- (b) 20 cm 3. \overline{AC} (سب سے بڑا), \overline{AB} (سب سے چھوٹا)

اعادہ مشق 13

- (i) درست (ii) غلط (iii) درست (iv) غلط (v) درست (vi) درست (vii) غلط (viii) درست (ix) درست (x) غلط
- 90° 5. $3 + 4 > 7$

مشق 14.1

- (i) 2.6 cm (ii) 6 cm (iii) 1.8 cm (iv) 6cm, 3.6 cm, 8 cm, 4.8 cm (v) $x = 1$

مشق 14.2

- (a) 5 2. $m\overline{AD} = \frac{7}{3}, m\overline{DB} = \frac{14}{3}$

اعادہ مشق 14

- (i) درست (ii) درست (iii) غلط (iv) غلط (v) درست (vi) غلط (vii) درست (viii) درست (ix) غلط (x) درست
- (i) 4.6 cm (ii) 2 cm 4. $x = 1$ 5. $m\overline{MA} = 4.8, m\overline{AN} = 3.2$
- $x = 10 \text{ cm}, y = 6 \text{ cm}$

مشق 15.1

- 15 4. (i) 48 cm (ii) 672 cm²
- (i) $a = 2\sqrt{15}, h = \sqrt{35}, b = 2\sqrt{21}$ (ii) 9 cm
- 100 $\sqrt{34}$ m 8. 15 m 9. $m\overline{AD} = \sqrt{61}$ km

اعادہ مشق 15

- (i) درست (ii) غلط (iii) درست (iv) درست (v) درست (vi) غلط
- (i) 5m (ii) 8 cm (iii) 12 cm (iv) 1 cm

مشق 16.1

2. $m\overline{AD} = \frac{35}{4} \text{ cm}$

اعاده مشق 16

1. (i) درست (ii) غلط (iii) درست (iv) غلط (v) درست (vi) درست
 2. (i) 18 cm^2 (ii) 16 cm^2 (iii) 32 cm^2 (iv) 80 cm^2

اعاده مشق 17

1. (i) وتر (ii) وسطانيه (iii) عمود (iv) هم نقطه
 (v) مساوي القاصله (vi) متناسب (vii) راس
 2. (i) (d) (ii) (b) (iii) (c) (iv) (a) (v) (b) (vi) (b)
 (vii) (a) (viii) (c) (ix) (d) (x) (a) (xi) (a)

فرہنگ (GLOSSARY)

قالب (Matrix)

حقیقی اعداد کی مدد سے ایک مستطیلی بناوٹ مثلاً 0,1,2,3,4 اور 7 نمبروں کی مدد سے بناوٹ،
 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 7 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ کو بڑی بریکٹ میں بند کر دینے سے حاصل شکل [] کو قالب کہا جاتا ہے۔

مستطیلی قالب (Rectangular Matrix)

ایسا کوئی بھی قالب مستطیلی قالب کہلاتا ہے جس میں قطاروں کی تعداد اس کے کالموں کی تعداد کے برابر نہ ہو۔

مربعی قالب (Square Matrix)

ایک دیا ہوا قالب M مربعی قالب کہلاتا ہے اگر اس میں موجود قطاروں کی تعداد اس میں کالموں کی تعداد کے برابر ہو۔

قطاری قالب (Row Matrix)

ایسا قالب قطاری قالب کہلاتا ہے جس میں صرف ایک ہی قطار ہو۔

کالمی قالب (Column Matrix)

ایسا قالب کالمی قالب کہلاتا ہے جس میں صرف اور صرف ایک ہی کالم ہو۔

صفری قالب (Null or Zero Matrix)

ایک دیا ہوا قالب صفری قالب کہلاتا ہے اگر اس میں ہر رکن صفر ہو۔

ٹرانسپوز قالب (Transpose Matrix)

دیئے ہوئے قالب M کی قطاروں کو کالموں میں بدل دینے سے نئے قالب M^t کو قالب M کا ٹرانسپوز قالب

کہا جاتا ہے۔ یاد رہے R_1 کو C_1 ، R_2 کو C_2 اور R_3 کو C_3 وغیرہ میں بدلا جائے۔ اسی طرح کالموں کو باہم قطاروں میں بدل دینے سے نیا قالب M^t ہی ٹرانسپوز قالب ہوگا۔

سمیٹرک قالب (Symmetric Matrix)

ایک ایسا مربعی قالب A سمیٹرک قالب کہلاتا ہے جس کا ٹرانسپوز قالب A^t قالب A کے مساوی قالب ہو۔

منفی قالب (Negative Matrix)

دیئے ہوئے قالب A کا منفی قالب $-A$ ہوگا جس میں دیئے ہوئے قالب A کا ہر رکن اس کے منفی اندراج

میں بدل دیا جائے۔

سکیوسیمٹرک قالب (Skew Symmetric Matrix)

ایک مربعی قالب A کو سکیوسیمٹرک قالب کہا جاتا ہے اگر $(A)^t = -A$

وتری قالب (Diagonal Matrix)

ایسا مربعی قالب جس میں وتر کے ارکان میں سے کم از کم ایک رکن صفر نہ ہو اور وتری ارکان کے علاوہ تمام ارکان

صفر ہوں وتری قالب کہلاتا ہے۔

سکیلر قالب (Scalar Matrix)

ایسا وتری قالب جس میں وتر کے تمام ارکان یا اندراج یکساں، ہوں سکیلر قالب کہلاتا ہے۔

$$\text{ایک سکیلر قالب ہے۔ اگر } k \neq 0 \quad \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \text{ قالب}$$

وحدانی یا ضربی ذاتی قالب (Multiplicative Identity Matrix)

ایک وتری قالب جو سکیلر قالب بھی ہو اور ہر وتری رکن '1' ہو وحدانی یا ضربی ذاتی قالب کہلاتا ہے جس کو 'I' سے

ظاہر کیا جاتا ہے۔

قالب کا جمعی ذاتی قالب (Additive Identity of a Matrix)

اگر A اور B دو ہم مرتبہ قالب ہوں اور بلحاظ جمعی خاصیت $A+B = A = B+A$ ہو تو قالب B قالب A

کا جمعی ذاتی قالب کہلاتا ہے۔

کسی بھی قالب A کا ہم مرتبہ صفری قالب O قالب A کا جمعی ذاتی قالب کہلاتا ہے

$$A + O = A = O + A$$

جبکہ

قالب کا جمعی معکوس (Additive Inverse of a Matrix)

اگر A اور B دو ہم مرتبہ قالب ہوں جو مندرجہ ذیل جمعی خاصیت کے حامل ہوں

$$A + B = O = B + A$$

تو قالب A اور B دونوں ایک دوسرے کے جمعی معکوس کہلاتے ہیں پس قالب A کا جمعی معکوس وہ قالب ہوگا جو قالب A کے تمام غیر صفری ارکان کو ان کے جمعی معکوس ارکان میں بدل دینے سے حاصل ہوتا ہے۔

ضربی ذاتی قالب (Multiplicative Identity of a Matrix)

دو قالب A اور B ہوں تو قالب B قالب A کا ضربی ذاتی قالب کہلائے گا۔ اگر

$$AB = A = BA$$

ایک 2-by-2 قالب کا مقطع (Determinant of a 2-by-2 Matrix)

ایک مربعی 2-by-2 قالب $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ کا مقطع کو $|A|$ یا $\det A$ سے

ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

$$|A| = \det A = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \lambda \in R$$

نادر قالب (Singular Matrix)

ایک مربعی قالب A نادر قالب کہلاتا ہے اگر اس کا مقطع $|A|$ صفر کے مساوی ہو یا $|A| = 0$

غیر نادر قالب (Non-Singular Matrix)

ایک مربعی قالب A غیر نادر قالب کہلاتا ہے اگر A کا مقطع صفر کے مساوی نہ ہو یا $|A| \neq 0$

قالب کا ایڈجائنٹ (Adjoint of a Matrix)

اگر قالب $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ایک مربعی قالب ہو تو اس کا ایڈجائنٹ قالب ایک ایسا قالب ہے جو A کے

وتری ارکان کو باہمی تبدیل کرنے کے ساتھ غیر وتری ارکان کو منفی ارکان میں بدل دینے سے حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \text{جیسا کہ}$$

اگر $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ایک مربعی قالب ہو تو اس کا ضربی معکوس متعارف اور ظاہریوں کیا جاتا ہے۔

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{\text{Adj } M}{\det M}$$

$$\text{Adj } M = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad \det M = ad - bc \neq 0 \quad \text{جبکہ}$$

حقیقی اعداد کا سیٹ (Set of Real Numbers)

تمام ناطق اور غیر ناطق اعداد کا سیٹ حقیقی اعداد کا سیٹ R جانا اور مانا جاتا ہے۔

$$R = Q \cup Q' \quad \text{یعنی}$$

جبکہ Q اور Q' دونوں حقیقی اعداد کے سیٹ R کے تختی سیٹ ہیں۔

$$Q \cap Q' = \phi \quad \text{اور}$$

'a' کا n واں جذر (nth Root of a)

اگر n ایک مثبت صحیح عدد 1 سے بڑا ہو تو ایک حقیقی نمبر x جو حقیقی نمبر a کا n واں رُوث (جذر) ہو ریڈیکل کہلاتا ہے۔

یعنی اگر $x^n = a$ ہو تو علامتی طور پر یوں لکھا جاتا ہے:

$$x = \sqrt[n]{a} \quad \text{..... (ریڈیکل شکل)}$$

$$x = (a)^{1/n} \quad \text{..... (قوت نمائی شکل)}$$

ریڈیکل $\sqrt[n]{a}$ میں علامت $\sqrt{\quad}$ ریڈیکل کا نشان (جذری علامت) کہلاتا ہے اور n کوریڈیکل کا انڈیکس کہتے ہیں۔ حقیقی نمبر a ریڈیکل نشان کے ساتھ ریڈیکنڈ یا ریڈیکل کی اساس/بنیاد (base) کہلاتا ہے۔

غیر حقیقی عدد (Complex Number)

ایک عدد $z = a + bi$ ، جس میں $a, b \in R$ اور $i = \sqrt{-1}$ ایک کمپلیکس (غیر حقیقی) عدد کہلاتا ہے

کانجوگیٹ غیر حقیقی عدد (Conjugate of a Complex Number)

غیر حقیقی اعداد $a + bi$ اور $a - bi$ باہم ایک دوسرے کا کانجوگیٹ کہلاتے ہیں۔

کسی دیے گئے عدد کو سائنسی ترقیم میں لکھنے کے لیے اسے $a \times 10^n$ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ جبکہ $1 \leq a < 10$

اور n ایک صحیح عدد ہو۔

حقیقی عدد کا لوگارٹھم (Logarithm of a Real Number)

اگر $a^x = y$ جبکہ $a, x, y \in \mathbb{R}$ اور $a > 0, y > 0$ اور $a \neq 1$ تو x کو اساس 'a' پر y کا لوگارٹھم

کہتے ہیں اور اسے $\log_a y = x$ لکھتے ہیں۔

عام لوگارٹھم (Common Logarithm)

اساس 10 کے لوگارٹھم کو عام لوگارٹھم یا برگز (Briggs) لوگارٹھم کہتے ہیں۔

قدرتی لوگارٹھم (Natural Logarithm)

اساس e کے لوگارٹھم کو نیپیر (Napier) لوگارٹھم یا قدرتی لوگارٹھم کہتے ہیں۔

خاصہ (Characteristic)

کسی عدد کے لوگارٹھم کے صحیح عددی حصے کو لوگارٹھم کا خاصہ کہتے ہیں۔

مینٹیسا (Mantissa)

کسی عدد کے لوگارٹھم کے کسری حصے کو مینٹیسا کہتے ہیں جو ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔

ناطق جملہ (Rational Expression)

ایسا جملہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی شکل میں لکھا جاسکے جبکہ $p(x)$ اور $q(x)$ متغیر x میں کثیر رقمیاں ہوں اور

$q(x) \neq 0$ ، ناطق جملہ کہلاتا ہے۔

مقدار اصم (Surd)

ایسی غیر ناطق مقدار (یا جملہ) جس میں جذری علامت $\sqrt{\quad}$ کے نیچے ناطق مقدار درج ہو، اسے مقدار اصم

کہتے ہیں۔

”اگر کسی کثیررتی جملے $p(x)$ کو ایک درجہ والے جملہ $(x - a)$ پر تقسیم کیا جائے تو $p(a)$ بطور باقی حاصل ہوتا ہے۔“

مسئلہ تجزی (Factor Theorem)

(i) ”اگر کسی کثیررتی $p(x)$ کے لیے $p(a) = 0$ ہو تو $(x - a)$ کثیررتی کا ایک جز و ضربی ہوتا ہے۔“

(ii) ”اس کے برعکس اگر $(x - a)$ کثیررتی $p(x)$ کا جز و ضربی ہو تو $p(a) = 0$ ہوتا ہے۔“

ایک درجی مساوات (Linear Equation)

ایک متغیر x میں یک درجی مساوات کی معیاری شکل درج ذیل ہے:

$$ax + b = 0 \text{ ، جبکہ } a \neq 0 \text{ اور } a, b \in \mathbb{R}$$

مساواتوں کی اقسام (Types of Equations)

(i) ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ثابت ہو یونیورسل مساوات یا آئیڈنٹیٹی (identity) کہلاتی ہے۔

$$\text{مثال کے طور پر } x + 3 = 3 + x$$

(ii) ایسی مساوات جو متغیر کی کم از کم ایک قیمت کے لیے درست ہو لیکن آئیڈنٹیٹی نہ ہو مشروط مساوات کہلاتی ہے۔

$$\text{مثلاً } 2x + 1 = 9$$

(iii) ایسی مساوات جس کا حل خالی سیٹ ہو (کیونکہ متغیر کی کوئی بھی قیمت مساوات کو درست ثابت نہیں کرتی) ناقابل حل

$$\text{مساوات کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر } x = x + 5$$

جذری مساوات (Radical Equation)

ایسی مساوات جس میں کوئی جذری علامت والا متغیر ہو، جذری مساوات کہلاتی ہے۔

حقیقی عدد کی مطلق قیمت (Absolute Value of a Real Number)

کسی حقیقی عدد 'a' کی مطلق قیمت کو $|a|$ سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کی تعریف درج ذیل ہے

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{اگر } a \geq 0 \\ -a, & \text{اگر } a < 0 \end{cases}$$


ایک متغیر x میں یک درجہ یا لینئر غیر مساوات کی معیاری شکل مندرجہ ذیل ہے:

$$ax + b < 0, \quad a \neq 0; \quad a, b \in \mathbb{R}$$

ہم علامت '<', '>', ' \leq ' یا ' \geq ' سے بھی بدل سکتے ہیں۔

قطعہ خط (Line Segment)

کسی خط l پر واقع دو مختلف نقاط P اور Q اور ان کے درمیان تمام نقاط پر مشتمل سیٹ کو قطعہ خط PQ کہتے ہیں اور اسے علامتی طور پر \overline{PQ} یا \overline{QP} لکھتے ہیں۔



نقطہ کے کوآرڈینیٹ (Coordinates of a Point)

حقیقی اعداد x اور y کے مترتب جوڑے (x, y) کا کوآرڈینیٹ مستوی میں مطابقتی نقطہ $P(x, y)$ ہو تو x اور y کو نقطہ P کے محددات (coordinates) کہتے ہیں۔ پہلے عدد x کو x -محدد (abscissa) اور دوسرے عدد y کو y -محدد (ordinate) کہتے ہیں۔

فاصلہ فارمولہ (Distance Formula)

اگر $P(x_1, y_1)$ اور $Q(x_2, y_2)$ مستوی کے دو نقاط ہوں تو ان کے درمیان فاصلے کا فارمولہ:

$$d = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2}$$

جبکہ $d \geq 0$ (ہمیشہ)

ہم خط یا غیر ہم خط نقاط (Collinear or non-Collinear Points)

دو یا دو سے زیادہ نقاط جو کسی مستوی کے ایک ہی خط پر واقع ہوں ہم خط (collinear) کہلاتے ہیں (بحوالہ اس خط کے)۔ جو نقاط ہم خط نہ ہوں یا ایک سے زیادہ خطوط پر واقع ہوں غیر ہم خط (non-collinear) کہلاتے ہیں۔

تساوی الاضلاع مثلث (Equilateral Triangle)

اگر دی ہوئی مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائی برابر ہو تو مثلث متساوی الاضلاع مثلث کہلاتی ہے۔

ایک متساوی الساقین مثلث PQR ایسی مثلث ہے جس کے دو اضلاع کی لمبائی برابر جبکہ تیسرے ضلع کی لمبائی مختلف ہو۔

قائمہ زاویہ مثلث (Right Angled Triangle)

ایک مثلث جس کے اندرونی زاویوں میں سے ایک زاویہ 90° کا ہو قائمہ زاویہ مثلث کہلاتی ہے۔

مسئلہ فیثاغورث (Pythagoras' Theorem)

کسی قائمہ زاویہ مثلث ABC میں

$$|AB|^2 = |BC|^2 + |CA|^2 \text{ ، جبکہ } \angle ACB = 90^\circ$$

مختلف الاضلاع مثلث (Scalene Triangle)

ایک مثلث مختلف الاضلاع مثلث کہلاتی ہے اگر اس کے تینوں اضلاع کی لمبائی ایک دوسرے سے مختلف ہو۔

مربع (Square)

مستوی میں مربع ایک ایسی بند شکل ہے جو چار غیر ہم خط نقاط سے بنتی ہے اس کے چاروں اضلاع کی لمبائی برابر اور ہر زاویہ 90° کا ہوتا ہے۔

مستطیل (Rectangle)

مستوی میں ایک ایسی بند شکل جو چار غیر ہم خط نقاط سے بنتی ہے مستطیل کہلاتی ہے اگر اس کے

(i) آمنے سامنے کے اضلاع لمبائی میں برابر ہوں۔

(ii) آمنے سامنے کے اضلاع متوازی ہوں۔

(iii) ہر کونے پر زاویہ 90° کا ہو۔

متوازی الاضلاع (Parallelogram)

مستوی میں چار غیر ہم خط نقاط سے بنائی ہوئی بند شکل متوازی الاضلاع کہلاتی ہے اگر

(i) شکل کے بالمقابل اضلاع کی لمبائی برابر ہو۔


(ii) شکل کے بالمقابل اضلاع باہم متوازی ہوں۔

دو مثلثیں متماثل (علامت \cong) کہلاتی ہیں اگر ان کے درمیان کم از کم ایک (1-1) مطابقت ایسی قائم کی جا سکے جس میں باہم مطابقت رکھنے والے اضلاع اور زاویے متماثل ہوں۔ یعنی

اگر مطابقت $\triangle ABC \longleftrightarrow \triangle DEF$ میں

(تینوں متناظرہ اضلاع) $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$, $\overline{CA} \cong \overline{FD}$

(تینوں متناظرہ زاویے) $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$, $\angle C \cong \angle F$ اور
تو $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



ض۔ ز۔ ض کا موضوعہ (S.A.S. Postulate)

دو مثلثوں کی دی ہوئی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ دوسری مثلث کے متناظرہ دو اضلاع اور ان کے درمیانی زاویہ کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔

قطعہ خط کا عمودی ناصف (Perpendicular Bisector of a Line Segment)

ایک خط l کسی قطعہ خط کا عمودی ناصف کہلاتا ہے اگر l قطعہ خط پر عمود بھی ہو اور قطعہ خط کے وسطی نقطہ میں سے بھی گزرے۔

زاویہ کا ناصف (Bisector of an Angle)

اگر $\angle ABC$ کے اندر کوئی نقطہ P اس طرح واقع ہو کہ $\angle ABP = \angle PBC$ تو \overline{BP} کو $\angle ABC$ کا ناصف کہتے ہیں۔ (یعنی \overline{BP} زاویہ ABC کی تنصیف کرتی ہے)

دو ہم اکائی مقداروں a اور b کے درمیان نسبت کی تعریف $a:b = \frac{a}{b}$ کے طور پر کی جاتی ہے۔ یعنی ایسا عددی تعلق جو بتاتا ہے کہ ایک مقدار دوسری مقدار کا کون سا حصہ یا کتنے گنا ہے۔ مقداریں a اور b نسبت $a:b$ کا پہلا اور دوسرا رکن (elements) کہلاتی ہیں۔ دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں۔ یعنی اگر $a:b = c:d$ تو مقداریں a, b, c, d تناسب میں ہوں گی۔

متشابه مثلثان (Similar Triangles)

دو مثلثیں متشابه (علامت ~) کہلاتی ہیں اگر ان کے متناظرہ زاویے متماثل اور ان کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوں۔

ہم نقطہ خطوط (Concurrent Lines)

تین یا تین سے زیادہ خطوط ہم نقطہ کہلاتے ہیں اگر وہ ایک ہی نقطہ میں سے گزریں۔

مثلث کا محصور / اندرونی مرکز (Incentre)

کسی مثلث کے اندرونی زاویوں کے ناصف جس نقطہ پر ملتے ہیں اسے مثلث کا محصور / اندرونی مرکز کہتے ہیں۔

مثلث کا محاصرہ مرکز (Circumcentre)

ایک مثلث کے محاصرہ مرکز سے مراد ایک ایسا نقطہ ہے جہاں مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ

ہوتے ہیں۔

مثلث کا وسطانیہ (Median)

مثلث کا وسطانیہ ایک ایسا قطعہ خط ہوتا ہے جو مثلث کے ایک راس کو بالمتقابل (سامنے والے) ضلع کے وسطی نقطہ

سے ملائے۔

مثلث کے کسی ایک راس سے گرایا ہوا قطعہ خط جو بالقابل (سامنے والے) ضلع پر عمود ہوا سے مثلث کا ارتفاع کہتے ہیں۔

مثلث کا عمودی مرکز یعنی آرٹھوسنٹر (Orthocentre)

مثلث کے عمودی مرکز یعنی آرٹھوسنٹر سے مراد ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پر مثلث کے تینوں عمود (ارتفاع) ہم نقطہ

ہوتے ہیں۔

ریاضیاتی نشانات

\neq	کے برابر نہیں ہے	\circ	ڈگری
\forall	تمام کے لیے	\therefore	پس یا نتیجہ
\Rightarrow	صرف اگر، تو	\therefore	اگرچہ / چونکہ
\Leftrightarrow	صرف اور صرف اگر، تو	\perp	پر عمود ہے
$ $	جیسا کہ	\parallel	کے متوازی ہے
$>$	سے بڑا ہے	\longleftrightarrow	مطابقت میں ہیں
$<$	سے چھوٹا ہے	\approx	تقریباً برابر ہے
\nless	سے بڑا نہیں ہے	\equiv	کے منطبق ہے
\nless	سے چھوٹا نہیں ہے	\sim	کے متشابه ہے
\geq	سے بڑا ہے یا برابر ہے	\overleftrightarrow{AB}	خط AB
\leq	سے چھوٹا ہے یا برابر ہے	\overline{AB}	قطعہ خط AB
\in	کارکن ہے	$ AB $	نقاط A اور B کے درمیان فاصلہ
$\sqrt{\quad}$	غیر منفی جذر المربع	\vec{AB}	شعاع AB
$\%$	سو میں سے	$\triangle ABC$	مثلث ABC
π	پائی	$\angle ABC$	زاویہ ABC
A'	قالب A کا ٹرانسپوز	$m\overline{AB}$	قطعہ خط AB کی لمبائی
A^{-1}	قالب A کا معکوس	$m\angle ABC$	زاویہ ABC کی ڈگری
$\det A$ or $ A $	قالب A کا مقطع	$=$	کے برابر ہے
$\text{Adj } A$	قالب A کا ایڈجوائنٹ		

چند الجبری فارمولے

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| * $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ | * $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$ |
| * $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ | * $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ |
| * $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$ | * $(x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$ |
| * $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ | * $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$ |
| * $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ | |
| * $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ | |
| * $\text{L.C.M.} \times \text{H.C.F.} = p(x) \times q(x)$ | |

لوگار تھم کے قوانین

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| * $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$ | * $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$ |
| * $\log_a m^n = n \log_a m$ | * $\log_a n = \log_b n \times \log_a b$ |

(Table of Logarithms) لوگار تھم ٹیبل

فرق والے کالم

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	4	9	13	17	21	26	30	34	38
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4	8	12	15	19	23	27	31	35
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	3	7	11	14	18	21	25	28	32
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3	7	10	13	16	20	23	26	30
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3	6	9	12	15	19	22	25	28
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3	6	9	11	14	16	20	23	26
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3	5	8	11	14	17	19	22	24
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	3	5	8	10	13	15	18	20	23
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2	4	7	9	11	13	16	18	20
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8

لوگار تھم ٹیبل (Table of Logarithms)

											فرق والے کام								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	2	3	4	5	5	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	4	5	6	7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	4	4	5	6	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	4	4	5	6	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	6	6
68	8325	8331	8339	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	5	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	2	3	4	5	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	2	3	4	4	5	5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	2	3	4	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	2	3	3	4	4	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9049	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9204	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0	1	1	2	2	3	3	3	4

(Table of Antilogarithms) اینٹی لوگار تھم ٹیبل

فرق والے کالم

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.00	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.01	1023	1026	1027	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1143	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1652	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1690	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1730	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1770	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1944	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.34	2188	2193	2198	2103	2208	2213	2218	2223	2228	2234	1	1	1	1	2	2	2	2	3
.35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	1	2	2	2	2	3
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	1	2	2	2	2	3

(Table of Antilogarithms) اینٹی لوگار تھم ٹیبل

فرق والے کالم

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 2 3			4 5 6			7 8 9		
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3193	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	4	5	6	7
.51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	1	2	2	3	4	5	5	6	7
.52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	1	2	2	3	4	5	5	6	7
.53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	1	2	2	3	4	5	6	6	7
.54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	1	2	2	3	4	5	6	6	7
.55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	1	2	2	3	4	5	6	7	7
.56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	1	2	3	3	4	5	6	7	8
.57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	1	2	3	3	4	5	6	7	8
.58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882	1	2	3	4	4	5	6	7	8
.59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972	1	2	3	4	5	5	6	7	8
.60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	1	2	3	4	5	6	6	7	8
.61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.64	4365	4375	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	1	2	3	4	5	6	7	9	10
.67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775	1	2	3	4	5	7	8	9	10
.68	4768	4779	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	1	2	3	4	6	7	8	9	10
.69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	1	2	3	5	6	7	8	9	10
.70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	1	2	4	5	6	7	8	9	11
.71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	1	2	4	5	6	7	8	10	11
.72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	1	2	4	5	6	7	9	10	11
.73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	1	3	4	5	6	8	9	10	11
.74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	1	3	4	5	6	8	9	10	12
.75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	5715	5728	5741	1	3	4	5	7	8	9	10	12
.76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	1	3	4	5	7	8	9	11	12
.77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	1	3	4	5	7	8	10	11	12
.78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	1	3	4	6	7	8	10	11	13
.79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295	1	3	4	6	7	9	10	11	13
.80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6412	6427	6442	1	3	4	6	7	9	10	12	13
.81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	2	3	5	6	8	9	11	12	14
.82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6714	6730	6745	2	3	5	6	8	9	11	12	14
.83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	2	3	5	6	8	9	11	13	14
.84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	2	3	5	6	8	10	11	13	15
.85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7194	7211	7228	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.86	7244	7261	7287	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	2	3	5	7	9	10	12	14	16
.88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	2	4	5	7	9	11	12	14	16
.89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	2	4	5	7	9	11	13	14	16
.90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	2	4	6	7	9	11	13	15	17
.91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299	2	4	6	8	9	11	13	15	17
.92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	2	4	6	8	10	12	14	15	17
.93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9057	9078	9099	2	4	6	8	10	12	15	17	19
.96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311	2	4	6	8	11	13	15	17	19
.97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9506	9528	2	4	7	9	11	13	15	17	20
.98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	2	4	7	9	11	13	16	18	20
.99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	2	5	7	9	11	14	16	18	20

انڈیکس

ب

برابری،
کمپلیکس نمبرز کی، 56

پ

پتھاگرس تھیورم، 209
پرنسپل n وال ڈوٹ، 49

ت، ٹ، ٹھ

تقسیم،
کمپلیکس نمبرز کی، 58
کثیررتی کی، 97
ریڈیکلز کی، 50
ناطق جملوں کی، 97
مقادیر اصم کی، 109

تجوی،

بذریعہ گروپنگ، 121، 126
بذریعہ مشترک یک رتی، 326
دو کیوبز (Cubes) کے فرق کی، 128
دو مربعوں کے فرق کی، 122
تین درجی کثیررتی کی، 133
دو درجی کثیررتی کی، 124، 121
دو تین درجی کثیررتی کے جمع کی، 128

الف

آرڈی نیٹ، 179
اساس، 52
عام لوگارٹھم کی، 69، 70
لوگارٹھم کی، 69
قدرتی لوگارٹھم کی، 69، 77
اعشاریہ، 40
غیر اختتامی، 40
تکراری، 40
غیر اختتامی تکراری، 40
اختتامی، 40
اعداد، 38
الجبری جملہ، 91
ایکڑ، 193، 194، 195
ایسیسیا، 179
ایکسپونینشل مساوات، 50
ایکسز، 184
ایکسپونینٹ اور ریڈیکل، 49، 50
کی خصوصیات، 50، 52
ناطق، 52

مطلق مساواتوں کا، 164
 لیئر غیر مساواتوں کا، 169
 مساواتوں کے لیئر سسٹم کا، 27
 خاصیت تلازم
 حقیقی نمبروں کے لیے، 44
 خاصیت بندش، 44
 حقیقی نمبروں کے لیے، 44
 خاصیت مبادلے حقیقی نمبروں کے لیے،
 بالحاظ جمع، 44
 بالحاظ ضرب، 45
 خاصیت تقسیمی ضرب
 بالحاظ جمع، 46
 بالحاظ تفریق، 46
 خاصیت
 جمعی مساواتوں کے لیے، 47
 ضربی غیر مساواتوں کے لیے، 48
 حقیقی نمبروں کے لیے، 47
 عکسی، 47
 تشاکل، 47
 تعدیت، 47
 ڈ، ڈ، ڈ، ر، ٹ
 ڈگری، 195
 کثیررتبی کی، 91
 مرکب غیر مساوات کی، 170

تفریق،
 کمپلیکس نمبرز کی، 58
 قابیوں کی، 11
 ناطق جملوں کی، 95
 مقادیر اصم کی، 107، 108
 تصویر باقی، 129
 ج، ج، ج، ح، خ
 جمعی عمل،
 کمپلیکس نمبرز میں، 57
 قابیوں میں، 10
 خالص خیالی نمبروں میں، 57
 ناطق جملوں میں، 95
 مقادیر اصم میں، 107
 حقیقی نمبروں میں، 44
 جمعی خاصیت،
 مساواتوں کی، 47
 غیر مساواتوں کی، 48
 جمعی ذاتی رکن
 قابیوں کا، 14
 حقیقی نمبروں کا، 45
 جمعی مکسوس،
 قابیوں کا، 15
 حقیقی نمبروں کا، 45
 حل سیٹ

ع، غ

عددی سروں کا قالب، 27، 29

عام لوگار تھم کا

خاصہ، 70

میشیسا، 70

ٹیبیل، 71، 72

عددی قوت نما، 50

غیر مساواتوں

کی خصوصیات، 168

غیر ناطق نمبر، 42، 41

ف، ق

فاصلہ،

دونقاط کے درمیان، 203

فارمولا، 203، 204

قیمت معلوم کرنا

ناطق جملوں کی، 97

قوت نما اور ریڈیکلز،

کی خصوصیت، 107، 108

قالب (قالبوں)

کی حاصل جمع، 10

کا ذاتی قالب بلحاظ جمع، 14

کا جمعی معکوس، 15

کا ایڈجائنٹ، 24

ڈیٹ 2-by-2 (det) کا، 24

ذاتی و ضربی قالب، 21

رقبہ، 292

ایک مستطیل کا، 292، 295

ایک مربع کا، 292

ایک مثلث کا، 297، 298، 292

زاویہ، 209، 211

کا ناصف، 252، 344

ص، ض

ضرب،

کمپلیکس نمبروں کی، 57

قالبوں کی، 17

خالص خیالی نمبروں کی، 54

ریڈیکلز کی، 50

ضربی خصوصیات،

برابری کی، 158

غیر برابری کی، 168

حقیقی نمبروں کی، 44، 45

ضربی ذاتی رکن،

قالبوں کے لیے، 21

حقیقی نمبروں کے لیے، 46

ضربی معکوس،

قالبوں کے لیے، 24

حقیقی نمبروں کے لیے، 46

- 03، کا کالم
- کی معیاری شکل، 59
- کے برابر قالب، 04
- کی مساواتوں کو حل کرنے کا طریقہ، 27
- کی حاصل ضرب، 17
- کا ضربی ذاتی قالب، 21
- کا ضربی معکوس، 24
- قالب،
- صفری، 06
- مستطیلی، 06
- کا مرتبہ، 04
- سمیٹرک، 07
- سکیلر سیمٹرک، 07
- کی قطار، 03
- کی تفریق، 11
- مربعی، 06
- ٹرانسپوز، 06
- قدرتی نمبرز، 38
- قطعہ خط، 342، 180
- ک، گ
- کمپلیکس نمبروں،
- کی حاصل جمع، 57
- کا کانجوگیٹ، 56
- کی تقسیم، 58
- کی برابری، 56
- کی حاصل ضرب، 57
- کانجوگیٹ،
- کمپلیکس نمبر کا، 56
- مقادیر اصم کا، 111
- کارٹیسی مستوی، 177
- کریمر کا قانون، 27، 28
- کلو میٹر، 191، 192
- کثیررتی، 120، 121
- کی ڈگری (درجہ)، 91
- کی تقسیم، 97
- کی مساوات، 158
- کافیئر تھیورم، 131، 137
- کی تجزی، 120، 121
- کوآرڈریٹ، 178
- گیلن، 197
- گراف
- کنورشن، 190
- لینئر مساوات کا، 177، 190
- لینئر غیر مساوات، 163
- لینئر سسٹم کا، 181، 198
- ایک نمبر کا، 177، 178
- ل
- لوگارٹھم کے قوانین، 78، 79، 80
- لینئر مساواتیں، 92، 93، 93
- لینئر غیر مساواتیں، 167

لوگار تھم

نقطہ کے، 203
مثلث کے عمود، 252

ایٹنی (ضد)، 75

مثلث، 206

اساس، 70-69

مساوی الساقین، 208

خاصہ، 70

مساوی الاضلاع، 207

عام، 69

قائمہ زاویہ، 207

عام ٹیبیل، 71، 72

مختلف الاضلاع، 209

مینیسیا، 73، 74

کارترقاع، 203

کا قاعدہ، 206

مسئلہ فیثاغورث، 285، 343

م

مطلق قیمت، 164

مساواتوں کی، 164

حقیقی نمبروں کی، 164

کی خصوصیات، 174

منطبق (متماثل)

زاویے، 224

مثالیں، 223

مترتب جوڑا، 177

مبداء، 178

مساواتیں،

خصوصیات بالحاظ جمع، 169، 174

قوت نمائی، 93

ضربہ خصوصیات، 168، 173، 93

جذری، 160

مستطیل، 181، 210

مربع، 210، 211

محدوات یا کوآرڈینیٹ 179، 342

ن

نمبر (ز)

کمپلیکس، 54

خیالاتی، 54

اعداد، 44

غیر ناطق، 42، 41

قدرتی، 38

ناطق، 39

حقیقی، 38

کھل اعداد، 38

اعشاری،

کی خصوصیات، 47

قوت نمائی، 50

ریڈیکلز، 50

نقاط،

ہم خط، 205، 342

غیر ہم خط، 205، 342

کتابیات

- Gustafson, R. David and Frisk, P. D; Functions and Graphs, Brooks / Cole Publishing Company, 1987, U.S.A.
 - H. Anton; Calculus with Analytic Geometry, (Second Edition), John Wiley & Sons, New York.
 - H.S. Hall and F.H. Stevens; A School Geometry, (Metric Edition, 2006) A.I.T.B.S., Publishers, India.
 - Jerome E. Kaufmann; Algebra for College Students, (2nd Edition, 1987), PWS-KENT Pb. Co. Boston.
 - Joseph N. Payne; Algebra Two with Trigonometry, (2nd Edition), Harcourt Brace Joranovich, INC.
 - Karl J. Smith and P.J. Boyle; College Algebra, (3rd Edition, 1985), Brooks / Cole Publishing Co., California.
 - L.D. Hoffmann and G.L Bradley; Calculus for Business and Life Science, (Sixth Edition), McGraw Hill, N.Y.
 - L. Redford, A Vavra and S. Richlicki; (Technical Mathematics) Breton Publishers, U.S.A.
 - Mark Dugopolski; Intermediate Algebra, (3rd Edition, 2000), McGraw-Hill Co.
 - Pythagorean Theorem – from Wolfram Math World
 - Shamshad Muhammad Lodhi (Late) & Others; Mathematics 9, 10, (5th Ed) Punjab Textbook Board, Lahore.
 - Wikipedia, The Free Encyclopedia.
-


تالیفات

- Gustafson, R. David and Frank, P. D. Functions and Graphs. Brooks / Cole Publishing Company, 1987, U.S.A.
- H. Anton; Calculus with Analytic Geometry, (Second Edition), John Wiley & Sons, New York
- H.S. Hall and F.H. Stevens; A School Geometry, Ninth Edition, 2000 A.L.T.S., Publishers, India
- Jerome E. Kaserman; Algebra for College Students, (2nd Edition, 1987), PWS KENT Pp. Co. Boston
- Joseph N. Papp; Algebra Two with Trigonometry, (2nd Edition), Harcourt Brace Jovanovich, INC.
- Karl J. Smith and P.J. Boyer; College Algebra, (3rd Edition, 1985), Brooks / Cole Publishing Co., California
- L. D. Hoffman and G.I. Birdsey; Calculus for Business and Life Science, (Six Edition), McGraw Hill, N.Y.
- L. Redford, A. Vayns and S. Rikhtsht; (Technical Mathematics) Birkon Publisher U.S.A.
- Mark Tugopolski; Intermediate Algebra, (3rd Edition, 2000), McGraw-Hill Co.
- Pythagorean Theorem - from Wolfram Math World
- Shambhu Nathani and Lodiin (Lars) & Others; Mathematics 9, 10 (5th Ed) Punjab Textbook Board, Lahore.
- Wikipedia; The Free Encyclopedia.

151-512

151-512

151-512









ورزش جسم کے لیے بہت ضروری ہے اس سے انسان سارا دن چست رہتا ہے۔



ہاتھوں اور پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ناخنوں کو وقت پر تراشتے رہنا چاہیے تاکہ ان میں میل جمع نہ ہو۔

ٹیکسٹ بک ڈویلپرز گروپ، لاہور کے ممبر پبلشرز کی نصابی کتب جو پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی وزارت تعلیم (شعبہ نصاب سازی) اسلام آباد
 برطانیق قومی نصاب ۲۰۰۶ اور نیشنل ٹیکسٹ بک اینڈ لرننگ میٹریلز پالیسی ۲۰۰۷ء کے تحت منظور شدہ ہیں اور جن کو این او بی حاصل ہو چکے ہیں۔



CARAVAN
BOOK HOUSE

2-Kachehri Road, Lahore (Pakistan)
 Ph: 042-37122955, -37352296, -37212091
 E-mail: caravanbookshr@gmail.com

cbh.pakistan +92-3374645800 cbhpakistan cbhpakistan

www.caravanbookhouse.com.pk

